

*Малиновская А.О., Тарасова Т.О.*  
**ФАКТОРЫ РИСКА – ОПРЕДЕЛЯЮЩЕЕ ЗВЕНО ОБСЛЕДОВАНИЯ  
ПРИ ЛЕЧЕНИИ КАРИЕСА**

*Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Латышева С.В.*  
*1-я кафедра терапевтической стоматологии*  
*Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск*

**Актуальность.** Первичная профилактика стоматологических заболеваний должна стать приоритетным направлением развития стоматологической практики.

Убедительные данные, опубликованные главным стоматологом РБ А.М. Матвеевым указывают на рост кариеса и гингивита у молодых лиц, что подтверждает недостаточную профилактическую работу. Поэтому вопросы этиологии кариеса, выяснение факторов риска стоматологических заболеваний позволит успешно предупредить развитие кариеса.

**Цель:** изучение факторов риска, выясненных при опросе по данным амбулаторных карт тематических пациентов.

**Материалы и методы.** Проведен ретроспективный анализ 205 тематических амбулаторных карт пациентов в возрасте 17-25 лет. Особое внимание обращали на данные факторов риска, выясненных при опросе пациентов, оценку стоматологического статуса (показатели ОНІ-S, КПИ, КПУ).

**Результаты и их обсуждение.** Детальное изучение стоматологических амбулаторных карт по выяснению вопросов о факторах риска показало, что 14,3% стоматологов выявляют факторы риска при опросе и только 8,6% врачей дают рекомендации пациентам. Анализ по диагностике клинических форм кариеса (согласно классификации Боровского Е.В. и Леуса П.А.), показал, что кариес эмали в стадии деминерализации был зарегистрирован в 4,4%; кариозный дефект в пределах эмали – 19,8%; кариес дентина (средний) - 64,8%; кариес дентина глубокий – в 11%.

**Выводы.** Целевое назначение профилактики кариеса – индивидуальные рекомендации, обоснованные на данных опроса и обследования ротовой полости. При обследовании стоматологических пациентов и лечении кариеса не всегда выясняются факторы риска, что свидетельствует о недостаточной эффективности профилактической работы. Следовательно, при опросе необходимо всегда выяснять факторы риска, т.к. они необходимы для планирования и формулировки конкретных рекомендаций по уходу за полостью рта каждому пациенту.