

Подалинский А.В. Семенов Е. К.
**ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ COVID-19 ПНЕВМОНИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ И СОПУТСТВУЮЩИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ.**

Научный руководитель: доц., п-к м/с запаса Метельский С.М.

Кафедра военно-полевой терапии

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск

Актуальность. С начала COVID-19 пандемии число зараженных во всем мире превысило 120 млн. случаев, более 2,5 млн. человек умерло. В Республике Беларусь по официальной статистике выявлено более 300 тыс. подтвержденных случаев коронавируса.

Высокая скорость распространения инфекции, разнообразие клинических проявлений, гиподиагностика, появление новых штаммов и отсутствие эффективного лечения пациентов с COVID-19 делают решение данной проблемы приоритетной целью для современного общества. В зависимости от возрастной группы и наличия сопутствующих заболеваний коронавирусная пневмония имеет свои особенности течения. Исследование в данном направлении в нашей стране практически не проводилось, что делает его актуальным для изучения.

Цель: определить особенности течения поражения легких при COVID-19 у пациентов в зависимости от их возрастной группы и наличия сопутствующих заболеваний.

Материалы и методы. Материалом для исследования стали результаты стационарного лечения военнослужащих и гражданского населения с лабораторно подтвержденной COVID-19-инфекцией в 432 ГВКМЦ за период 2020-2021гг., соответствие лечебно-диагностической тактики рекомендациям об организации оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19.

Результаты и их обсуждение. Были изучены 49 историй болезни пациентов, поступивших в 432 ГВКМЦ в период с 2020 по 2021 гг. Возраст пациентов – от 18 до 92 лет. Тяжелая пневмония составляла 42,86% от всех случаев, нетяжелая — 57,14%. К факторам риска тяжелого течения пневмонии относились следующие сопутствующие неинфекционные заболевания: болезни сердца, хронические заболевания легких, диабет, гипертония, цереброваскулярные заболевания. Также тяжелая форма пневмонии наблюдалась преимущественно у лиц старше 60 лет — 76,19% от всех случаев пневмоний с данной формой течения.

Выводы. По данным проведенного исследования тяжелая форма пневмонии превалировала у лиц пожилого возраста. Наличие сопутствующих заболеваний усложняло ведение данных пациентов. Из всех случаев тяжелых пневмоний 23,81% приходился на трудоспособные возрастные группы, что требовало адекватного лечения и грамотной программы реабилитации для снижения трудовых и финансовых потерь.