

Чугульков В. А.

ВЫБОР МЕТОДА ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ВЕН НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

Научный руководитель: ассист. Терешко Д. Г.

Кафедра военно-полевой хирургии

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск

Актуальность. Варикозная болезнь вен нижних конечностей является наиболее распространенной патологией среди заболеваний сосудов и выявляется в той, или иной степени выраженности у 79% взрослого населения. Несмотря на широкий спектр применяемых видов лечения, хирургические методы являются наиболее радикальными. Определение выбора метода хирургического вмешательства в лечение данной патологии является одним из приоритетов сосудистой хирургии. Сроки выздоровления, косметический результат, рецидивы и послеоперационные осложнения – главные вопросы, которые беспокоят современных хирургов и пациентов.

Цель: произвести сравнительный анализ эффективности различных методов хирургического лечения, применяемых при варикозном расширении вен нижних конечностей и выявить их закономерности.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 142 историй болезни пациентов с варикозной болезнью вен нижних конечностей, находившихся на лечении в отделении сосудистой хирургии Государственного учреждения «432 Главный военный клинический медицинский центр Вооруженных Сил Республики Беларусь».

Результаты и их обсуждения. В ходе исследования было установлено, что среди 142 пациентов соотношение мужчин и женщин составило 67,6% и 32,4% соответственно. Возраст пациентов варьировал от 19 до 78 лет, средний возраст 43 года (± 3 года). Комбинированная флебэктомия выполнялась 111 пациентам (78,2%), флебэктомия + минифлебэктомия 19 (13,3%), эндовенозная лазерная коагуляция 6 (4,2%), минифлебэктомия по Варади 6 (4,2%). Минифлебэктомия выполнялась преимущественно пациентам более молодого возраста (19-40 лет, 68,5%); (41-60 лет, 21%); (61-78 лет, 10,5%). Преимущества минифлебэктомии: малая травматизация тканей по сравнению с классической флебэктомией, требуется меньше времени на восстановление и реабилитацию, хороший косметический эффект.

Выводы. Выбор метода хирургического лечения при варикозной болезни нижних конечностей должен быть определен для каждого пациента индивидуально, а так же подобран в зависимости от имеющегося опыта, оснащения лечебного учреждения, сопутствующих заболеваний пациента. Применение минифлебэктомии позволяет добиться более быстрого восстановления пациентов и лучшего косметического результата.