

**Быкова У. О.**

**ИЗУЧЕНИЕ АСПЕКТОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ОТДАЛЕННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ  
ПРИ ПРОТЕЗИРОВАНИИ НА ИМПЛАНТАХ**

**Научный руководитель: д-р мед. наук, проф. Манах Т. Н.**

*2-я кафедра терапевтической стоматологии*

*Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск*

**Актуальность.** Успешность и долговременный результат протезирования на имплантах зависят от множества факторов, в том числе от материала дентальных имплантов, выбора метода фиксации коронки на имплант, а так же последующего соблюдения гигиены полости рта.

**Цель:** изучение аспектов, влияющих на результат протезирования на имплантах.

**Материал и методы.** Проведен анализ литературы, содержащей данные об основных материалах, используемых для изготовления дентальных имплантов и исследования чистоты поверхности дентальных имплантов, зарегистрированных на территории РБ. Проведено онлайн анкетирование по вопросу особенностей проведения индивидуальной гигиены и частоты проведения профессиональной гигиены в период поддерживающей терапии, а так же выбора метода фиксации коронки на имплант. Были составлены статистические данные на основе хирургических журналов врачей-стоматологов и КЛКТ снимков из государственных и частных стоматологических клиник.

**Результаты и их обсуждение.** По результатам онлайн опроса 16,7% пациентов не были проинформированы об особенностях ухода за имплантатами после их установки, 18,8% пациентов не соблюдают правила ухода за имплантатом после его установки, 80% стоматологов считают, что профессиональная гигиена на имплантатах значительно отличается от таковой без них, В результате анализа онлайн анкетирования врачей стоматологов о видах фиксации коронки на имплант было выявлено, что 67 % опрошенных чаще используют винтовой метод фиксации.

**Выводы.** Выявлена недостаточная информированность и мотивированность пациентов с имплантацией по вопросам особенностей индивидуальной гигиены и частоты проведения профессиональной гигиены в период поддерживающей терапии. Успешность того или иного метода фиксации супраконструкций зависит в большей степени именно от правильности подхода к ее выбору в условиях разных клинических ситуаций.