

Исакова А. Н.

ФАКТАЖ И АНАЛИЗ ПРИЧИН УПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ ДЕТЬМИ И ПОДРОСТКАМИ

Научный руководитель: ассист. Шатохина Я. П.

*Кафедра анестезиологии, интенсивной терапии и экстренной медицинской помощи
ГУ «Луганский государственный медицинский университет имени святителя Луки»,
г. Луганск*

Актуальность. Во всем мире употребление алкоголя вызывает ежегодно 3,3 миллиона смертей, что составляет 5,9% всех случаев смерти, из них - 1% всех случаев смерти детей, что составляет 30% случаев смерти детей, когда родители находились в состоянии алкогольного опьянения.

Злоупотребление алкоголем приводит к смерти и инвалидизации относительно молодой контингент населения. Установлены причинно-следственные связи между употреблением алкоголя и целым рядом психических и поведенческих расстройств, включая алкогольную зависимость, неинфекционных нарушений здоровья, а также травм в результате насилия, дорожно-транспортных аварий и суицидальных попыток.

Помимо последствий для здоровья вредное употребление алкоголя наносит значительный социальный и экономический ущерб отдельным людям и обществу в целом.

Цель: изучение частоты случаев и обобщение причин употребления алкоголя детьми, а также его воздействие на ребенка в масштабах всего общества.

Материалы и методы. Был проведен ретроспективный анализ медицинской документации ГУ «Луганский республиканский центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» ЛНР за период с 2017г. по 2020 г. учета случаев острого алкогольного отравления у детей и причин употребления алкоголя.

Результаты и их обсуждение. Всего за указанный период времени по поводу острого алкогольного отравления у детей в возрасте от 2 до 18 лет поступило около 16% вызовов от общего числа вызовов бригады скорой медицинской помощи. Чаще всего причинами острого алкогольного отравления у детей были: ошибочное употребление алкоголя (3%); сознательное чрезмерное употребление алкоголя (13%); родители давали алкоголь, чтобы успокоить ребенка (0,1%).

Сезонная зависимость употребления алкоголя наиболее выражена у детей в возрастной группе 10-18 лет и выпадает на время летних каникул - 8% от всех зарегистрированных случаев.

Выводы. Таким образом, данная работа позволила изучить модели употребления алкоголя детьми. На употребление алкоголя существенное влияние оказывали: экономическая составляющая (уровень доходов в семье), наличие неблагополучного окружения, культура общения, доступность или наличие алкогольных напитков, травматические события, стресс, проблемы взаимоотношений в семье. Необходимо сопоставлять тяжесть причинения вреда здоровью ребенка, связанного с последствиями алкогольной интоксикации, и возможные варианты ответственности взрослых, допустивших развитие подобного сценария.

Употребление алкоголя оказывает воздействие не только на заболеваемость, травматизм и возникновение других нарушений здоровья отдельных детей и подростков, но также и на течение таких состояний и их результаты в масштабах всего общества.