

Стручистый М.Е., Славчев С.В.

**АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ
И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ
ПО КЛАССАМ МКБ-10 (ПО ДАННЫМ УЗ «35-Я ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ
ПОЛИКЛИНИКА Г. МИНСКА»)**

Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Чешко Н.Н.

Кафедра хирургической стоматологии

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск

Актуальность. Проведение экспертизы временной нетрудоспособности является важным и ответственным разделом работы врача.

Цель: провести анализ структуры стоматологической заболеваемости и продолжительности временной нетрудоспособности по классам МКБ-10 у пациентов стоматологического отделения УЗ «35-я городская клиническая поликлиника г. Минска» в 2022 году.

Материалы и методы. По журналу регистрации выданных листков нетрудоспособности (форма 036/у) нами изучены количество случаев выдачи листков нетрудоспособности и продолжительность листков нетрудоспособности в днях. В ходе исследования использованы аналитический и статистический методы.

Результаты и их обсуждение. Объем исследования составил 73 закрытых листка нетрудоспособности в 2022 году.

Выявлено, что наибольший удельный вес по количеству случаев и по общей продолжительности временной нетрудоспособности составляют стоматологические заболевания, входящие в класс «Болезни органов пищеварения» (K00-K14). На их долю приходится 75,35% временной нетрудоспособности по количеству случаев и 66,87% по общей ее продолжительности.

Второе место в структуре временной нетрудоспособности занимают стоматологические заболевания, входящие в класс «Травмы, отравления и некоторые другие последствия внешних причин» (S00-S09). На их долю приходится 15,07% временной нетрудоспособности пациентов по количеству случаев и 22,86% по продолжительности нетрудоспособности.

Стоматологические заболевания, относящиеся к классу «Болезни кожи и подкожной клетчатки» (класс L по МКБ-10) занимают в структуре стоматологической заболеваемости третье место по количеству случаев (5,48%) и по средней продолжительности (5,29%).

Показатели средней продолжительности временной нетрудоспособности по болезням класса K варьируют от 5,4 дней у пациентов с воспалительными заболеваниями челюстей до 14,5 дней у пациентов с флегмонами и абсцессами полости рта.

Средняя продолжительность временной нетрудоспособности по заболеваниям, входящим в класс S по МКБ-10, варьировала от 5,6 дней у пациентов с открытыми ранами губы и полости рта до 32 дней у пациентов с переломами скуловой кости и верхней челюсти.

Среди заболеваний класса L по МКБ -10 листки нетрудоспособности были выданы 4 пациентам с острыми лимфаденитами лица, головы и шеи (L04.0), у которых средняя продолжительность временной нетрудоспособности составила 8,5 дней.

Выводы: в общей структуре стоматологической заболеваемости пациентов с временной утратой трудоспособности преобладали заболевания класса K по МКБ-10, где наиболее многочисленную группу лиц составили пациенты с острыми воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области. Менее значимое место в структуре временной нетрудоспособности заняли стоматологические заболевания, относящиеся к классу S по МКБ-10, где значительную часть составили пациенты с переломами костей лицевого скелета.

Средняя продолжительность временной нетрудоспособности по стоматологическим заболеваниям варьировала в зависимости от диагноза от 1 до 32 дней.