

## **HELICOBACTER PYLORI ПРИ ЭРОЗИВНЫХ ГАСТРИТАХ, ЯЗВАХ ЖЕЛУДКА И ДВЕНАДАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ**

*Колоцей В.Н.<sup>1</sup>, Климович И.И.<sup>1</sup>, Страпко В.П.<sup>2</sup>, Власов О.В.<sup>2</sup>*

*<sup>1</sup>УО «Гродненский государственный медицинский университет»,*

*<sup>2</sup>УЗ «Гродненская клиническая больница скорой медицинской помощи  
г. Гродно»*

**Введение.** Эрозивные гастриты, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки (ЯБЖи12ПК) довольно часто протекают с рецидивами и в (4-7%) осложняются кровотечением, перфорацией и другими хроническими осложнениями, которые требуют хирургического лечения. У молодых людей, чаще женщин бывают язвы двенадцатиперстной кишки (Я12ПК), у мужчин- язвы желудка (ЯЖ). Необходимо отметить, что в последние годы изменились взгляды на причину и механизмы развития ЯБЖи12ПК. Гиперацидное состояние и возникновение язвы сменилось на инфицирование *Helicobacter pylori* (НР). Причем с НР связывают её рецидивы и осложнения. По республике Беларусь примерно до 70% населения инфицированы НР, но язвы развиваются только у 5 - 7 % инфицированных. Все связано с тем, что не все штаммы НР являются патогенными.

**Цель исследования.** Изучить частоту выявления и оценить значимость определения НР при эрозивных гастритах, ЯБЖи12ПК.

**Материал и методы исследования.** Нами ретроспективно изучены результаты 1022 фиброгастродуоденоскопий (ФГДС), которые были выполнены в 2021-2022г. в больнице скорой медицинской помощи г. Гродно пациентам поступающим по срочным показаниям с болями в животе и пациентам которые находились на стационарном лечении с эрозивными гастритами, ЯБЖи12ПК.

**Результаты и их обсуждение.** Из всех 1022 пациентов которым выполнялась ФГДС у 556 (54,4%) пациентов НР не был обнаружен. У 466 (45,6%) пациентов НР выявлен по результатам биопсии слизистой желудка, при этом у 219 (47%) пациентов НР+, у 104 (22,3%) НР++, у 68 (14,6%) НР+++ и у 75 (16,1%) с единичным НР. Среди обследованных пациентов мужчин было 276 (27%), женщин 746 (73%). Средний возраст пациентов среди мужчин 51 год, среди женщин – 47лет, также обследовались 11 детей до 18 лет. Эрозивная гастродуоденопатия отмечалась у 257 (25,2%) пациентов, эритематозная гастродуоденопатия у 414 (40,5%), хронический гастрит отмечался у 54 (5,3%) пациентов, хр. дуоденит отмечался у 194 (19%) пациентов, сочетание хронического гастрита и дуоденита отмечалось у 104 (10%) пациентов. НР был обнаружен у 128 (46,4%) обследованных мужчин и у 388 (52%) обследованных женщин. В больнице скорой медицинской помощи г. Гродно за это время лечилось 116 пациентов, с наличием эрозивного гастрита, ЯБЖ и 12 ПК, при этом у всех был выявлен НР++ и НР+++.

Некоторые пациенты поступали в другие отделения в связи с тяжелыми травмами, ожогами, отравлениями, при которых имело место развитие эрозивного гастрита, образование острых язв, чаще на фоне хронических язв желудка и 12 ПК, которые нередко осложнялись желудочно-кишечным кровотечением и перфорацией. В диагностике данных заболеваний учитывали анамнез, объективные и дополнительные (ФГДС, лабораторные и рентгенологические) методы исследования. Среди пациентов мужчин было 73 (62,9%), женщин 43 (37,1%). В возрасте 20-40 лет было 39 (33,6%) пациентов, 41 – 60 - 51 (44,0%) и свыше 61 года – 26 (22,4%). Эрозивный гастрит отмечался у 28 (24,1%) пациентов, это были люди молодого возраста, до 40 лет мужского пола все курильщики и преимущественно любящие острую пищу не соблюдающие режим питания, но алкоголем никто не злоупотреблял. У 50 (43,1%) пациентов с ЯБЖ преобладал возраст 40-60 лет, среди которых было 44(88%) мужчин и 6(12%) женщин, курили 39(88,6%) мужчин. Длительность язвенного анамнеза составила у впервые выявленных 1-3 года, у пациентов с хронической язвой желудка до 10 и более лет. Никакой диеты никто не придерживался, несмотря на рекомендации врачей. Язва 12 ПК имела место у 35(30,2%) пациентов среди которых было 14(40%) мужчин и 31(60%) женщина, курили 11(78,6%) мужчин и 5(16,1%) женщин. Никакой диеты никто не придерживался, несмотря на рекомендации врачей. Сочетание ЯБЖ и 12 ПК отмечалась у 1 (0,9%) пациента, который оперирован, выздоровел.

**Выводы:**

1. Наличие эрозивного гастрита, ЯБЖ, 12 ПК является показанием для исследования на наличие НР с целью адекватного лечения.
2. По нашим данным НР наиболее часто обнаруживается при эрозивной гастродуоденопатии.
3. При заболеваниях желудка и 12-ПК НР обнаруживается чаще у женщин трудоспособного возраста.
4. Эрозивным гастритом, ЯБЖ и 12 ПК и больше болеют мужчины трудоспособного возраста.