

Иванова А.Ю., Савенко А.А.
БОКОВЫЕ И СРЕДИННЫЕ КИСТЫ ШЕИ
Научный руководитель: ст. преп. Юшкевич Е.В.
Кафедра морфологии человека

Белорусский государственный медицинский университет г. Минск

Вопрос о боковых, срединных кистах шеи является актуальным, вопреки длительному изучению данных врождённых патологий, ведь патогенез и этиология названных пороков развития являются не до конца изученными.

Как боковые, так и срединные кисты шеи относят к врождённым образованиям, возникающим вследствие нарушения эмбрионального развития. Боковые кисты шеи, или бронхогенные опухоли, возникают вследствие незаращения жаберных карманов. Срединные же кисты шеи, или тиреоглоссальные, являются следствием незаращения щитовидно-язычного протока.

Целью предстоящей работы является изучение морфогенеза боковых и срединных кист шеи, причины их развития, симптоматики, способов лечения и их прогноз. Срединные и боковые кисты вызывают косметические дефекты и функциональные нарушения вследствие их близкого расположения к жизненно важным органам. Также описаны редкие случаи малигнизации врождённых кист. А также они являются сравнительно редкими пороками развития, их доля среди всех опухолей и опухолевидных образований челюстно-лицевой области и шеи едва достигает 5%, а больные с этим видом патологии составляют 2% всех пациентов отделений челюстно-лицевой хирургии, соответственно, для их изучения присутствует не так много клинических случаев. Важным этапом лечения данных пороков развития является их верная диагностика, которая в большинстве случаев представляет собой рентгеновскую компьютерную томографию, с помощью которой возможны выявление образований и оценка их параметров, а также определение тактики лечения и объёма хирургического вмешательства.

Таким образом, изучение морфогенеза боковых и срединных кист шеи, его оценка, правильная и своевременная диагностика данных образований имеют важное практическое значение для лечения вышеперечисленных пороков и требуют дополнительных научных изысканий.