

Бобкова И.Л.

АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПРИЧИН ДЕПУЛЬПИРОВАНИЯ ЗУБОВ У ВЗРОСЛЫХ ПАЦИЕНТОВ

Кафедра терапевтической стоматологии ИПКиПКЗ УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск. Беларусь

Цель исследования. Изучить частоту и причины депульпирования зубов на стоматологическом приёме по данным ретроспективного анализа медицинской документации.

Материал и методы. Нами проведен анализ причин депульпирования зубов по клиническим и ортопедическим показаниям. На базе УЗ «4-я городская стоматологическая поликлиника г. Минска» было осмотрено 240 амбулаторных карт пациентов в возрасте от 18 до 74 лет за период 2020-2025 гг.

Результаты исследования. Осмотр показал, что с целью лечения депульпировано 104 зуба, из них с

диагнозом хронический пульпит 72 зуба, с диагнозом хронический пульпит в стадии обострения 22 зуба, в 10 случаях зубы депульпировались с диагнозом гиперемия пульпы. В случае депульпирования зубов по ортопедическим показаниям, в подавляющем большинстве случаев (92 зуба) был выставлен диагноз травматический пульпит.

Анализ жалоб выявил, что в случае депульпирования зубов по ортопедическим показаниям, во всех случаях (108 зубов) боль в анамнезе отсутствовала, в то время как в случаях депульпирования с целью лечения боль не отмечалась лишь у 20 пациентов, а при выставлении диагноза гиперемия пульпы боль отсутствовала в половине случаев.

При депульпировании зубов с целью лечения, более половины пациентов (56 зубов) предъявляло жалобы на боли от термических раздражителей, ночные, а также самопроизвольные, постоянные и боли от механических раздражителей (30, 22 и 28 случаев соответственно).

При депульпировании зубов по ортопедическим показаниям, в 100% случаев амбулаторные карты не содержали сведений о глубине кариозной полости и ее сообщении с полостью зуба. Анализ данных о предшествующем лечении выявил, что ранее не были лечены 18 зубов, с одинаковой частотой в зубе находилась постоянная пломба или он был покрыт ортопедической коронкой - по 10 случаев. В 70 амбулаторных картах данные о предшествующем лечении зуба не регистрировались.

При депульпировании зубов с целью лечения болезненное зондирование в одной точке отмечали 94 пациентов, у них же в 16 случаях термическая проба положительна. В 88 случаях амбулаторные карты данных о результатах термической пробы не содержали. В группе пациентов, у которых зубы были депульпированы по ортопедическим показаниям, в подавляющем большинстве случаев данные о результатах основных методов исследования в амбулаторных картах отсутствуют. При депульпировании зубов с целью лечения, в подавляющем большинстве случаев аномалий зубного ряда не выявлено, а атрофия костной ткани на 1/2 длины корня зарегистрирована у восьми пациентов. В амбулаторных картах пациентов, направляемых на депульпирование по ортопедическим показаниям, не содержались данные об аномалиях зубного ряда. Атрофия костной ткани на 1/2 длины корня встречалась у 26 пациентов, а на 1/3 длины корня зуба в единичных случаях.

Выводы. Таким образом, основными причинами депульпирования зубов являются хронический пульпит (39% случаев) и ортопедические показания (38% всех случаев). В большинстве амбулаторных карт пациентов, которым проводилось эндодонтическое лечение по ортопедическим показаниям, отсутствовало обоснование депульпирования зубов с целью последующего протезирования.



**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН**



**Г О У «Т А Д Ж И К С К И Й Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й
М Е Д И Ц И Н С К И Й У Н И В Е Р С И Т Е Т
и м е н и А Б У А Л И И Б Н И С И Н О»**

ИЛМ ВА ТАҲСИЛОТ БАҲРИ СОЛИМИИ МИЛЛАТ

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ НАЦИИ

**SCIENCE AND EDUCATION FOR THE
HEALTH OF THE NATION**

Материалы годичной (73-ой) научно-практической конференции
«Наука и образование для здоровья нации» с международным участием

ТОМ 2

**(Стоматология, теоретические дисциплины,
фармация, фармакология и тезисы на английском языке)**

Душанбе

31.10.2025