

Колтович А.В., Пожидаева В.В.

АНАЛИЗ РОСТА ПЕРВИЧНОЙ ПЕРИТОНЕАЛЬНОЙ КАРЦИНОМЫ В БЕЛАРУСИ

Научный руководитель: д-р мед. наук, проф. Литвинова Т.М.

Кафедра онкологии

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск

Актуальность. Первичная перитонеальная карцинома (ППК), впервые занесенная в базу данных Белорусского канцер-регистра (БКР) в 2007 г., является одной из наиболее злокачественных опухолей, встречающихся только у женщин. Она имеет III и IV стадии и в 91,7% представлена серозной карциномой, что объясняет ее высокую агрессивность. Из года в год число заболевших ППК увеличивается, однако рост ее эпидемиологических показателей до настоящего времени в Беларуси изучен не был, знание которых весьма значимо для клинической практики.

Цель: рассчитать, изучить и проанализировать на основе данных, взятых из базы данных БКР рост наиболее значимых эпидемиологических показателей ППК за 2007-2023 гг.

Материалы и методы. В исследование включена информация о 861 пациенте с ППК, которые взяты из базы данных БКР. Были изучены возраст заболевших и умерших женщин, распределение по стадиям, рассчитанные по стандартным формулам грубые интенсивные показатели заболеваемости (ГИПЗ) и смертности (ГИПС), одногодичная летальность и скорректированная 5-летняя выживаемость (С5В).

Результаты и их обсуждение. В исследовании установлено, что из 861 женщины, пролеченной за 17 лет 546 (63,4%) умерли от ППК. Абсолютное число заболевших росло из года в год с одной заболевшей до 96, достигнув максимума в 2021 г. (106 человек), а умерших – от 2 до 82. Средний возраст варьировал с 55 лет до 63,6, в среднем по стране – 60,2 года. Возраст умерших по годам составлял 72,5-65,2, при медиане – 66,3 года.

Изучение ГИПЗ показало, что с минимальной величины 0,02 ‰ она выросла до 1,94 ‰, т.е. в 97 раз. Отмечен также рост в 41,5 раза ГИПС с 0,04 ‰ до 1,66 ‰. Одногодичную летальность удалось посчитать только с 2012 г. Она уменьшилась на 9,0% с 42,9% до 33%.

У пациентов чаще встречалась ППК III стадии, но в 2011, 2015 и 2018 гг., IV стадия превалировала и составила 68,2%, 75,0% и 75,0% соответственно. Изучение С5В в стране за 2 периода позволило установить, что результаты лечения ППК III и IV стадий ухудшились в 2016-2020 гг., по сравнению 2011-2015 гг., а в целом по всей группе выживаемость уменьшилась и составила 32,0% и 24,2% соответственно.

Выводы.

1. В стране увеличилось абсолютное число заболевших и умерших от ППК и произошел существенный рост ГИПЗ (с 0,02 ‰ до 1,94 ‰) и ГИПС (с 0,04 ‰ до 1,66 ‰) за изучаемые годы.

2. Пятилетний показатель скорректированной выживаемости пациентов с ППК за 17 лет уменьшился с 32,0% до 24,2%, что подтверждает необходимость дополнения национальных стандартов новыми методами лечения ППК, возможно таргетной терапией.