

Золотарёва В.С., Симонова В.В.

ИЗУЧЕНИЕ СТИГМАТИЗАЦИИ ВИЧ-НАСЕЛЕНИЯ СРЕДИ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ И МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ

Научный руководитель: д-р мед. наук, проф. Доценко М.Л.

Кафедра инфекционных болезней

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск

Актуальность. Высокий уровень стигматизации ВИЧ/AIDS в обществе, включая медицинское сообщество, приводит к дискриминации и отрицательному отношению к людям, живущим с ВИЧ. Исследования показывают, что стигматизация в медицинской среде может привести к неправильному назначению лечения, отсрочке диагностики и обследований. Понимание причин и механизмов стигматизации ВИЧ среди студентов медицинских университетов и медицинских работников поможет разработать эффективные программы образования и тренингов, направленных на преодоление стереотипов и улучшение отношений между пациентами и врачами.

Цель: с помощью социологического опроса проанализировать наличие явления стигматизации вируса иммунодефицита человека среди студентов медицинских университетов и работников учреждений здравоохранения.

Материалы и методы: Исследование проводилось на базе медицинских университетов Республики Беларусь, время проведения февраль-март 2024 года. В опросе приняли участие 151 студент-медик. В работе использовались социологический и статистический методы. Для анкетирования была разработана анкета, состоящая из 47 вопросов, опрос проведен на платформе «Google Forms»: <https://forms.gle/GmhqgXH6toTYmC7y6>

Результаты и их обсуждение. В результате проведенного анализа полученных данных было установлено, что по возрасту респонденты распределились следующим образом: 17-19 лет – 7,3%, 20-22 лет – 75,5%, 23-24 лет – 15,2 %, старше 25 лет – 2%. Исходя из полученных данных среди опрошенных 76,8% составили студенты БГМУ, 6% – ГрГМУ, 4% – студенты ВГМУ, 4% – ГГМУ, 9,2% – закончили БГМУ. 45,7% опрошенных не работают в учреждениях здравоохранения, 41% являются медицинскими сестрами, 4,6% – врачи-интерны, 4% – прочий медицинский персонал, 2% – провизоры, 0,7% – помощник врача, 0,7% – административный персонал. На вопрос “С каким количеством людей, живущих с ВИЧ, Вы общались на работе за последние 12 месяцев?” респонденты ответили следующим образом: 43,9% контактировали менее с пятью людьми, 28% не контактировали ни с одним ВИЧ-инфицированным человеком, 12,2% не знают контактировали они, 9,8% контактировали с 5-20 людьми, 3,7% – с 21-50 человек, 2,4% - с 51-100. На вопрос “Насколько Вы опасались бы заразиться ВИЧ, если бы прикоснулись к одежде пациента, живущего с ВИЧ?” 88% респондентов не обеспокоены данной ситуацией. 21, 1% респондентов предпочли бы не оказывать помощь людям, употребляющим инъекционные наркотики. 11,8% опрошенных стараются избегать физического контакта при оказании медицинской помощи ВИЧ-инфицированным. 79% респондентов - согласны, 4,6 %-7 - не согласны, 16,4 % - сомневаются в данном утверждении: Женщины, живущие с ВИЧ, имеют право рожать детей, если они этого захотят.

Выводы. Как показывает проведенное исследование, почти 60% студентов медицинских университетов республики контактировали с ВИЧ-инфицированными пациентами. В то же время, каждый 10-й студент предпочел бы не оказывать медицинскую помощь лицам, живущим с ВИЧ, что свидетельствует о явлениях дискриминации по отношению к ВИЧ-позитивным пациентам. Полагаем, что указанное исследование может служить обоснованием для проведения дополнительных тренингов и включения в учебные программы подготовки врачей и специалистов с медицинским образованием вопросов стигмы и дискриминации ВИЧ-позитивных пациентов.