

Александрова Е.С.

**АНАЛИЗ АКУШЕРСКОГО АНАМНЕЗА И СОСТОЯНИЯ ПОСЛЕ РОДОВ
У ДОНОШЕННЫХ И НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ ПО ДАННЫМ
МИНСКОГО ОБЛАСТНОГО РОДДОМА**

Научные руководители: канд. мед. наук, доц. Назаренко О.Н.,

канд. мед. наук, зав. отд. Сухарева А.П.

Кафедра пропедевтики детских болезней

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск

Актуальность. Периодическое изучение факторов, неблагоприятно влияющих на состояние здоровья новорожденных, необходимо для организации профилактики патологии доношенных и недоношенных детей.

Цель: изучить акушерский анамнез и наиболее частую патологию доношенных и недоношенных новорожденных с установлением вероятных факторов риска недоношенности.

Материалы и методы. Изучено 52 истории болезни пациентов педиатрического отделения для новорожденных с перинатальной патологией и недоношенных Минского областного роддома, находившихся в стационаре в течение января – февраля - марта 2026 года. Распределение детей по полу было относительно равномерным: мальчиков 55,77%, девочек 44,23%. В группе наблюдения доношенных детей с различной патологией было 59,62%, а недоношенных - 40,38%. Решение поставленных задач проводилось на первом этапе исследования в общей группе наблюдения ($n=52$); в дальнейшем были выделены две группы сравнения: доношенные дети ($n=31$) и недоношенные ($n=21$).

Результаты и их обсуждение. В общей группе наблюдения ($n=52$) наиболее часто встречалась урогенитальная патология, наблюдавшаяся у матерей 82,69% случаев (из них кольпит - 44,23%). На втором месте по частоте была эндокринная патология, составившая 63,46% (из них ожирение - 11,54%). Среди болезней органов дыхания, наблюдавшихся в 63,46% случаев, преобладали острые респираторные инфекции (38,46%). Среди патологии сердечно-сосудистой системы (59,62%) преобладала гестационная артериальная гипертензия – 17,31%. Патология мочевыделительной системы встречалась в 40,38%, с преобладанием инфекций мочевыводящих путей. Болезни ЖКТ и аллергопатология встречались с невысокой частотой.

Среди факторов, характеризующих течение беременности, наиболее часто отмечались угроза прерывания беременности (30,77%) и преэклампсия (13,46%).

При сравнительной оценке вышеуказанных факторов в группах доношенных и недоношенных детей урогенитальная патология, анемии, болезни органов дыхания и эндокринная патология по частоте практически не отличались. Однако была зарегистрирована тенденция к достоверному преобладанию частоты встречаемости в группе недоношенных детей патологии мочевыделительной системы у матерей, составившая $29,03 \pm 8,15$ у доношенных и $57,14 \pm 10,80$ у недоношенных; угрозы прерывания - $22,58 \pm 7,51$ и $42,86 \pm 10,8$; и преэклампсии $6,45 \pm 4,42$ и $23,81 \pm 9,29$, $P < 0,1$.

Среди патологии родов в нашем наблюдении преобладали преждевременные роды (38,46%), преждевременный разрыв плодных оболочек (19,23%), который наиболее часто наблюдался в группе недоношенных детей (38,10%).

Выводы. Установлена высокая частота встречаемости урогенитальной, эндокринной и респираторной патологии матерей в общей группе наблюдения. Возможными факторами риска недоношенности можно считать заболевания мочевыделительной системы матерей, угрозу прерывания беременности и преэклампсию.