

Холдеенко В.Д., Терлоев И.М.

КЛИНИКО–МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ ПОЛОСТИ НОСА

Научные руководители: д-р мед. наук, проф. Трушель Н.А.,

д-р мед. наук, проф. Демяшкин Г.А.

Кафедра нормальной анатомии, лаборатория гистологии и иммуногистохимии

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск

Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова, г. Москва

Актуальность. Новообразования полости носа (НПН) представляют значительный научный и клинический интерес ввиду их высокой распространённости, а также в связи с наличием злокачественных новообразований (ЗНО). Среди эпителиальных новообразований полости носа особое клиническое значение придают полипу полости носа (ППН), плоскоклеточному неороговевающему (ПНРПН) и ороговевающему (ПОРПН) раку полости носа. Изучение стадий раковой трансформации данных ЗНО, вовлечения в этот процесс элементов иммунного опухолевого микроокружения, способствует разработке адекватных приёмов хирургического лечения и противоопухолевой терапии.

Цель: проанализировать клинические и морфологические данные эпителиальных опухолей полости носа.

Материалы и методы. В ретроспективном исследовании были проанализированы медицинская документация и морфологические заключения пациентов с НПН ($n = 114$). Оценивались возраст, пол, локализация, ВПЧ статус, табачный анамнез (ТА), метод обнаружения, рецидив.

Результаты и их обсуждение. В исследуемой когорте больше всего встречались пациенты с ППН ($n = 49$) с преобладанием лиц мужского пола (78%). Чаще ППН локализовался в левой части полости носа – у 26 человек. Рецидивы были зарегистрированы у 18 пациентов, из которых 4 оказались ВПЧ+. Плоскоклеточный рак был диагностирован у 65 пациентов: неороговевающий ($n = 30$) и ороговевающий ($n = 35$) типы. Наиболее частой локализацией была правая половина полости носа ($n = 14$); 10 пациентов с ВПЧ. Рецидив злокачественных НПН был отмечен у 30 из 65 пациентов, при этом у 16 из них отмечали ВПЧ+ статус. Среди исследуемых доминировали пациенты с ТА ≥ 20 пачка-лет (почти 52%), среди которых доля мужчин – 93%. Чаще рак полости носа выявлялся лучевыми методами диагностики (в 42% случаев); эндоскопически – у 31%; методом позитронно-эмиссионной томографии у 9%.

Выводы. На основании анализа клинико-инструментальных и морфологических данных выявлено, что эпителиальные новообразования чаще возникают у мужчин старше 50 лет с отягощённым табачным анамнезом. При плоскоклеточном раке полости рта очень часто возникают рецидивы, особенно у пациентов с ВПЧ+ статусом. Лидирующими рутинными методами диагностики по-прежнему остаются – лучевые и эндоскопические.