

Минкевич М.С., Шнипко В.А.

СТРУКТУРА ПОТРЕБНОСТИ В ЭКСТРЕННОЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НА ГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ

Научный руководитель: доц. Д.В. Евхута

*Кафедра организации медицинского обеспечения войск и медицины катастроф
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск*

Актуальность. Экстренная стоматологическая помощь на госпитальном этапе является важным звеном в системе оказания медицинской помощи населению. В современных условиях наблюдается существенный рост травм среди населения, в том числе среди лиц трудоспособного возраста. В связи с этим требуется тщательный анализ структуры травматизма среди населения для оптимизации кадрового обеспечения организаций здравоохранения. Изучение данных пациентов, прошедших стационарное лечение в специализированном отделении челюстно-лицевой хирургии, позволило оценить реальную потребность во врачах-стоматологах хирургического профиля.

Цель: оценить реальную потребность во врачах-стоматологах хирургического профиля при оказании экстренной стоматологической помощи на госпитальном этапе.

Материалы и методы. Проведён ретроспективный анализ архивных данных пациентов, обратившихся за экстренной помощью в УЗ «11-я городская клиническая больница» г. Минска в период с января по декабрь 2025 года. Проанализированы истории болезни 384 пациентов. Использовалась статистическая обработка данных с применением пакета Microsoft Excel. Учитывались следующие показатели: количество граждан, нуждавшихся в экстренной стоматологической помощи в г. Минске в 2025 году, пол, возраст на момент госпитализации, причины возникновения травм и заключительный диагноз по классификации МКБ-10: S02.6 – перелом нижней челюсти, S02.4 – перелом скуловой кости и верхней челюсти, S01.5 – открытая рана губы и полости рта, S00.5 – поверхностная травма губы и полости рта, S02.5 – перелом зуба.

Результаты и их обсуждение. Из 384 пациентов с травмами челюстно-лицевой области в оказании помощи врачом-стоматологом хирургического профиля нуждались 341 пострадавший. Пациенты с травмами челюстно-лицевой области, которые требуют вмешательства врача-стоматолога, от общего количества составляют 341 - 88,8%. Средний возраст пациентов, нуждавшихся в экстренной стоматологической помощи, составил $41,7 \pm 12,8$ лет, распределение по полу: 69,8% (238) – мужчины, 30,2% (103) – женщины.

Распределение пациентов с травмами, требующими оказания экстренной стоматологической помощи составило: с переломом нижней челюсти (S02.6) – 195 (57,2%), перелом скуловой кости и верхней челюсти (S02.4) – 117 (34%), открытая рана губы и полости рта (S01.5) – 27 (7,9%), поверхностная травма губы и полости рта (S00.5) – 1 (0,3%), перелом зуба (S02.5) – 1 (0,3%).

В ходе исследования распределение причин травматизации оказалось следующим: бытовые травмы (63,8%), алкогольное опьянение (32,8%), криминальные травмы (3,9%), производственные травмы (4,7%) и другое (5,5%).

Выводы. Проведенный анализ травм у граждан с повреждениями челюстно-лицевой области и требующих оказания помощи врачом-стоматологом хирургического профиля позволил выявить необходимость качественной подготовки указанных врачей-специалистов и учета этой категории специалистов при формировании штатной структуры территориальных организаций здравоохранения. Количественная оценка объема работы и тяжести повреждений служит достоверной основой для определения реальной потребности в специалистах челюстно-лицевой хирургии в городе Минске.