

Труханович Я.Г.

ОЦЕНКА УРОВНЯ ОНКОНАСТОРОЖЕННОСТИ И ГОТОВНОСТИ У СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

Научный руководитель: д-р мед. наук, проф. Мороз И.Н.

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск

Актуальность. Онкологические заболевания остаются одной из ведущих причин заболеваемости и смертности как в мире, так и в Республике Беларусь. По данным РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова, в Беларуси ежегодно выявляется около 50–56 тысяч новых случаев злокачественных новообразований. Высокий уровень «запущенности» случаев (диагностика на III–IV стадиях) напрямую коррелирует с неблагоприятным прогнозом и высокой стоимостью лечения. Ключевым фактором снижения смертности является ранняя диагностика, успех которой зависит от уровня онкологической настороженности медицинских работников на всех уровнях оказания медицинской помощи.

Цель: оценить уровень грамотности в вопросах онконастороженности у студенческой молодежи Республики Беларусь.

Материалы и методы. Пилотное социологическое исследование оценки уровня грамотности в вопросах здоровья (ГВЗ) осуществлялось с использованием валидизированной версии европейского вопросника HLS19 по измерению грамотности в вопросах здоровья. Опросник был адаптирован и дополнен блоком вопросов, касающихся онкологической настороженности (знание ранних симптомов, факторов риска, алгоритмов маршрутизации пациентов и методов скрининга). Уровень ГПЗ рассчитывался на основе ответов респондентов по балльной шкале, предусмотренной методологией HLS19, с последующей интерпретацией результатов (недостаточный, проблемный, достаточный и отличный уровни грамотности). Полученные данные анализировались с применением параметрических и непараметрических методов исследования: метод описательной статистики, метод оценки статистически значимых различий (Chi-square test, χ^2 , p). Объем исследования составил 213 респондентов, из которых 143 человека (67,1%) обучались в медицинских университетах Республики Беларусь, 70 человек (32,9%) - в медицинских колледжах. Обработка данных осуществлялась с применением программ пакета «Statistica 10».

Результаты и их обсуждение. Установлен низкий уровень ГВЗ. Удельный вес респондентов с низким уровнем ГВЗ составил 67,6% (31,9% – недостаточный уровень; 35,7% – проблемный уровень). Уровень ГВЗ респондентов, обучающихся в медицинских университетах, был статистически значимо выше ($\chi^2 = 71,0$, $p < 0,01$), чем респондентов медицинских колледжей. Среди респондентов медицинских университетов 17,5% имели отличный уровень ГВЗ, 23,8% – достаточный. Уровень интерактивной ГВЗ респондентов медицинских университетов был статистически значимо выше ($\chi^2 = 52,6$, $p < 0,01$), чем респондентов медицинских колледжей. Установлены также статистически значимые различия уровня функциональной ГВЗ ($\chi^2 = 64,7$, $p < 0,01$). Более половины будущих врачей (53,1%) обладают сформированной базой функциональной грамотности, среди респондентов медицинских колледжей – 24,3% (включая 20,00% достаточного и 4,3% отличного уровней). Закономерно, что более высокий уровень критической ГВЗ был также характерен для респондентов медицинских университетов ($\chi^2 = 71,7$, $p < 0,01$). Вместе с тем, уровень критической ГВЗ остается проблемным у 44,8% будущих врачей и у 80% обучающихся медицинских колледжей, что указывает на серьезный дефицит навыков анализа онкорисков в обеих группах.

Выводы. Уровень грамотности в вопросах здоровья (ГВЗ) и связанная с ним онкологическая настороженность зависит от получаемого образования (высшее или среднее специальное) и характеризует недостаточную их готовность к выявлению онкозаболеваний на ранних стадиях.