

*Кардаш Н.В., Шиманская У.П.*

## **АНАЛИЗ УЯЗВИМОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ ПОЛЕССКОГО РЕГИОНА ПРИ ПАВОДКАХ (НА ПРИМЕРЕ СТОЛИНСКОГО, ПИНСКОГО, ЛУНИНЕЦКОГО И ЖИТКОВИЧСКОГО РАЙОНОВ)**

*Научный руководитель: доц. Евхута Д.В.*

*Кафедра организации медицинского обеспечения войск и медицины катастроф  
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск*

**Актуальность.** Бассейн реки Припять относится к наиболее паводкоопасным регионам Беларуси. Ежегодные подтопления приводят к нарушению транспортной инфраструктуры, ухудшению санитарно-эпидемиологической обстановки и создают прямую угрозу системе здравоохранения. Особенно уязвимы учреждения первичного звена (ФАПы и амбулатории), расположенные в низинах и прибрежных зонах. Системный анализ уязвимости медицинской службы Полесского региона остаётся востребованной задачей в связи с сохраняющимся риском паводков.

**Цель:** оценить уязвимость медицинской службы Столинского, Пинского, Лунинецкого и Житковичского районов к паводкам.

**Материалы и методы.** Проведён анализ открытых данных МЧС, региональных СМИ и официальных сайтов ЦРБ за 2013–2026 гг., дополненный историческими сведениями из архивных публикаций за 1979 г., 1999 г. Дополнительно были использованы результаты полуструктурированных интервью с местными жителями, краеведами и главами сельских советов. Выполнено картирование учреждений первичной медико-санитарной помощи. На основе критерия транспортной доступности выделены три зоны риска: красная (прямое затопление здания), жёлтая (учреждение не затопляется, но транспортное сообщение с ним регулярно нарушается), зелёная (устойчивое сообщение в любой период паводка).

**Результаты и их обсуждение.** В Житковичском районе зонами устойчивого риска являются населённые пункты вдоль Припяти: Озераны, Хвоенск, Переров, Погост, Хлупин (паводки 2013, 2024–2026 гг.). В д. Переров по адресу ул. Парковая, 2А расположен ФАП, что позволяет отнести его к «красной зоне». Получены сведения о подтоплении медицинского пункта, подворий и нарушении дорожного сообщения в периоды максимального уровня воды. В Столинском районе основная угроза исходит от реки Горынь. На основании интервью с жителями деревень Маньковичи и Белоуша, подтверждены факты подтопления жилых домов и приусадебных участков в 1979, 2013 и 2024 годах. В зону риска попадают ФАПы, расположенные в данных населённых пунктах, а также в д. Бухличи, Ворони, Большие и Малые Викоровичи. В Пинском и Лунинецком районах подтверждена уязвимость Кожан-Городокской, Любачинской и Дятловичской амбулаторий (реки Цна и Смердь), где паводки, 2013, 2024–2026 гг. приводили к перерезанию дорог.

**Выводы.** Медицинская служба Полесского региона обладает уязвимостью к паводкам. Предложенная дифференцировка по трём зонам риска позволяет ранжировать учреждения для приоритетного принятия мер. Разработанный подход может быть использован районными отделами по ЧС и здравоохранению для планирования превентивных мероприятий.