

Ахремчик Е.Г.

ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ О ВИРУСЕ ПАПИЛЛОМЫ ЧЕЛОВЕКА И ЕГО СВЯЗИ С РАКОМ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ И РОТОГЛОТКИ

Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Долин В.И.

Кафедра консервативной стоматологии

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск

Актуальность. Вирус папилломы человека (ВПЧ) является значимым фактором риска злокачественных новообразований головы и шеи, включая опухоли ротоглоточной локализации. При этом в практическом здравоохранении сохраняется разрыв между общей информированностью населения о ВПЧ и пониманием его связи с раком ротовой полости и ротоглотки. Для стоматологии данный аспект имеет особое значение, поскольку именно стоматологический прием обеспечивает возможности раннего выявления изменений слизистой оболочки ротовой полости и профилактического консультирования пациентов. Оценка уровня профильной осведомленности пациентов может служить основанием для совершенствования профилактической коммуникации в амбулаторной практике.

Цель: оценить уровень осведомленности о ВПЧ и его связи с раком ротовой полости и ротоглотки у респондентов в возрасте 18 лет и старше.

Материалы и методы. Проведено анкетирование 133 респондентов ($n = 133$) с использованием онлайн-платформы Google Forms. В исследование включались совершеннолетние участники, добровольно согласившиеся на участие. Анкета содержала блоки социально-демографических характеристик, вопросов общей осведомленности о ВПЧ, стоматологических аспектов ВПЧ, а также вопросов о роли стоматолога в информировании пациентов. Статистическую обработку выполняли с применением описательной статистики (абсолютные и относительные значения) и критерия χ^2 Пирсона; статистически значимыми считали различия при $p < 0,05$.

Результаты и их обсуждение. В исследовании приняли участие 108 женщин (81,2%) и 25 мужчин (18,8%). По возрасту преобладали респонденты 18–24 лет (69,2%). Общая информированность о ВПЧ была высокой: о вирусе ранее слышали 89,5% опрошенных; о связи ВПЧ с онкологическими заболеваниями знали 75,9%; о возможном бессимптомном течении инфекции – 80,5%. Вместе с тем осведомленность о стоматологическом аспекте ВПЧ оказалась ниже: о взаимосвязи ВПЧ с раком ротовой полости и ротоглотки знали 41,4% респондентов, не знали 42,9%, затруднились ответить 15,8%. По данным опроса, стоматолог осматривает слизистую оболочку ротовой полости у 80,5% участников, однако изменения отмечено только у 33,1% респондентов. Установлена статистически значимое соотношение между уровнем образования и знанием о связи ВПЧ с раком ротовой полости и ротоглотки ($\chi^2 = 24,96$; $p < 0,001$), а также между респондентами с медицинским образованием и уровнем соответствующей осведомленности об онкологических аспектах ВПЧ ($\chi^2 = 9,14$; $p = 0,0025$). Полученные результаты свидетельствуют о разном уровне информированности в исследованной выборке.

Выводы. В исследованной выборке выявлен разрыв между высокой общей информированностью о ВПЧ и недостаточным знанием его взаимосвязи с оральной и орофарингеальной онкопатологией. Уровень профильной осведомленности статистически значимо ассоциирован с образовательным уровнем и медицинским профилем респондентов. Полученные данные подтверждают необходимость усиления просветительской работы по стоматологическим аспектам ВПЧ-инфекции.