

Ахремчик Е.Г.

**РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ВПЕРВЫЕ ВЫЯВЛЕННЫХ СЛУЧАЕВ,
СТАДИЙНОЙ СТРУКТУРЫ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВЫЖИВАЕМОСТИ
ПАЦИЕНТОВ С РАКОМ ГОРТАНИ (С32) В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
ЗА ПЕРИОД 2020-2025 ГОДОВ**

Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Долин В.И.

Кафедра терапевтической стоматологии

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск

**Минский городской клинический онкологический центр, г. Минск*

Актуальность. Рак гортани сохраняет высокую клиническую и социальную значимость в структуре злокачественных новообразований органов головы и шеи, поскольку нередко выявляется на распространенных стадиях и сопровождается неблагоприятными онкологическими исходами. Анализ республиканских данных позволяет уточнить структуру впервые выявленных случаев и определить направления совершенствования ранней диагностики.

Цель: охарактеризовать структуру впервые выявленных случаев, стадийное распределение и описательные показатели выживаемости пациентов с раком гортани в Республике Беларусь за 2020-2025 годы.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ республиканских данных государственной статистической отчетности Республики Беларусь по раку гортани за 2020-2025 годы. Проанализировано 3663 впервые выявленных случая заболевания и 1718 случаев смерти. Использованы методы описательной статистики, критерий χ^2 Пирсона и тест на линейный тренд. Различия считались статистически значимыми при $p < 0,05$.

Результаты и их обсуждение. Среди пациентов преобладали мужчины - 3485 (95,1%), женщины составили 178 (4,9%). Доля жителей городов составила 65,7%, сельского населения - 34,3%. Наибольшая доля впервые выявленных случаев зарегистрирована в возрастных группах 60-64 года (23,1%), 65-69 лет (20,4%) и 55-59 лет (17,5%). Среди пациентов с установленной стадией заболевания ($n = 3568$) I стадия составила 26,9%, II - 22,1%, III - 24,7%, IV - 26,4%; ранние стадии (I-II) составили 48,9%, поздние (III-IV) - 51,1%, при отсутствии статистически значимого преобладания поздних стадий ($p = 0,203$). Ранняя летальность составила 28,6%, доля пациентов, проживших более 5 лет, - 10,8%. Статистически значимого линейного тренда по числу впервые выявленных случаев не установлено ($p = 0,41$), тогда как по числу зарегистрированных случаев смерти выявлено достоверное снижение ($p = 0,02$).

Выводы. Рак гортани в Республике Беларусь характеризуется выраженным преобладанием мужчин и высокой долей пациентов старше 55 лет. Почти равное соотношение ранних и поздних стадий свидетельствует о сохраняющемся резерве для повышения эффективности раннего выявления. Высокая ранняя летальность и низкая доля пациентов, проживших более 5 лет, указывают на неблагоприятный прогноз у значимой части больных.