

Гирева Д.А., Лях Е.Д.

УРОВЕНЬ ИНФОРМИРОВАННОСТИ О ВПЧ-ВАКЦИНАЦИИ СРЕДИ ЖЕНЩИН РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП

Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Захаренкова Т.Н.

*Кафедра акушерства и гинекологии с курсом повышения квалификации и переподготовки
Гомельский государственный медицинский университет, г. Гомель*

Актуальность. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире выявляют более 600 тыс. новых случаев рака шейки матки. Исследования подтверждают эффективность и безопасность вакцин против вируса папилломы человека (ВПЧ), а также снижение инфицированности в странах с массовой иммунизацией. Главное препятствие для вакцинации – низкая осведомлённость о ВПЧ и его последствиях.

Цель: изучить уровень информированности о ВПЧ и вакцинопрофилактике женщин различных возрастных групп.

Материалы и методы. Был выбран социологический метод путём опроса с помощью авторской анкеты. Выборку составили 153 респондента женского пола в возрасте $47,07 \pm 11,81$ лет (от 23 до 84 лет). Женщины были разделены на две группы: в первую группу вошли 78 (50,98%) женщин до 45 лет включительно, во вторую группу – 75 (49,02%) женщин от 46 до 84 лет. Статистический анализ проводился при помощи пакета прикладного программного обеспечения "Microsoft Excel 2018".

Результаты и их обсуждение. В ходе исследования проведён сравнительный анализ информированности о вакцинопрофилактике ВПЧ в двух возрастных группах. Установлено, что уровень осведомлённости о ВПЧ в первой возрастной группе составил 75 (96,15%) респондентов, а во второй группе – 61 (81,33%) женщина. О наличии взаимосвязи между ВПЧ и развитием онкологических заболеваний были осведомлены 66 (84,62%) респондентов первой группы и 58 (74,56%) – второй группы. Информированность о бесплатной вакцинации против ВПЧ девочек в возрасте 11 лет в Республике Беларусь с 2025 года в процентном соотношении оказалась выше среди женщин первой возрастной группы – 61 (78,21%) респондент против 38 (50,67%) респондентов во второй. При оценке риска заражения ВПЧ для себя или своих детей респонденты первой группы распределились следующим образом: очень низкий риск – 5 (6,41%) женщин, низкий – 9 (11,64%) женщин, средний – 35 (44,87%) женщин, высокий – 27 (34,62%) женщин, очень высокий – 2 (2,56%) женщины. Во второй возрастной группе аналогичные показатели составили: очень низкий риск – 2 (2,67%) женщины, низкий – 18 (24,00%) женщин, средний – 34 (45,33%) женщины, высокий – 16 (21,33%) женщин, очень высокий – 5 (6,67%) женщин. На вопрос об оптимальном времени проведения прививки от ВПЧ в первой группе 41 (52,56%) респондентов указали на необходимость вакцинации до начала половой жизни, 20 (25,64%) женщин высказались за вакцинацию в любом возрасте, 11 (14,10%) женщин отметили, что обстоятельства не имеют значения, 4 (5,13%) женщины заняли категорически негативную позицию, а 2 (2,56%) женщины полагают, что привиться следует уже после обнаружения ВПЧ. Во второй группе до начала половой жизни считают необходимым вакцинироваться 36 (46,15%) женщин, в любом возрасте – 19 (24,36%) женщин, отсутствие значения обстоятельств отметили 9 (11,54%) женщин, против иммунопрофилактики высказались 26 (33,33%) женщин, что статистически значимо превышает аналогичный показатель в первой возрастной группе ($\chi^2 = 12,892$; $p < 0,001$).

Выводы. Сравнительный анализ выявил достоверные межгрупповые различия: молодые женщины значимо превосходят старших по уровню осведомлённости о ВПЧ, его онкогенном потенциале и действующей вакцинации. При этом в старшей когорте доля категорически против прививки (33,33%) более чем в шесть раз выше, чем в младшей (5,13%) ($\chi^2 = 12,892$; $p < 0,001$). Полученные данные свидетельствуют о необходимости адресной просветительской работы среди женщин старших возрастных групп.