

**Информированность родителей о факторах риска возникновения
раннего детского кариеса**

Семеняка Екатерина Сергеевна

Белорусский государственный медицинский университет, Минск

*Научный(-е) руководитель(-и) Кравченко Наталья Леонидовна, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск*

Введение

Кариес – самое распространенное заболевание у детей раннего возраста. Многие родители не знают о факторах риска возникновения кариеса у детей раннего возраста.

Цель исследования

Анализ информированность родителей о факторах риска возникновения раннего детского кариеса.

Материалы и методы

Нами было проведено анкетирование родителей детей 3-х лет, посещающих УО «Детский сад №5» г.Пинска, по факторам риска развития раннего детского кариеса. Данные были статически обработаны.

Результаты

У 73,3% опрошенных родителей дети находились на грудном вскармливании. Только 43,3% детей питались рационально. У 60% детей имело место ночное кормление. 40% детей болеют простудными заболеваниями от трёх раз в течение года. Уход за полостью рта осуществляется у всех детей, но у 14,8% - на 6-м месяце, когда прорезывается первый зуб, а у 44,1% - после первого года жизни. С помощью родителей 80% детей чистят зубы 1 раз в день. 10% детей не посещает стоматолога, 10% - только по необходимости, 56,7% - 1 раз в год, 16,7% - 2 раза в год, 6,67% - 3 и более раз в год. 46,7% опрошенных пользуются пастой без содержания фтора, а 53,3% - с содержанием 500ppm. 40% мам имеют не санированную полость рта. 26,7% мам посещает стоматолога 2 раза в год. Имеют место такие слюнные контакты, как поцелуи в губы, облизывание соски, проба еды, пережевывание пищи. Наиболее часто встречаются поцелуи в губы и проба еды. 40% пап имеют не санированную полость рта. 13,3% пап посещает стоматолога 2 раза в год. Имеют место такие слюнные контакты, как поцелуи в губы и проба еды.

Выводы

Родители недостаточно информированы о факторах риска возникновения раннего детского кариеса. В норме вскармливание естественное в течение одного года. Число кормлений не более 5 в день (3 основных и 2 промежуточных). Ночное кормление отсутствует. Гигиенический уход необходимо осуществлять с момента прорезывания зубов.