

## **Клиническая картина алкогольного делирия на современном этапе**

*Молчан Ирина Александровна, Ватаман Вероника Александровна*

*Белорусский государственный медицинский университет, Минск*

*Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, доцент Копытов Андрей*

*Васильевич, Белорусский государственный медицинский университет, Минск*

### **Введение**

Алкогольный делирий - это актуальная проблема нашего общества. Большое количество зависимых людей обуславливает постоянное появление новых случаев психоза. Перед врачами стоит важная задача диагностики и лечения таких больных. В связи с изменением картины мира, меняется и клиническая картина делирия, что следует учитывать при диагностике и лечении.

### **Цель исследования**

Определить клиническую картину алкогольного делирия в современных условиях для улучшения качества диагностики.

### **Материалы и методы**

В своей работе мы использовали результаты опроса 30-ти пациентов из которых 20 субъектов (66,7%) мужского пола и 10(33,3%) женского. Сельскими жителями являлись 9 (30 %) человек, городскими 21(70%).

### **Результаты**

В клинической картине делирия у 63,3% лиц общей выборки наблюдались зоопсии. У 86,7% отмечалась выраженная тревога в структуре психоза. Нарушение того или иного вида ориентировки можно отметить у 26,7% субъектов. Бредовые идеи преследования имели место у 53,3% исследуемых. Дезориентировка преимущественно (87,5%) наблюдалась у лиц со страхом перед нанесением физического воздействия со смертельным исходом. У 20% отмечали бредовые идеи отношения. Испытывали страх перед нанесением физического воздействия со смертельным исходом 43,3%. Клиническая картина психоза не зависела от пола, однако следует отметить, что у всех лиц женского пола не отмечалось дезориентировки, а среди мужчин таковых было 60%. Существенных отличий в клинической картине не наблюдалось в зависимости от места жительства, за исключением, страха перед нанесением физического воздействия со смертельным исходом, который был более характерен для сельских жителей (66,7%) по сравнению с городскими (33,3%;  $p < 0,05$ ).

### **Выводы**

В ходе работы мы пришли к выводам, что клиническая картина алкогольного делирия протекает с преобладанием зоопсий, выраженной тревоги, бредовыми идеями преследования. Для сельских жителей более типичным является наличие страха перед нанесением физического воздействия со смертельным исходом.