

## **Анализ причин депульпирования зубов по ортопедическим показаниям**

*Петражицкая Надежда Викторовна, Петражицкая Галина Викторовна*

*Белорусский государственный медицинский университет, Минск*

*УЗ "13-я городская стоматологическая поликлиника" г.Минска, Минск*

*Научный(-е) руководитель(-и) – Беляй Александр Михайлович, Белорусский*

*государственный медицинский университет, Минск*

### **Введение**

Эндодонтические вмешательства перед ортопедическим лечением производятся как в рамках общей подготовки к протезированию (плановой санации), так и специальной (депульпирование по ортопедическим показаниям). Несмотря на достижения стоматологов в области дезинфекции и obturation корневых каналов, достаточно велико количество осложнений, таких как развитие различных форм периодонтитов, а также кариес опорных зубов.

### **Цель исследования**

Анализ причин депульпирования зубов по ортопедическим показаниям в рамках специальной подготовки полости рта к протезированию.

### **Материалы и методы**

Исследование проведено на основании полученных данных в результате анкетирования стоматологов-ортопедов и стоматологов-терапевтов, а также ретроспективного анализа причин депульпирования зубов по ортопедическим показаниям по данным медицинской документации. Для анкетирования была использована специально разработанная для данного исследования анкета. Анкетирование проведено индивидуально, анкеты заполнялись респондентами самостоятельно.

### **Результаты**

В результате исследования отмечено, что при изготовлении металлокерамических коронок многие специалисты проводят тотальное депульпирование зубов. Наш анализ показывает, что депульпирование зубов по ортопедическим показаниям часто проводится без всякого обоснования. В то время как депульпирование зубов должно проводиться по строгим медицинским показаниям. Использование врачами диагноза «травматический пульпит» противоречит протоколам, а «депульпирование по ортопедическим показаниям» не фигурирует в МКБ-10. В связи с отсутствием четких рекомендаций по использованию МКБ-10 при депульпировании врач не всегда может обосновать свою тактику, подтвердив ее диагнозом из международной классификации. В результате возникают конфликтные ситуации и страдает качество стоматологической помощи. Проведение анализа частоты развития осложнений, возникших после депульпирования зубов, по данным медицинской документации является затруднительным (из-за малого количества записей в картах, а также единичных задокументированных случаях осложнений).

### **Выводы**

Депульпирование ведет к снижению твердости тканей зуба и устойчивости к жевательной нагрузке, создание доступа к корневым каналам в процессе эндодонтического лечения приводит к нарушению архитектуры зуба. Таким образом, депульпирование зубов, как вид специальной подготовки полости рта к протезированию, должно проводиться по строгим показаниям.