

## **Ближайшие и отдалённые последствия после лечения варикозной болезни нижних конечностей**

*Мацукова Татьяна Ивановна, Хромец Алексей Владимирович*

*Белорусский государственный медицинский университет, Минск*

*Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Семенчук Игорь Демьянович, Белорусский государственный медицинский университет, Минск*

### **Введение**

Варикозная болезнь (ВБ) продолжает лидировать среди заболеваний периферического сосудистого русла/ Данное заболевание проявляется прежде всего ухудшением качества жизни пациентов: снижение социальной и физической активности, работоспособности, ухудшение психоэмоционального состояния. Основным методом лечения ВБ нижних конечностей, является хирургический, позволяющий излечиться на любой стадии заболевания.

### **Цель исследования**

Выяснение ближайших и отдалённых результатов лечения ВБ нижних конечностей, их влияние на качество жизни пациентов.

### **Материалы и методы**

Работа основана на изучении результатов оперативного лечения больных с ВБ, которые были оперированы в 5 ГКБ 1 хирургическом отделении за период с октября 2014 года по январь 2016 года.

### **Результаты**

Возраст прооперированных составил от 26 до 71 года, средний возраст - 49 лет. Мужчин – 30 %, женщин – 70%. Операций выполненных по методу флебэктомии по Бэбкокку-25%, эндовенозной лазерной коагуляции(ЭВЛК) - 25%, комбинированной флебэктомии- 50%. Осложнений в послеоперационном периоде не возникало. У 18 % пациентов возникают симптомы ВБ в отдалённом послеоперационном периоде после проведения флебэктомии по Бэбкокку.

### **Выводы**

ЭВЛК и комбинированная флебэктомия являются наиболее оптимальными видами оперативного лечения ВБ, так как при их проведении не было выявлено осложнений в ближайшем и отдалённом послеоперационном периоде среди опрошенных.