

**Луговая Т. С., Синелёва М. В.**

*Международный государственный экологический университет имени А.Д.Сахарова,  
г. Минск, Республика Беларусь*

## **ПОКАЗАТЕЛИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ТУБЕРКУЛЕЗОМ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ**

Эпидемическая ситуация с туберкулезом в республике остается напряженной. Прежде всего, это связано с особенностями современного отрицательного патоморфоза туберкулеза, характеризующегося острым прогрессирующим течением процесса, преобладанием лекарственно-устойчивых форм. Появились новые группы риска по заболеванию туберкулезом, в частности мигранты из стран с высоким уровнем распространенности туберкулеза, ВИЧ-инфицированные, а также лица, прибывшие из пенитенциарных учреждений.

Цель работы – изучение уровней, динамики, возрастных, половых, территориальных особенностей заболеваемости туберкулезом в Республике Беларусь в 2011–2012 гг. Для многофакторного анализа эпидемической ситуации по туберкулезу использовались данные государственного статистического отчета «Отчет о больных туберкулезом и саркоидозом», форма которого утверждена Постановлением Министерства статистики и анализа Республики Беларусь от 01.11.2007 № 377 и ведомственных отчетов, утвержденных Министерством здравоохранения Республики Беларусь.

Было выявлено, что средний показатель заболеваемости всеми формами туберкулеза в Республике Беларусь составлял в 2011 г. 41,2, в 2012 г. 39,6 на 100 тыс. населения. Снижение заболеваемости в 2012 г. по сравнению с 2011 г. составило 4%.

Наиболее высокий уровень заболеваемости всеми формами туберкулеза и туберкулезом органов дыхания в расчете на 100 тыс. населения в 2011 г. и 2012 г. наблюдается в Гомельской и Могилевской областях. По заболеваемости внелегочными формами туберкулеза в 2011 г. и 2012 г. лидируют г. Минск, Гомельская и Могилевская области. Причем самый значительный прирост заболеваемости внелегочным туберкулезом в 2012 г. по сравнению с 2011 г. выявлен в Минской (45,5%) и Гомельской (15,6%) областях.

Средний показатель заболеваемости всеми формами туберкулеза среди угрожающего контингента в Республике Беларусь составлял в 2011 г. 63,2, в 2012 г. 63,7 на 100 тыс. населения. В 2011 г. по данному показателю лидирует Могилевская область (92,5 на 100 тыс.), в 2012 г. – Брестская (117 на 100 тыс.). Заболеваемость туберкулезом детей в Республике Беларусь составляла в 2011 г. 1,8, в 2012 г. 1,5 на 100 тыс. населения. В 2012 г. самый высокий показатель наблюдается по Могилевской области (6,7 на 100 тыс.). Среди больных с впервые установленным диагнозом туберкулеза органов дыхания в 2011–2012 гг. преобладают мужчины (до 70%).

*Lygovaya T. C., Sinelyova M. V.*

### **INCIDENCE RATES OF DIFFERENT FORMS OF TUBERCULOSIS IN THE REPUBLIC OF BELARUS**

There were studied levels, dynamics, age, sex and territorial characteristics of tuberculosis incidence in the Republic of Belarus in 2011 and 2012.