

Влияние срока начала химиотерапии на выход в первую ремиссию пациентов с острыми лейкозами

Яцевич Светлана Борисовна

Белорусский государственный медицинский университет, Минск

Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Полянская Анна Валентиновна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск

Введение

Одним из принципов лечения острых лейкозов является максимально раннее начало химиотерапии с момента установления достоверного диагноза, хотя этот принцип не всегда выполняется в силу различных причин и обстоятельств. Мы решили уточнить вопрос о необходимости раннего начала терапии острых лейкозов.

Цель исследования

Сравнить результаты лечения пациентов с острыми лейкозами при раннем и позднем начале индукционной химиотерапии.

Материалы и методы

Проведен анализ историй болезни 47 пациентов с впервые выявленными острыми лейкозами, находившихся на лечении в отделении гематологии №3 УЗ «9-я городская клиническая больница» г. Минска. Диагноз устанавливался на основании стандартных критериев. Пациентам проводилась риск-адаптированная химиотерапия с целью индукции ремиссии. В группу исключения вошли пациенты с острым промиелоцитарным лейкозом. Использовались непараметрические методы статистики.

Результаты

У 39 пациентов был диагностирован миелоидный лейкоз, а у 8 – лимфобластный. Среди пациентов было 22 мужчины и 25 женщин. Их возраст варьировал от 20 до 74 лет. Медиана возраста – 44 года. Медиана срока от момента постановки диагноза до начала химиотерапии составила 2 дня. Химиотерапия в ранние сроки (менее 7 дней от момента постановки диагноза) была начата у 42 пациентов, из них в ремиссию вышло 34 человека. В поздние сроки (через 7 и более дней) лечение начиналось у 5 пациентов, ремиссия была достигнута у 4-х из них. Согласно критерию Фишера (при уровне значимости $\alpha=0,05$) не было отмечено различий между результатами лечения в группах пациентов с ранними и поздними сроками начала химиотерапии (выход в первую ремиссию или летальный исход на стадии её индукции).

Выводы

1. Срок от момента постановки диагноза до начала химиотерапии не влиял на исход острых лейкозов. 2. При наличии у пациентов с острым лейкозом причин, препятствующих раннему началу химиотерапии, например, сопутствующей патологии или других обстоятельств, очевидно, возможна отсрочка у них начала химиотерапии.