

Божедомова Я. Д.

**ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН
С НОВООБРАЗОВАНИЯМИ ЯИЧНИКОВ**

Научный руководитель канд. мед. наук, доцент Акулич Н. С.

Кафедра акушерства и гинекологии

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск

Актуальность. Частота кист и кистом яичников за последние 10-15 лет выросла с 6 до 25 %. Опухоли яичников встречаются у 0,15-1,3% беременных. Новообразования яичников во время беременности могут осложниться перекрутом ножки, разрывом или нагноением кисты, а также привести к осложненному течению беременности и родов.

Цель: выявление особенностей течения беременности и родов у пациенток с новообразованиями яичников в зависимости от проведённого лечения.

Задачи:

1 Оценить течение беременности и родов у женщин оперированных и неоперированных по поводу новообразований яичников.

2 Определить показания для лапароскопических и лапаротомических операций при наличии новообразований яичников .

3 Провести сравнение и анализ полученных данных.

Материал и методы. Для В работе представлены результаты ретроспективного анализа течения беременности и родов. Исследование проводилось на базе УЗ «1 ГКБ» г.Минска. Пациентки были разделены на 2 группы : 1ая – оперированные по поводу заболевания во время беременности; 2ая- пациентки , которым проводилась консервативная терапия. Средний возраст пациенток составил 27 лет.

Результаты и их обсуждение. В Опухоли яичников ,выявленные во время беременности подлежат оперативному лечению. Наиболее благоприятным является срок 16-18 недель. Наиболее частой жалобой женщин ,вошедших в 1 и 2 группы исследования, является болевой синдром. Анализ данных показывает ,что наиболее частым осложнением в послеоперационном периоде является угроза прерывания беременности.

Выводы:

1 Наиболее оптимальным является оперативное лечение новообразований яичников, выявленных во время беременности , в сроки 16-18 недель.

2 Беременность не является противопоказанием для удаления новообразований лапароскопическим доступом.

3 Наиболее частые осложнения в послеоперационном периоде : угроза прерывания беременности.