

Гомлякова М. Ю.

ИСХОДЫ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН С УГРОЗОЙ ПРЕРЫВАНИЯ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ БЕРЕМЕННОСТИ

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Акулич Н. С.

Кафедра акушерства и гинекологии

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск

Актуальность. Охрана материнства и детства – одно из приоритетных направлений развития государства. А проблема невынашивания беременности была и остается, несмотря на высокоэффективные методы диагностики и лечения, одной из важнейших проблем современного акушерства. Невынашивание беременности – это самопроизвольное ее прерывания в сроки от зачатия до 37 недель, считая с первого дня последней менструации. Кроме большого стресса для беременной женщины, угроза прерывания в ранние сроки влияет на течение беременности и исходы родов.

Цель: изучить исходы беременности и родов у женщин с угрозой прерывания в первой половине беременности.

Задачи:

1 Выявить возможные факторы риска угрозы прерывания беременности на ранних сроках.

2 Изучить течение беременности и исходы родов при угрожающем невынашивании в первой половине беременности.

3 Подтвердить необходимость своевременной диагностики и терапии угрозы прерывания беременности в ранних сроках для предупреждения неблагоприятных исходов.

Материалы и методы. В исследовании участвовали 51 женщина. Критерии включения: молодые женщины (возраст 18-30 лет), первая однoplодная беременность, отсутствие экстрагенитальной патологии, наличие кровянистых выделений из половых путей различной интенсивности. Был проведен ретроспективный анализ историй болезни и историй родов отобранных женщин, находящихся на стационарном лечении в гинекологических и акушерских отделениях УЗ «1 ГКБ» г. Минска в период с 2011 по 2013 гг. по поводу угрозы прерывания беременности, а в дальнейшем по причине родов.

Результаты и их обсуждение. Выявлены особенности семейного статуса и условий труда исследуемых беременных женщин, которые могут служить неблагоприятным психоэмоциональным фоном для течения беременности. Выявлен высокий процент преждевременных родов, раннего излития околоплодных вод и аномалий родовой деятельности.

Выводы:

1 Большое количество социальных факторов риска, даже у соматически здоровых женщин, может провоцировать угрозу прерывания беременности.

2 Течение беременности и родов имеет свои особенности у женщин, перенесших угрозу прерывания в ранние сроки.