

Пуденкова Ю. В.

МАСТОИДИТ - ОСЛОЖНЕНИЕ СРЕДНИХ ОТИТОВ.

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Буцель А. Ч.

Кафедра болезней уха, горла, носа

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск

Актуальность. По данным ВОЗ ежегодно в мире умирает 51000 человек в возрасте до 25 лет от заболеваний так или иначе связанных с острым средним или хроническим средним отитом. Несмотря на то, что клиника и течение осложненного среднего отита в нашу "эру эмпирической антибиотикотерапии широкого спектра действия" претерпела значительные изменения, актуальность проблемы диагностики и лечения различных форм мастоидита не оставляет сомнений. Важность и социальная значимость данного вида патологии состоит в том, что она имеет неблагоприятный, не только функциональный, но и жизненный прогноз, так как нередко может явиться причиной развития тяжелых внутричерепных осложнений.

Цель: усовершенствовать раннюю диагностику осложнений мастоидитов у пациентов с заболеваниями средним отитом.

Задачи: 1 Определить частоту встречаемости мастоидита у пациентов с заболеваниями среднего уха.

2 Определить возрастной состав больных мастоидитом.

3 Определить клиническую симптоматику средних отитов, осложненных мастоидитом.

Материалы и методы. Анализ 312 карт стационарных пациентов лор отделения УЗ «11 городская клиническая больница» г. Минска.

Результаты и их обсуждение. У 4 пациентов (1,3%) был выявлен мастоидит. Все пациенты не имели предшествовавшего госпитализации лечения по данному заболеванию. У 3 из 4 пациентов мастоидит развился на фоне острого гнойного отита, и только у одного - на фоне хронического эпитимо-антральной среднего отита. Все пациенты жаловались на боли в ухе, повышенную температуру тела, головную боль, плохое самочувствие. При отоскопии имели гиперемии, утолщение барабанных перепонки, нависание задне-верхнего сегмента наружного слухового прохода, гнойные выделения из уха. Все пациенты получили хирургическое лечение в первые сутки поступления в стационар. Кроме хирургического лечения все пациенты получили антибактериальную терапию. У 3 из 4 пациентов были выявлены сопутствующие гнойные осложнения: у 2 - менингоэнцефалит, у 1 - гнойный менингит, у 1 пациента осложнением явилась флегмона околоушной области.

Выводы: 1 Все пациенты не принимали лечение до поступления в стационар. Оториноларингологический статус был типичный для среднего отита, осложненного мастоидитом.

2 В равной степени было выявлено пациентов мужского и женского пола.

3 Возраст пациентов варьировал от 59 до 66 лет.