

Распространенность трихомониаза в Винницкой области (Украина)

Бардашевская Виктория Олеговна, Скрибан Надежда Сергеевна

Винницкий национальный медицинский университет имени Н.И.Пирогова, Винница

Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, Белошицкая Алина

Васильевна, *Винницкий национальный медицинский университет имени Н.И.Пирогова, Винница,*

кандидат биологических наук, доцент Истошин Валерий Михайлович, Винницкий национальный медицинский университет имени Н.И.Пирогова, Винница

Введение

Урогенитальная трихомонада впервые была описана в 1836 году парижским врачом Альфредом Донни, который обнаружил ее в выделениях из влагалища у женщин, больных гонореей и сифилисом.

Цель исследования

Статистическая оценка распространенности трихомониаза среди населения Винницкой области (Украина).

Материалы и методы

Данные областного статуправления при департаменте здравоохранения.

Результаты

По данным областного клинического кожно-венерологического диспансера города Винницы в 2015 году в поликлинику диспансера за консультацией обратилось 78906 человек, что составляет 100, 2% по отношению к данным по Украине. Из всего количества

больных, обратившихся в 2015 году, страдают от болезней, передающихся половым путем, - 5021 человек (4190 - женщин, 831- мужчин). Выявлено: у 161 человека - урогенитальный микоплазмоз; у 189 пациентов - гонококковую инфекцию; у 227 человек - хламидийную инвазию, передающуюся половым путем; у 327 пациентов - сифилис, а у 4117 пациентов - урогенитальный трихомониаз. На долю больных сифилисом (327 человек) количество женщин составляет 163 человека, мужчин 164 человека. С гоноковой инфекцией обратилась 58 женщина, 131 мужчина. Хламидиоз, передающийся половым путем, обнаружен у 171 женщин и у 56 мужчин. Урогенитальный трихомониаз обнаружен у 3644 женщин и у 473 мужчин. Урогенитальный плазмоз обнаружен у 154 женщин и у 7 мужчин.

Выводы

Мочеполовой трихомониаз имеет большое медицинское и социально-экономическое значение в связи с высокой инфицированностью людей, клиническим полиморфизмом, нередко хроническим течением с рецидивами, поражением различных органов и систем.