

Макарчук А. А., Макарчук А. И.

ИЗМЕНЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ У ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ ЭСТЕТИЧЕСКИХ КОРРЕКЦИЙ НА КОЖЕ ЛИЦА

Научный руководитель: д-р мед. наук, проф. Федотов В. П.

*Кафедра дерматологии и венерологии с курсом эстетической медицины
Запорожский государственный медицинский университет*

Актуальность. Психологический аспект измененной внешности вызывает большой интерес исследователей последние несколько лет в эстетической медицине.

Цели и задачи: провести динамическую количественную оценку качества жизни пациентов при проведении разных способов эстетической коррекции.

Материал и методы. Анкетирование по опроснику SF-36, оценка по шкале депрессивности и индексом удовлетворенности жизнью проводились перед оперативным вмешательством, через 6 месяцев и 2-х лет после операции.

Результаты и их обсуждение. Анализ анкет по качеству жизни в предоперационный период показал, что оценка качества жизни пациентов группы риска и группы без сопутствующей патологии незначительно отличается. Через 6 месяцев после эндоскопического фейслифтинга у пациентов группы риска мы не наблюдали существенных сдвигов по показателям физического функционирования, боли, жизнеспособности. Наиболее существенные результаты в этот период были получены для показателей ролевого функционирования, психологического здоровья, а также эмоционального и социального функционирования. После эндоскопического фронтлифтинга происходило снижение параметров физического функционирования, общего здоровья и жизнеспособности. Следует отметить, что ряд показателей, связанных с психологическим состоянием и социальной функцией, хранились на достаточно высоком уровне. Это касалось показателей ролевого функционирования, психологического здоровья, эмоционального и социального функционирования. При расчете показателя, определенного по шкале депрессии, у пациентов группы риска после выполнения эндоскопического фейслифтинга мы обнаружили достаточно высокий уровень депрессии. Он достоверно снижался через полгода после операции и вновь рос в следующий двухлетний период, однако не достигал предоперационных значений.

Выводы. После проведения фейслифтинга наиболее положительные изменения касаются показателей ролевого, эмоционального и социального функционирования, независимо от вида операции. У пациентов группы риска проведения эндоскопического фейслифтинга сопровождается более положительным влиянием на показатели качества жизни, индекс удовлетворенности жизнью и уровень депрессивности.