

*Шиманская А. Е.*

## **КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВСПЫШКИ КОРИ 2014 ГОДА В Г. МИНСКЕ**

*Научный руководитель канд. мед. наук, ассист. Соловей Н. В.*

*Кафедра инфекционных болезней*

*Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск*

**Актуальность.** Несмотря на несомненные успехи вакцинации, в Европейском регионе продолжают регистрироваться вспышки кори. Эпидемиологическая ситуация в Беларуси зависит от таковой в соседних странах, поскольку большинство случаев заболевания являются завозными или связанными с ними. Уменьшение напряжённости специфического поствакцинального иммунитета с течением времени, а также высокая мобильность взрослого населения обуславливают большую подверженность заболеванию взрослых. Учитывая недостаточную настороженность в отношении кори в условиях эпидемиологического благополучия, а также возможные изменения клинической картины кори у взрослых, ранее вакцинированных лиц, представляется целесообразным изучить особенности клинического течения кори на современном этапе.

**Цель:** описать и проанализировать клиническую картину и изменения лабораторных показателей при кори у взрослых.

**Задачи:**

1 Определить частоту встречаемости отдельных симптомов, лабораторных показателей и их комбинаций при кори.

2 Определить чувствительность и специфичность различных клинических и клинико-лабораторных критериев кори.

3 Выявить клинико-лабораторные особенности течения кори в 2014 г.

**Материал и методы.** Проведён ретроспективный анализ медицинских карт стационарных пациентов с лабораторно подтверждённой корью, находившихся на лечении в МГКИБ в 2014 г. Для определения специфичности критериев были отобраны истории пациентов, которым при поступлении был выставлен в последующем не подтверждённый диагноз “Корь?”. Также были проанализированы карты пациентов, заболевших лабораторно подтверждённой корью в 2006 г.

**Результаты и их обсуждение.** В МГКИБ в 2014 г. пролечено 26 пациентов с лабораторно подтверждённой корью. Описано и проанализировано течение кори в 2014 и 2006 г., определены чувствительность и специфичность различных критериев кори, выявлены особенности течения заболевания в вспышку 2014 г.

**Выводы:**

1 Критерии ВОЗ для случая, подозрительного на корь, обладают высокой чувствительностью, но малой специфичностью, и малопригодны для выявления пациентов с митигированной формой кори.

2 В вспышку кори 2014 г. наблюдалось большее количество гематологических осложнений, а также необычных видов сыпи, реже заболевание протекало с фебрильной лихорадкой.