

*Гула С. Н., Коледа В. Е*  
**ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ ОТЛИЧИЯ  
ТУБЕРКУЛЁЗА И ЛИМФОГРАНУЛЕМАТОЗА ВНУТРИРУДНЫХ  
ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ**

*Научный руководитель ассист. Алесина Г. А.  
Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии  
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск*

При многих заболеваниях происходят изменения в лимфатических узлах, в том числе при туберкулёзе и лимфогранулематозе. В настоящее время увеличивается частота встречаемости данных заболеваний. Поэтому важно проводить своевременную дифференциальную диагностику лимфогранулематоза и туберкулёза лёгких. Поражение внутригрудных лимфатических узлов наблюдается при такой форме туберкулёза, как туберкулёзный бронхоаденит. Это наиболее распространённая форма туберкулёза у детей и подростков (50 – 80 % в структуре всех форм). Лимфогранулематоз – это гиперпластический опухолевый процесс с преимущественным поражением лимфатических узлов и селезёнки. Внутригрудные лимфатические узлы при лимфогранулематозе поражаются в 40,4 % случаев. Характер изменений лимфатических узлов при этих заболеваниях имеет сходные диагностические признаки.

Рентгенологическое исследование является одним из методов диагностики лимфогранулематоза и туберкулёза лёгких. На основе литературных данных внутригрудные лимфатические узлы при туберкулёзе и лимфогранулематозе сравнивались между собой по следующим признакам: размер, форма, четкость контуров, преимущественно поражаемые группы лимфатических узлов. Эти признаки определяют особенности данных заболеваний на рентгенограммах.

Знание сходных и отличительных признаков на рентгенограммах изменённых внутригрудных лимфатических узлов при туберкулёзе и лимфогранулематозе помогут дифференцировать эти заболевания на ранних стадиях их развития. Рентгенологическое исследование вместе с другими методами диагностики позволит поставить грамотный диагноз, что предопределяет правильный выбор лечения.