

ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕМОРРОЯ У ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ

Научный руководитель ассист. Салмин Р. М.

1-я кафедра хирургических болезней

Гродненский государственный медицинский университет,

г. Гродно

Актуальность. Геморрой является одним из самых распространенных заболеваний человека. Вертикальное положение тела, особенности диеты, сидячий труд и адинамия - основные факторы, влияющие на широкое распространение данного заболевания. Геморроем страдает более 10% всего взрослого населения в возрасте 30 – 50 лет. Эти больные составляют 15 -28% от общего числа проктологических пациентов. Мужчины болеют в 3 – 4 раза чаще, чем женщины.

Цель: изучить особенности распространения и лечения хронического геморроя у взрослого населения.

Задачи:

1 Выявить распространённость и применяемые методы лечения геморроя у взрослого населения.

Материал и методы. Исследования проведены на базе проктологического отделения УЗ «Гродненская областная клиническая больница» за 2009 год. Было изучено 983 истории болезни пациентов, из них 210 историй болезни с диагнозом хронический геморрой. Сбор материала осуществлялся путем выкопировки, предусмотренных программой исследования, признаков.

Результаты и их обсуждение. По результатам нашего исследования количество пациентов с диагнозом хронический геморрой в УЗ «ГОКБ» за 2009 год составило 210 случаев ($21,4 \pm 2,8\%$). Средний возраст пациентов 46 лет. Мужчины болеют хроническим геморроем в 136 случаях ($64,8 \pm 3,3\%$), а женщины в 74 случаях ($35,2 \pm 3,3\%$). Для лечения пациентов с хроническим геморроем наиболее часто применялась операция геморроидэктомия по Миллиган – Моргану в 149 случаях ($71,0 \pm 3,1\%$), которая является «золотым стандартом». Кроме того, в 4 случаях ($1,9 \pm 0,9\%$) проводилась геморроидопексия по методу Лонго; 57 пациентов ($27,1 \pm 3,1\%$) от операции воздержались.

Выводы:

1 Пациентов с хроническим геморроем $21,4 \pm 2,8\%$ от общего числа всех проктологических пациентов.

2 Мужчины болеют чаще хроническим геморроем $64,8 \pm 3,3\%$, чем женщины $35,2 \pm 3,3\%$ случая.

3 Средний возраст пациентов 46 лет.

4 В лечении пациентов с хроническим геморроем наиболее часто применялась операция геморроидэктомия по Миллиган – Моргану в $71,0 \pm 3,1\%$ случаях, которая является «золотым стандартом».

Бурим М. Г., Дубовский Е. В.