

Гарагулов М. Ш.

**МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗМЕНЕНИЙ
СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ ПАЗУХИ
ПРИ ОДОНТОГЕННЫХ СИНУСИТАХ**

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Пархимович Н. П.

Кафедра челюстно-лицевой хирургии

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск

Актуальность. Одонтогенные синуситы – частое осложнение при заболеваниях верхнечелюстной пазухи (от 24% до 50%).

Цель: изучение морфологических изменений слизистой верхнечелюстных пазух при одонтогенных синуситах.

Задачи:

1 Проведение анализа морфологических изменений слизистой верхнечелюстных пазух по архивным данным гистологических исследований.

2 На основании давности заболевания изучит морфологические изменения слизистой верхнечелюстных пазух.

Материал и методы. Нами проанализированы морфологические исследования слизистой верхнечелюстных пазух у 48 пациентов, оперированных на базе 1-го отделения челюстно-лицевой хирургии 11 ГКБ.

Результаты и их обсуждение. Выявлены следующие изменения слизистой верхнечелюстных пазух: разрастание соединительной ткани с хроническим воспалением (у 5 пациентов); гиперплазия слизистой оболочки (в 6 случаях); полипозные разрастания (25 пациентов); антролиты (2 пациента); псевдокисты (в 3-х случаях); истинные риногенные кисты (5 пациентов).

Выводы:

1 На основании полученных результатов отмечается прямая зависимость патологических изменений слизистой верхнечелюстных пазух от длительности заболевания.

2 В зависимости от характера изменений слизистой верхнечелюстных пазух применяли соответствующую тактику хирургического вмешательства.