

Рыжикова М. А., Соловьева А. Ю.

КОСТНОПЛАСТИЧЕСКАЯ АМПУТАЦИЯ В СРЕДНЕЙ ТРЕТИ БЕДРА (ПО ДАННЫМ ОТДЕЛЕНИЯ ГНОЙНОЙ ХИРУРГИИ УЗ «2ГКБ Г.МИНСКА» ЗА 2011-2014 ГОДЫ)

Научный руководитель ассист. Клюй Е. А.

*Кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск*

Цель: проанализировать причины выбора и ход костнопластической ампутации в средней трети бедра по данным отделения гнойной хирургии УЗ «2ГКБ г. Минска» за 2011 - 2014 годы.

Задачи:

- 1 Изучить частоту выполнения ампутаций в средней трети бедра.
- 2 Изучить частоту выполнения костнопластических ампутаций в средней трети бедра.
- 3 Проанализировать причины выбора костнопластической ампутации в средней трети бедра.

Материалы и методы. Произведен анализ данных историй болезни пациентов отделения гнойной хирургии УЗ «2ГКБ г. Минска». В 2011 году было выполнено 89 ампутаций, в 2012 — 54, в 2013 — 81, в 2014 - 96. Из них в средней трети бедра 47 (53%), 36 (67%), 59 (73%), 63 (66%) в 2011, 2012, 2013, 2014 годах соответственно. В 2011 и 2012 годах костнопластические ампутации в средней трети бедра не выполнялись, в 2013 году их проведено 13 (22% от ампутаций в средней трети бедра и 16% от всех ампутаций), в 2014 году — 21 (33% и 22% соответственно).

Результаты и обсуждение. Костнопластическая ампутация в средней трети бедра по данным отделения гнойной хирургии УЗ «2ГКБ г. Минска» проводится в два этапа: на первом выделяется костный трансплантат из малоберцовой кости с кортикальным слоем толщиной до 2 мм, на втором проводится непосредственно ампутация в средней трети бедра с трансплантацией выделенного ранее костного фрагмента в костно-мозговой канал опиленного бедренной кости. Выполнение костнопластической ампутации целесообразнее с точки зрения уменьшения сроков заживления культи и лучших возможностей последующего протезирования конечности.

Выводы:

- 1 Больше половины (53% - 2011 год, 67% - 2012 год, 73% - 2013 год, 66% - 2014 год) ампутаций выполняется в средней трети бедра.
- 2 В 2011 и 2012 годах костнопластические ампутации в средней трети бедра не выполнялись, в 2013 году их проведено 13 (22% от ампутаций в средней трети бедра и 16% от всех ампутаций), в 2014 году — 21 (33% и 22% соответственно).
- 3 Выполнение костнопластической ампутации целесообразнее с точки зрения уменьшения сроков заживления культи и лучших возможностей последующего протезирования конечности.