

*Шепетъко М. Н., Корень Т. А., Минайло Т. И., Колобухоеа. Э.*

**РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОК  
ПОСЛЕ ОРГАНОСОХРАНЯЮЩХ ОПЕРАЦИЙ И СТАНДАРТНОЙ  
МАСТЕКТОМИИ ПО ПОВОДУ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ**

*Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск*

Проведен анализ результатов лечения 136 пациенток, которым было проведено радикальное лечение по поводу рака молочной же-

зы I-IIа стадии в Минском городском клиническом онкологическом диспансере в 2007-2009 гг. Пациентки сопоставлялись в соответствии с критериями TNM рака молочной железы, объемом хирургического вмешательства, количеством курсов адьювантной полихимиотерапии, телегамматерапии и гормонотерапии. Эффективность проведенного лечения оценивалась в соответствии с частотой местных рецидивов и отдаленных метастазов, общей выживаемостью и выживаемостью, свободной от прогрессирования. t-тест Стьюдента использовался в качестве критерия достоверности.

В результате наблюдения за пациентками, которым было проведено комбинированное лечение по поводу рака молочной железы I-IIа стадии, установлено, что 5-летняя бессобытийная выживаемость (свободная от рецидивов и метастазов) после радикальной резекции по поводу рака молочной железы составила 77,3 %, тогда как после мастэктомии она была существенно выше — 89,7 %.

При сопоставлении пациенток по возрасту, критериям TNM/pTNM, адьювантной химотерапии, гормонотерапии и послеоперационной телегамматерапии определено, что после органосохраняющих операций риск развития рецидива и прогрессирования заболевания достоверно выше, чем после мастэктомии.