

*Маляревич С. П., Левша Е. С.*  
**СТРУКТУРА И ТЕНДЕНЦИИ ОСТРЫХ ХИРУРГИЧЕСКИХ  
СОСТОЯНИЙ, ПОТРЕБОВАВШИХ ЭКСТРЕННОГО  
ОПЕРАТИВНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА**

*Научный руководитель Гинюк В. А.*

**Актуальность и научная новизна.** Основными проблемами экстренной хирургии являются послеоперационные осложнения и высокая летальность. Зная современные закономерности острой хирургической патологии, врач может выстроить для себя алгоритм обследования экстренного больного, своевременно поставить правильный диагноз и избежать осложнений.

**Цель работы:** определить тенденции urgentных состояний пациентов, прооперированных в УЗ «3-я ГКБ им. Е.В. Клумова» в период с 2008 по 2012 гг. включительно.

**Объект и методы исследования.** Объектом исследования являются журналы экстренных оперативных вмешательств УЗ «3-я ГКБ им. Е.В. Клумова». Методом ретроспективного анализа были определены структура, тенденции и закономерности urgentных хирургических состояний пациентов, прооперированных в УЗ «3-я ГКБ им. Е.В. Клумова» за 2008-2012 гг. включительно.

**Полученные результаты и выводы:**

1. В структуре urgentной хирургической патологии острый аппендицит составляет 57%, острый холецистит 22,6%, ущемлённые грыжи 7%, осложнённая язвенная болезнь желудка и ДПК 6%, острая кишечная непроходимость (ОКН) 4%, острый панкреатит 3%, желудочно-кишечные кровотечения 0,4%.

2. Отмечается тенденция к увеличению числа экстренных оперативных вмешательств по поводу острого аппендицита у пациентов в возрасте старше 40 лет и снижению в возрасте 20-40 лет.

3. Острый холецистит значительно преобладает у женщин (67-78%) Выявлена тенденция к увеличению числа случаев данной патологии в возрастной группе 20-40 лет. Наблюдается стойкое увеличение встречаемости острого холецистита летом.

4. Отмечено увеличение числа экстренных операций по поводу ущемлённых грыж среди других urgentных патологий (от 3 до 7%). Наибольшее количество случаев наблюдается в возрастной группе старше 60 лет.

5. Для осложнённой язвенной болезни желудка и ДПК отмечено увеличение числа случаев в возрасте 20 - 40 лет. Наблюдается значительное сокращение разницы между частотой встречаемости осложнённой язвенной болезни желудка и осложнённой язвенной болезни ДПК. Данная патология в подавляющем числе случаев распространена среди мужчин.

6. Отмечается тенденция к увеличению числа экстренных оперативных вмешательств по поводу ОКН в возрасте старше 60 лет, что связано с увеличением встречаемости данной патологии, возникшей на фоне опухоли толстой кишки.

7. Отмечается уменьшение количества экстренных операций по поводу острого панкреатита среди других urgentных патологий (от 3 до 1%).

**Уровень внедрения:** кафедра общей хирургии БГМУ, УЗ «3-я ГКБ им. Е.В. Клумова».