

*Савицкая В. В.*  
**ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ  
И КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ У ПАЦИЕНТОК С ШИЗОФРЕНИЕЙ**  
*Научный руководитель Хоменко Н. В.*

**Актуальность и научная новизна.** В последние десятилетия много внимания стало уделяться изучению когнитивного дефицита при шизофрении, в частности, выделилось такое понятие, как «социальные когнитивные функции». Прицельное внимание в исследованиях когнитивного дефицита у больных шизофренией, особенно в социальных и микро-социальных контактах обусловлено интересом не только научного, но и реабилитационного характера с перспективой повлиять на прогрессивность заболевания и отсрочить социально-трудовую дезадаптацию этих пациентов.

**Цель работы:** определение особенностей эмоционального восприятия и исполнительных функций у пациенток с шизофренией.

**Объект и методы исследования.** Для исследования были отобраны 26 пациенток женского пола, страдающих шизофренией (согласно критериям МКБ 10), проходивших лечение в ГУ «РНПЦ психического здоровья» и давших согласие на участие в исследовании. Контрольную группу составили здоровые женщины (27 человек), без каких-либо психических расстройств, не имеющие родственников с шизофренией. Группы были сопоставимы по возрасту и образованию ( $p < 0,05$ ).

Оценка эмоционального восприятия производилась с помощью компьютеризированной нейропсихологической батареи (PennCNP) для изучения нейропсихологического функционирования Лаборатории проблем мозга Пенсильванского университета. Оценка исполнительских функций проводилась с помощью программы «Нейродиагностикум» (Висконсинский тест сортировки карточек). Результаты исследования обрабатывались с помощью статистической программы SPSS, версия 17,0 для Windows. Для оценки различий между основной и контрольной группой использовался непараметрический критерий Манна-Уитни (Mann-Wittney Test).

**Полученные результаты и выводы:**

1. Пациентки, страдающие шизофренией, обнаруживают дефицит в восприятии эмоций по сравнению с контрольной группой, для них характерно снижение памяти на лица, неправильное восприятие эмоций на фотографиях человеческих лиц.
2. В целом пациентки имеют более низкие результаты в тесте на исполнительные функции, по сравнению с контрольной группой.

**Уровень внедрения:** кафедра психиатрии и медицинской психологии БГМУ.