

БИОЛОГИЧЕСКАЯ ХИМИЯ .

ПРАКТИКУМ

**для студентов, обучающихся
по специальностям «Лечебное дело»
и «Педиатрия»**

Минск БГМУ 2018

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
КАФЕДРА БИОЛОГИЧЕСКОЙ ХИМИИ

БИОЛОГИЧЕСКАЯ ХИМИЯ.

ПРАКТИКУМ

Рекомендовано Учебно-методическим объединением
по высшему медицинскому, фармацевтическому образованию
в качестве учебно-методического пособия для студентов
учреждений высшего образования, обучающихся по специальностям
1-79 01 01 «Лечебное дело», 1-79 01 02 «Педиатрия»

2-е издание, исправленное



Минск БГМУ 2018

УДК 577(076.5)(075.8)

ББК 28.072я73

Б63

Авторы: д-р мед. наук, проф. А. Д. Таганович; д-р мед. наук, проф. В. К. Кухта; канд. мед. наук, доц. Э. И. Олецкий; канд. биол. наук, доц. А. В. Колб; канд. мед. наук, доц. Т. В. Василькова; канд. мед. наук, доц. Ж. А. Рутковская; канд. мед. наук, доц. И. Л. Котович; канд. мед. наук, доц. Е. А. Девина; канд. хим. наук, доц. Н. Н. Ковганко; канд. биол. наук, доц. Е. М. Барабанова; канд. мед. наук, ст. преп. Л. П. Лисицына; канд. биол. наук, ассист. Н. И. Гронская; ассист. З. И. Полякова; ст. лаб. Л. А. Фефилова

Рецензенты: д-р биол. наук, проф., проректор по учебной работе и международным связям Витебского государственного ордена Дружбы народов медицинского университета Н. Ю. Коневалова; каф. биологической химии Гродненского государственного медицинского университета

Биологическая химия. Практикум : учебно-методическое пособие для студентов, обучающихся по специальностям «Лечебное дело» и «Педиатрия» / А. Д. Таганович [и др.]. – 2-е изд., испр. – Минск : БГМУ, 2018. – 200 с.

ISBN 978-985-21-0056-4.

Изложены рекомендации для самоподготовки к лабораторным и итоговым занятиям по биологической химии. Последовательность разделов и тем соответствует учебным планам. В каждой теме приведены цель и значимость ее усвоения для практической медицины, рекомендуемая литература, вопросы для обсуждения, тестовые задания, описание лабораторных работ, заготовки протоколов для их выполнения. Даны вопросы к итоговым контрольным занятиям и экзамену. Первое издание вышло в 2017 году.

Предназначено для студентов 2-го курса лечебного, педиатрического, военно-медицинского факультетов и медицинского факультета иностранных учащихся.

УДК 577(076.5)(075.8)
ББК 28.072я73

Учебное издание

**Таганович Анатолий Дмитриевич
Кухта Виктор Климентьевич
Олецкий Эдуард Иванович и др.**

БИОЛОГИЧЕСКАЯ ХИМИЯ. ПРАКТИКУМ

Учебно-методическое пособие для студентов, обучающихся по специальностям
«Лечебное дело» и «Педиатрия»

2-е издание, исправленное

Ответственный за выпуск А. Д. Таганович
Компьютерная вёрстка Н. М. Федорцовой

Подписано в печать 19.06.18. Формат 60×84/8. Бумага офсетная.

Ризография. Гарнитура «Times».

Усл. печ. л. 23,25. Уч.-изд. л. 12,3. Тираж 691 экз. Заказ 429.

Издатель и полиграфическое исполнение: учреждение образования
«Белорусский государственный медицинский университет».

Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя,
распространителя печатных изданий № 1/187 от 18.02.2014.
Ул. Ленинградская, 6, 220006, Минск.

ISBN 978-985-21-0056-4

© УО «Белорусский государственный
медицинский университет», 2018

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ В ХИМИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ

К работе в химических лабораториях допускаются лица, прошедшие инструктаж по охране труда и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

Обучающиеся обязаны выполнять требования по охране труда, пожарной безопасности, знать порядок действий при пожаре, места расположения средств пожаротушения.

При работе в лаборатории возможно воздействие на работающих следующих опасных и вредных производственных факторов:

- химические ожоги при попадании на кожу или в глаза едких химических веществ;
- термические ожоги при неаккуратном использовании спиртовками и нагревании жидкостей;
- порезы рук при небрежном обращении с лабораторной посудой;
- отравление парами или газами высокотоксичных химических веществ;
- возникновение пожара при неаккуратном обращении с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями;

Работать в помещении лаборатории разрешается только в присутствии преподавателя.

Работа с химическими веществами без спецодежды и наличия необходимых средств защиты глаз, органов дыхания, кожных покровов запрещается.

Перед зажиганием спиртовки нужно удостовериться, что корпус ее исправен, фитиль выпущен на нужную высоту и распущен, а горловина и держатель фитиля сухие.

Зажженную спиртовку нельзя переносить с места на место, нельзя зажигать спиртовку от другой.

Гасить спиртовку нужно, накрывая пламя фитиля колпачком. Задувать пламя запрещается.

Каждый обучающийся должен выполнять лабораторные работы на закрепленном за ним учебном месте, не загромождать его посторонними предметами. Переход на другое рабочее место без разрешения преподавателя не допускается.

Перед выполнением лабораторной работы студент обязан изучить методику и требования по ее безопасному применению.

Пролитые на пол или стол вещества обучающиеся могут обезвредить и удалить под руководством преподавателя или лаборанта.

Обучающимся запрещается покидать лабораторию, оставляя без присмотра зажженные спиртовки и другие нагревательные приборы.

СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ, СВОЙСТВА БЕЛКОВ И ПЕПТИДОВ. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ БЕЛКОВ

ЗАНЯТИЕ 1

ВВЕДЕНИЕ В ПРАКТИКУМ. ВВЕДЕНИЕ В БИОХИМИЮ.

СТРОЕНИЕ АМИНОКИСЛОТ И ПЕПТИДОВ. КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ БЕЛКА В БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЯХ

Актуальность темы. Аминокислоты после всасывания используются в организме для синтеза специфических тканевых белков, ферментов, гормонов, гема, биогенных аминов, пуриновых и пиримидиновых азотистых оснований. В печени из аминокислот синтезируются белки плазмы крови. Методы количественного определения белка в биологических жидкостях (растворах) широко используются в медицинской практике. Количественное определение содержания белка в сыворотке (плазме) крови проводят для диагностики целого ряда заболеваний.

Цель занятия: закрепить знания о строении и физико-химических свойствах аминокислот как структурных единиц белков и пептидов; изучить свойства пептидной связи; усвоить общие принципы количественного определения содержания белка в биологических жидкостях.

Требования к исходному уровню знаний. Для полного усвоения темы необходимо повторить из:

- *общей химии:*
 - правила работы в химических лабораториях;
 - *биоорганической химии:*
 - аминокислотный состав белков;
 - строение аминокислот, номенклатура;
 - классификация и общие свойства аминокислот;
 - пептиды, электронное и пространственное строение пептидной связи;
 - классификация и функции белков;
 - *медицинской и биологической физики:*
 - закон Бугера–Ламберта–Бера;
 - устройство и принцип работы колориметра.

Для проверки исходного уровня знаний выполните следующие задания:

Задание 1. Какая из перечисленных аминокислот является нейтральной?

А. Гистидин. Б. Аланин. В. Аспартат. Г. Лизин.

Задание 2. Выберите аминокислоту, которая не обладает оптической активностью:

А. Аланин. Б. Цистеин. В. Глицин. Г. Аргинин.

Задание 3. Назовите аминокислоту, содержащую кольцо индола:

А. Оксализин. Б. Серин. В. Триптофан. Г. Пролин. Д. Гистидин.

Задание 4. Выберите α -аминоислоту:

А. Оксализин. Б. Серин. В. Триптофан. Г. Пролин. Д. Гистидин.

Задание 5. Олигопептид — это соединение, которое содержит:

А. 2 остатка аминокислот. В. 10 остатков аминокислот.
Б. 9 остатков аминокислот. Г. 12 остатков аминокислот.

Задание 6. Белок — это соединение, которое содержит:

А. 15 остатков аминокислот. В. 49 остатков аминокислот.
Б. 28 остатков аминокислот. Г. 120 остатков аминокислот.

Задание 7. Какие функции присущи только белкам?

- А. Энергетическая. Б. Каталитическая. В. Буферная. Г. Структурная.

Правильность решений проверьте, сопоставив их с ответами.

Вопросы для обсуждения:

1. Предмет, цели и задачи биохимии. Объекты и методы исследований в биохимии.
2. Аминокислоты, классификация, общие свойства.
3. Пептидная связь, свойства (рентгеноструктурный анализ, постулаты Полинга–Кори).
4. Пептиды, строение. Классификация и биологическая роль пептидов.
5. Белки как класс органических веществ, биологические функции. Классификация белков.
6. Количественное определение белка биуретовым методом. Построение калибровочного графика и работа с ним.

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ

1. *Биологическая химия* / В. К. Кухта [и др.]. Москва : Бином, Минск : Асар, 2008. С 3–4, 7–18, 21–32, 39–40.
2. *Биологическая химия* / А. Д. Таганович [и др.]. Минск : Выш. шк., 2013. С. 5–19, 29–31.
3. Конспект лекций.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Задание 1. Молекула аминокислоты, находящаяся в изоэлектрической точке:

- А. Имеет положительный заряд. Б. Не имеет заряда. В. Имеет отрицательный заряд.

Задание 2. В изоэлектрической точке белок:

- А. Имеет наименьшую растворимость.
Б. Является катионом.
В. Является амфиионом.
Г. Обладает наибольшей степенью ионизации.

Задание 3. В какой среде пептид Ала-Гис-Лиз-Фен будет двигаться к катоду при электрофорезе?

- А. Кислой. Б. Нейтральной. В. Щелочной.

Задание 4. Выберите правильные утверждения:

- А. Биуретовую реакцию дают все аминокислоты.
Б. Биуретовую реакцию дает биурет.
В. Биуретовую реакцию дают трипептиды.
Г. Биуретовую реакцию дают белки.

Правильность решений проверьте, сопоставив их с ответами.

ПРОВЕРЬТЕ ВАШИ ЗНАНИЯ (САМОКОНТРОЛЬ УСВОЕНИЯ ТЕМЫ)

Задание 1. В клинической лаборатории для целей парентерального питания смесь аминокислот (Гли, Ала, Глу, Лиз, Арг, Сер, Асп) разделяют методом электрофореза при pH = 6,0. Какие аминокислоты будут двигаться к аноду, какие — к катоду, а какие останутся на месте?

Задание 2. Подберите к каждому белку соответствующую функцию:

- | | |
|--------------------|--------------------|
| 1. Коллаген. | А. Структурная. |
| 2. Иммуноглобулин. | Б. Сократительная. |
| 3. Инсулин. | В. Транспортная. |
| 4. Гемоглобин. | Г. Каталитическая. |
| 5. Актин. | Д. Защитная. |

- 6. Кератин.
- 7. Родопсин.
- 8. Альбумин.
- Е. Гормональная.
- Ж. Рецепторная.
- З. Токсическая.

Задание 3. Свойство поглощать световой поток с длиной волны 280 нм при спектрофотометрии обусловлено наличием в белке:

- А. Триптофана.
- Б. Пролина.
- В. Гистидина.
- Г. Тирозина.

Задание 4. В клинику поступил ребенок 3-х лет с пищевым отравлением. Жалобы: диарея, рвота. При биохимическом анализе крови концентрация общего белка — 100 г/л. Данный показатель характеризует:

- А. Абсолютную гиперпротеинемию.
- Б. Нормопротеинемию.
- В. Относительную гипопротеинемию.
- Г. Относительную гиперпротеинемию.

Ответы к решению заданий

Для самопроверки исходного уровня знаний:

- 1 — Б.
- 2 — В.
- 3 — В.
- 4 — Г.
- 5 — А, Б, В.
- 6 — Г.
- 7 — Б.

Для самостоятельной работы:

- 1 — Б.
- 2 — А.
- 3 — А, Б.
- 4 — Б, В, Г.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА (60 минут)

Количественное определение общего белка биуретовым методом

Среди различных методов определения общего белка в сыворотке (плазме) крови наибольшее распространение получили колориметрические методы, а среди них — метод, основанный на биуретовой реакции. Он обладает специфичностью определения, точностью и доступностью. Другой колориметрический метод — метод Лоури — сочетает использование биуретовой реакции и реакции восстановления реагента Фолина циклическими аминокислотами (тироzinом, фенилаланином, триптофаном). Хотя этот метод и более чувствителен, но он сложен по приготовлению основного раствора и менее специфичен, т. к. целый ряд других веществ образуют с реагентом Фолина комплексы характерной окраски.

Принцип метода. Метод основан на образовании окрашенного в фиолетовый цвет комплекса пептидных связей белка с ионами двухвалентной меди (сульфата меди) в щелочной среде. Интенсивность окраски раствора прямо пропорциональна концентрации белка в сыворотке и определяется фотометрически.

Ход работы. В 1-ю пробирку (опыт) наливают 0,1 мл исследуемой сыворотки, во 2-ю (контроль) — 0,1 мл 0,9 % раствора хлорида натрия. В обе пробирки приливают по 5 мл биуретового реагента. Содержимое пробирок осторожно перемешивают, избегая образования пены, и через 30 мин фотометрируют опытную пробу в кюветах 10 мм при зеленом светофильтре (длина волны — 540 нм) против контрольного раствора. Определив экстинкцию исследуемого раствора, находят по калибровочному графику, какой концентрации белка (в г/л) она соответствует.

Построение калибровочной кривой. Для построения кривой готовят из основного стандартного раствора белка с концентрацией 100 г/л рабочие растворы альбумина: 20, 40, 60, 80, 100 г/л. Для этого к 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1 мл стандартного раствора белка добавляют 0,8; 0,6; 0,4; 0,2; 0 мл 0,9 % раствора NaCl. Из каждого разведения берут по 0,1 мл раствора и вносят в пробирки, содержащие по 5 мл биуретового реагента. Через 30 мин измеряют экстинкцию стандартных проб на ФЭК против контроля, данные заносят в таблицу (см. следующую страницу). Ставят график, откладывая на оси абсцисс значения концентрации стандартных растворов белка (в г/л), на оси ординат — соответствующие им величины оптической плотности.

Результат:

Данные для построения калибровочной кривой:

C , г/л	20	40	60	80	100
E (оптическая плотность)					



Данные, полученные при исследовании образца сыворотки:

$$E_{op.} = \quad C_{op.} =$$

Клинико-диагностическое значение. Нормальное содержание общего белка в сыворотке крови (нормопротеинемия) у взрослых — 65–85 г/л, у детей до 6 лет — 56–85 г/л. Изменения концентрации общего белка могут быть как абсолютные, так и относительные. Относительные изменения связаны с изменением объема крови (плазмы). Так, относительная гипопротеинемия (понижение концентрации белка в крови) развивается при гидрении, т. е. нагрузке водой, водном отравлении, а относительная гиперпротеинемия (повышение концентрации белка в крови) возникает при сгущении крови из-за значительных потерь жидкости при поносах, неукротимой рвоте, усиленном потоотделении, холере, ожогах. Абсолютная гипопротеинемия наблюдается при нефритах, злокачественных опухолях, алиментарной дистрофии. Абсолютная гиперпротеинемия встречается сравнительно редко, например, при миеломной болезни, хронических полиартритах.

Вывод:**Подпись преподавателя:**

ЗАНЯТИЕ 2
УРОВНИ СТРУКТУРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ БЕЛКОВЫХ МОЛЕКУЛ.
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА БЕЛКОВ.
ВЫСАЛИВАНИЕ И ОСАЖДЕНИЕ БЕЛКОВ

Актуальность темы. Изучение физико-химических свойств белков необходимо для понимания механизмов развития многих патологических состояний (например, отеков), механизмов транспорта веществ (в том числе лекарственных препаратов). На знании физико-химических свойств белков основано их получение и использование в качестве лекарственных препаратов. Реакции осаждения используются в медицине для качественного и количественного определения белка в биологических жидкостях, для удаления белков из растворов. Пробы коллоидустойчивости используются для функциональной диагностики болезней внутренних органов.

Цель занятия: закрепить знания о первичной структуре белка и ее роли в формировании пространственных структур молекулы; сформировать представление о конформационных состояниях белковой молекулы и значении пространственной структуры в функционировании белков; познакомиться с возможностями применения денатурации белков в медицинской практике; усвоить значение реакций гидролиза белков для процессов жизнедеятельности и в медицинской практике.

Требования к исходному уровню знаний. Для полного усвоения темы необходимо повторить из:

- *физико-коллоидной химии:*
 - учение о растворах;
 - свойства белковых растворов как коллоидных систем;
 - растворимость белка;
- *биоорганической химии:*
 - понятие об уровнях структурной организации белковых молекул;
 - денатурация и денатурирующие факторы;
 - механизм гидролиза.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ ИСХОДНОГО УРОВНЯ ЗНАНИЙ:

Задание 1. Укажите свойства, характерные для грубодисперсных систем:

- А. Интенсивное броуновское движение частиц.
- Б. Термодинамическая неустойчивость.
- В. Опалесценция.
- Г. Седиментация.

Задание 2. Укажите свойства, отличающие суспензии от истинных растворов:

- А. Прозрачность.
- Б. Термодинамическая устойчивость.
- В. Гетерогенность.
- Г. Мутность.

Задание 3. Укажите свойства, характеризующие коллоидные растворы:

- А. Низкое осмотическое давление.
- Б. Светорассеяние.
- В. Для частиц дисперсной фазы характерна седиментация.
- Г. Высокая диффузия частиц дисперсной фазы.

Задание 4. Методы очистки коллоидных растворов основаны на следующих свойствах (выберите правильные варианты):

- А. Размеры частиц дисперсной фазы больше размеров частиц примесей.
- Б. Концентрация частиц дисперсной фазы больше концентрации частиц примесей.

- В. Диффузии частиц примесей через фильтр.
Г. Диффузии частиц примесей через мембрану.

Правильность решений проверьте, сопоставив их с ответами.

Вопросы для обсуждения:

1. Первичная, вторичная, надвторичная, третичная, четвертичная структуры белковой молекулы (понятие, разновидности и связи, стабилизирующие структуру).
2. Этапы и методы исследования аминокислотного состава и аминокислотной последовательности белков и пептидов (методы Сэнджера, Эдмана, Акабори, ферментативные).
3. Правила написания пептидов (белков), их названия и определения заряда.
4. Конформационные изменения при функционировании белков. Взаимодействие белков с лигандами.
5. Денатурация. Обратимость денатурации. Механизмы действия денатурирующих факторов.
6. Гидролиз белка, его виды. Значение реакций гидролиза белка для организма и практическое использование белковых гидролизатов в медицинской практике.
7. Общие физико-химические свойства белков (вязкость растворов, незначительная диффузия, оптическая активность, подвижность в электрическом поле, поглощение УФ-лучей, растворимость в воде). Факторы устойчивости белковых растворов.
8. Высаливание белков (обратимое осаждение), необратимое осаждение белков.

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ

Основная

1. *Биологическая химия* / В. К. Кухта [и др.]. Москва : Бином, Минск : Асап, 2008. С. 21, 24–25, 28–39.
2. *Биологическая химия* / А. Д. Таганович [и др.]. Минск : Выш. шк., 2013. С. 16–29, 31–34.
3. Конспект лекций.

Дополнительная

1. *Ленинджер, А. Основы биохимии* / А. Ленинджер. М. : Мир, 1985.
2. *Биохимия человека* / Р. Марри [и др.]. М. : Мир, 1993.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Задание 1. Вспомните уровни структурной организации белков и основные связи, участвующие в их формировании.

1.1. Подберите к каждому уровню структурной организации белка соответствующее понятие, обозначенное буквой:

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. Первичная структура. | A. Пространственное расположение отдельного участка полипептидной цепи, содержащей α -спирали и β -структуры. |
| 2. Вторичная структура. | B. Порядок чередования аминокислот в полипептидной цепи. |
| 3. Надвторичная структура. | C. Объединение в определенном порядке двух или большего количества протомеров в молекуле олигомерного белка. |
| 4. Третичная структура. | D. Расположение в пространстве всей полипептидной цепи, имеющей в своем составе α -спирали и β -структуры. |
| 5. Четвертичная структура. | E. Полипептидная цепь, которая стабилизируется пептидными связями между остатками аминокислот. |

1.2. Какому уровню структурной организации белка соответствует каждый пронумерованный тип связи? Подберите пары:


- А. Связь между карбоксильными и аминогруппами радикалов аминокислот.
Б. Связь между α -амино- и α -карбоксильными группами аминокислот.
В. Связь между радикалами цистеина.
Г. Водородные связи между пептидными группировками.
Д. Водородные связи между радикалами аминокислот.
Е. Межрадикальные гидрофобные взаимодействия.

1. Первичная структура.
2. Вторичная структура.
3. Третичная структура.
4. Четвертичная структура.

Задание 2. Вспомните, что:

- белковые молекулы имеют центры связывания (активные центры) с другими веществами (лигандами);
- активные центры формируются из аминокислотных остатков, сближенных на уровне третичной структуры;
- связи между белком и лигандом могут быть нековалентные и ковалентные;
- белки проявляют высокую специфичность при присоединении лигандов к центрам связывания;
- специфичность взаимодействия белков с лигандами обеспечивается комплементарностью структуры активного центра структуре лиганда.

В активный центр белка входят два остатка аргинина, один остаток фенилаланина и один остаток валина:



Ответьте на вопросы:

- А. Какой из перечисленных лигандов (А, Б, В, Г) с наибольшей вероятностью будет взаимодействовать с активным центром данного белка и почему?
Б. Какие типы связей возникают в процессе образования комплекса «белок – лиганд»?

Задание 3. Вспомните основные реагенты и условия, вызывающие денатурацию. Ответьте на вопросы:

- 3.1. Денатурация белка сопровождается:
- А. Изменением конформации белка.
 - Б. Уменьшением растворимости белка.
 - В. Изменением заряда белка.
 - Г. Нарушением первичной структуры белка.

3.2. Белки денатурируют в клетке в результате (выберите правильные ответы):

- А. Повышения температуры.
- Б. Изменения рН.
- В. Действия протеолитических ферментов.
- Г. Разрыва слабых связей, поддерживающих конформацию белка.
- Д. Синтеза белков теплового шока.

Задание 4. Запомните строение и функции гемоглобина и миоглобина. Умейте дать сравнительную характеристику структуры и свойств этих белков. Ответьте, что происходит в ходе оксигенации гемоглобина:

- А. Изменение конформации первого протомера, затем второго и т. д.
- Б. Одновременное изменение конформаций всех протомеров.
- В. Изменение связей между протомерами.
- Г. Изменение валентности железа в гемах протомеров.

Задание 5. Вспомните, что белки являются амфолитами. Степень ионизации катионных и анионных групп, а, следовательно, и заряд молекулы белка, зависит от значения рН среды.

5.1. Определите суммарный заряд пентапептида при рН = 7: Глу-Арг-Лиз-Вал-Асп. Как изменится заряд этого пептида: а) при рН < 7; б) при рН > 7?

5.2. Усвойте понятия «изоэлектрическое состояние» и «изоэлектрическая точка» белка.

Ответьте, при каких значениях рН устойчивость растворов белков с изоэлектрическими точками 4,8; 5,3 и 6,1 будет наименьшей и почему?

Задание 6. Вспомните факторы, влияющие на растворимость белков. Ответьте, чем определяется растворимость белков в водной среде:

- А. Ионизацией белковой молекулы.
- Б. Гидратацией белковых молекул при растворении.
- В. Формой молекулы белка.
- Г. Способностью связывать природные лиганды.

Задание 7. Выберите правильный ответ. Гидролиз — это:

- А. Образование гидратных оболочек.
- Б. Распад полимеров до мономеров с участием воды.
- В. Присоединение воды к молекуле без ее распада.
- Г. Образование воды во время реакции.

Правильность решений проверьте, сопоставив их с ответами.

ПРОВЕРЬТЕ ВАШИ ЗНАНИЯ (САМОКОНТРОЛЬ УСВОЕНИЯ ТЕМЫ)

Задание 1. Подберите верные пары утверждений:

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. Неполярные радикалы аминокислот. | А. Предпочтительное расположение — на поверхности белковой молекулы. |
| 2. Полярные анионные радикалы. | Б. Взаимодействие их функциональных групп формирует вторичную структуру. |
| 3. Оба. | В. Предпочтительное расположение — внутри белковой молекулы. |
| 4. Ни один. | Г. Участвуют в формировании третичной структуры. |

Задание 2. Центр связывания белка с лигандом представляет собой (выберите наиболее полный ответ):

- А. Совокупность радикалов аминокислот, сближенных на уровне третичной структуры.
- Б. Фрагмент полипептидной цепи.
- В. Участок поверхности белковой молекулы, комплементарный лиганду.

Г. Простетическую группу белка.

Д. Фрагмент пептидного остава.

Задание 3. Лигандом α -протомера гемоглобина может быть:

А. Гем. Г. 2,3-Бисфосфоглицерат.

Б. Кислород. Д. α -Протомер.

В. β -Протомер.

Задание 4. Подберите верные пары утверждений:

А. Нативная рибонуклеаза. 1. Молекулы белка имеют одинаковую конформацию.

Б. Денатурированная 2. Молекулы белка имеют одинаковую первичную структуру.
рибонуклеаза. 3. У молекул нарушено связывание с природным лигандом.

В. Обе. 4. Молекулы имеют различную молекулярную массу.

Г. Ни одна.

Задание 5. Пептид ферментативного гидролизата, не передвигающийся в электрическом поле при электрофорезе, дэнсилировали и выделили дэнсилп производное Лей. Кислотный гидролиз пептида дал три пептида следующего состава: 1) Цис, Асп; 2) Тир, Лей; 3) Тир, Асп, Арг. Напишите формулу пептида, назовите пептид. В какой среде проводили электрофорез исходного гидролизата белка? Почему Вы так решили?

Задание 6. Трипсин гидролизует пептидные связи, образованные COOH группами диаминомонокарбоновых кислот. Трипсиновый гидролизат фракционировали методом электрофореза, и пептид с низкой подвижностью прогидролизовали кислотой. Получили 3 пептида следующего состава: 1) Лей, Мет; 2) Лей, Арг, Глу; 3) Мет, Тир. Напишите формулу пептида. Назовите его. В какой среде проводили электрофорез трипсинового гидролизата? Объясните свой выбор.

Ответы к решению заданий

Для самопроверки исходного уровня знаний:

1 — А, Г. 2 — В, Г. 3 — А, Б, В. 4 — А, Г.

Для самостоятельной работы:

1.1. Б, Е — 1; Г — 2; А — 3; Д — 4; В — 5; 1.2. 1 — Б, В; 2 — Г; 3 — А, В, Д, Е; 4 — А, В, Д.

2 — А — лиганд Б; Б — ионные, гидрофобные. 3.1 — А, Б; 3.2 — А, Б, Г. 4 — А. 5.1 — «0», а) «++», б) «—»; 5.2 — при pH = ИЭТ. 6 — А, Б, В. 7 — Б.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА (60 минут)



Работа 1. Высаливание белков.

Высаливание — обратимая реакция осаждения белков из раствора с помощью больших концентраций нейтральных солей: NaCl, $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$, MgSO₄.

При высаливании происходит дегидратация молекул белка. На процесс высаливания влияет ряд факторов: гидрофильность белка, его относительная молекулярная масса, заряд, в связи с чем для высаливания различных белков требуется разная концентрация одних и тех же солей. Альбумины осаждаются в насыщенном р-ре $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$, а глобулины — в полунасыщенном растворе $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$, так как у глобулинов большая молекулярная масса и меньший заряд, чем у альбуминов.

Высаливание белков — обратимая реакция, так как осадок белка может вновь растворяться после уменьшения концентрации солей путем диализа или разведения водой.

В соответствии с положением ионов в ряду Гофмейстера, хлорид натрия осаждает белки слабее, чем сульфат аммония, вследствие его меньшей дегидратирующей способности:



Разделение альбуминов и глобулинов яичного белка

Ход работы. К 20 каплям яичного белка добавляют 20 капель насыщенного р-ра $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ и перемешивают. Выпадает осадок яичного глобулина. Через 5 мин осадок отфильтровывают, используя бумажный фильтр. В фильтрате остается другой белок — яичный альбумин. К фильтрату добавляют измельченный порошок сульфата аммония до полного насыщения, т. е. пока новая порция порошка остается нерастворенной. Выпавший осадок альбумина также отфильтровывают. С фильтратом проводят биуретовую реакцию: к фильтрату добавляют 2 капли 1 % р-ра CuSO_4 + 5 капель 10 % р-ра NaOH . Отрицательная биуретовая реакция (голубое окрашивание) указывает на отсутствие белка в исследуемом растворе.

Результат:

Вывод:

Работа 2. Осаждение белков.

Необратимое осаждение (денатурация белка) приводит к нарушению пространственной структуры белка и потере им биологических свойств. При необратимых реакциях осаждения белки претерпевают глубокие изменения и не могут быть растворимы в первоначальном растворителе. К необратимым реакциям относятся: осаждение белка солями тяжелых металлов, минеральными и органическими кислотами, алкалоидными соединениями и осаждение при кипячении.

2.1. Осаждение белков солями тяжелых металлов.

Осаждение белков солями тяжелых металлов, в отличие от высыпания, происходит при небольших концентрациях солей. Белки при взаимодействии с солями тяжелых металлов (свинца, меди, серебра, ртути и др.) адсорбируют их, образуя солеобразные и комплексные соединения, растворимые в избытке этих солей (за исключением солей нитрата серебра и хлорида ртути), но нерастворимые в воде. Растворение осадка в избытке солей называется *адсорбционной пептизацией*. Это происходит вследствие возникновения одноименного положительного заряда на частицах белка.

Схема постановки опыта:

Реактивы	1-я пробирка	2-я пробирка
Раствор яичного белка	5 капель	5 капель
1 % р-р сульфата меди	1–2 капли	—
5 % р-р нитрата серебра	—	1–2 капли
<i>Отметить образование осадка</i>		
1 % р-р сульфата меди (избыток)	5–10 капель	—
5 % р-р нитрата серебра (избыток)	—	5–10 капель
<i>Отметить растворение осадка</i>		

Способность белка прочно связывать ионы тяжелого металла в виде нерастворимых в воде осадков используется как противоядие при отравлениях солями ртути, меди, свинца и т. д. Сразу после отравления, пока соли еще не успели всосаться и находятся в желудке, пострадавшему дают выпить молоко или белок куриного яйца, а затем вызывают рвоту, чтобы удалить яд из организма.

Вывод:

2.2. Осаждение белков концентрированными минеральными кислотами.

Концентрированные минеральные кислоты вызывают денатурацию белка и образуют комплексные соли белка с кислотами. Ортофосфорная кислота осадка не дает. В избытке всех минеральных кислот, за исключением азотной, выпавший осадок белка растворяется.

Схема постановки опыта:

Реактивы	1-я пробирка	2-я пробирка
HNO ₃ (конц.)	10 капель	–
H ₂ SO ₄ (конц.)	–	10 капель
Осторожно, по стенке пробирки, добавляют белок	10 капель	10 капель
<i>Отметить появление осадка на границе раздела фаз</i>		
Избыток HNO ₃ (конц.)	10 капель	–
Избыток H ₂ SO ₄ (конц.)	–	10 капель
<i>Отметить растворение осадка</i>		

Вывод:

Подпись преподавателя:

ЗАНЯТИЕ 3

МЕТОДЫ РАЗДЕЛЕНИЯ, ВЫДЕЛЕНИЯ И ОЧИСТКИ БЕЛКОВ.

СЛОЖНЫЕ БЕЛКИ. ГЕЛЬ-ФИЛЬТРАЦИЯ

Актуальность темы. Особенности строения и функционирования организма зависят от набора белков, которые в нем синтезируются. Белки выполняют в организме самые разнообразные функции, которые всегда определяются их структурой. Для изучения строения и свойств белков их необходимо выделить из клетки и очистить от других белков и неорганических примесей.

Цель занятия: закрепить знания о физико-химических свойствах белков для того, чтобы понять методы разделения и очистки белков, а также принципы функционирования белков в организме; освоить метод гель-фильтрации.

Требования к исходному уровню знаний. Для полного усвоения темы необходимо повторить из:

- общей химии;
- физико-химические свойства дисперсных систем;
- основы хроматографии и электрофореза.

Задания для самопроверки исходного уровня знаний:

Задание 1. Электрофорез коллоидных растворов и растворов белков применим для:

- A. Очистки воды.
- B. Определения заряда эритроцитов.
- C. Очистки лекарственных препаратов.
- D. Разделения белков.

Задание 2. Скорость электрофореза растворов белков зависит от:

- A. Величины заряда макроиона белка.
- B. Формы макроиона белка.
- C. Вязкости раствора.
- D. pH раствора.

Задание 3. Все хроматографические методы основаны на:

- A. Различии в размерах молекул разделяемых веществ.
- B. Различии в скоростях передвижения отдельных компонентов смеси в подвижной фазе.
- C. Различии в степени распределения веществ между подвижной и стационарной фазами.
- D. Многократном повторении актов сорбции и десорбции разделяемых веществ.

Задание 4. Степень распределения разделяемых веществ между стационарной и подвижной фазами (коэффициент распределения) количественно выражается:

- A. Концентрацией вещества в подвижной фазе.
- B. Соотношением концентраций вещества в стационарной и подвижной фазах.
- C. Соотношением скоростей перемещения различных компонентов смеси.
- D. Концентрацией вещества в неподвижной фазе.

Задание 5. В какой последовательности выйдут при вымывании их растворителем из колонки, заполненной активированным углем, следующие пигменты, если степень их полярности возрастает в ряду: каротин < ксантофиллы < α -хлорофилл < β -хлорофилл?

- A. Ксантофиллы, каротин, α -хлорофилл, β -хлорофилл.
- B. Каротин, ксантофиллы, α -хлорофилл, β -хлорофилл.
- C. β -хлорофилл, α -хлорофилл, ксантофиллы, каротин.
- D. Каротин, ксантофиллы, β -хлорофилл, α -хлорофилл.

Правильность решений проверьте, сопоставив их с ответами.

Вопросы для обсуждения:

1. Методы разделения белков:
 - 1) высадивание;
 - 2) хроматография (адсорбционная, распределительная, ионообменная, аффинная, гель-хроматография);
 - 3) электрофорез (на бумаге, в полиакриламидном геле с использованием DDS-Na, изоэлектрофокусирование, иммуноэлектрофорез);
 - 4) ультрацентрифугирование.
2. Сравнительный анализ гомологичных белков (метод Ингрема).
3. Методы очистки белков от низкомолекулярных примесей (диализ, гель-хроматография, кристаллизация, ультрафильтрация).
4. Вестерн-блот (назначение, этапы, молекулярные зонды).
5. Строение и функции сложных белков.

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ**Основная**

1. *Биологическая химия* / В. К. Кухта [и др.]. Москва : Бином, Минск : Асар, 2008. С. 21–28, 40–44.
2. *Биологическая химия* / А.Д. Таганович [и др.]. Минск : Выш. шк., 2013. С. 29–31.
3. Конспект лекций.

Дополнительная

1. *Лениндженер, А.* Основы биохимии / А. Лениндженер. Москва : Мир, 1985.
2. *Биохимия человека* / Р. Марри [и др.]. Москва : Мир, 1993.
3. *Березов, Т. Т. Биологическая химия* / Т. Т. Березов, Б. Ф. Коровкин. Москва : Медицина, 1990. С. 20–28, 65–76.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Задание 1. Вспомните, что заряд белка или пептида зависит от суммы зарядов аминокислот, которые входят в его состав, и от pH раствора, в котором находится данный белок или пептид. Повторите понятия «изоэлектрическая точка» и «изоэлектрическое состояние» белка.

- 1.1. Определите суммарный заряд пептида при pH = 7,0: Глу-Арг-Гис-Вал-Асп-Тре. Как изменится суммарный заряд этого пептида: а) в кислой среде; б) в щелочной среде?
- 1.2. Сравните направление движения в электрическом поле двух пептидов при pH = 7,0 (к катоду или к аноду):
 - а) Сер-Цис-Глу-Тир-Асп;
 - б) Вал-Арг-Мет-Фен-Тир.

Задание 2. Вспомните физико-химические свойства, лежащие в основе методов разделения и очистки белков. Объясните принцип каждого метода и ответьте на вопросы:

- 2.1. Хроматографию применяют для:
 - А. Разделения веществ.
 - Б. Очистки веществ.
 - В. Идентификации веществ.
 - Г. Концентрирования веществ.
- 2.2. Метод ионообменной хроматографии основан на:
 - А. Различии в размерах молекул разделяемых веществ.
 - Б. Избирательном взаимодействии молекул разных веществ со специфическим лигандом.
 - В. Ионообменной адсорбции.
- 2.3. Какие из приведенных методов позволяют разделить смесь белков по молекулярной массе?
 - А. Адсорбционная хроматография.
 - Б. Электрофорез в полиакриламидном геле.

- В. Ультрацентрифугирование.
 Г. Гель-фильтрация.
 Д. Ионообменная хроматография.

2.4. Подберите к пронумерованному методу разделения и очистки белков их соответствующие свойства, на которых основан данный метод:

- | | |
|--|--|
| А. Различия по величине заряда. | 1. Гель-фильтрация. |
| Б. Различия по молекулярной массе. | 2. Электрофорез в полиакриламидном геле. |
| В. Различия по величине заряда и молекулярной массе. | 3. Аффинная хроматография. |
| Г. Различия по другим свойствам. | 4. Ионообменная хроматография. |

Задание 3. Ознакомьтесь с современными методами идентификации белков (блот-анализ) и ответьте на вопрос. В качестве зонда при проведении блот-анализа (вестерн-блот) используют:

- А. Меченные антитела к искомому белку.
 Б. Пероксидазу хрена.
 В. Казеин молока.
 Г. Альбумины.

Задание 4. Выберите верный ответ. Метод «отпечатков пальцев» используется с целью:

- А. Выделения индивидуальных белков.
 Б. Анализа гомологичных белков.
 В. Очистки белков от низкомолекулярных примесей.

Задание 5. Вспомните, что белки кроме аминокислот могут содержать в своем составе другие соединения (углеводы, липиды, ионы металлов и т. д.). Небелковая часть является простетической группой. Такие белки называют сложными. Выучите классификацию сложных белков.

5.1. Выберите сложные белки, у которых связь между белком и простетической группой ковалентная:

- | | |
|--------------------------------|-------------------------|
| А. Гемоглобин. | Г. Интерферон. |
| Б. Цитохром P ₄₅₀ . | Д. Тиреотропный гормон. |
| В. Ихтулин. | |

Правильность решений проверьте, сопоставив их с ответами.

ПРОВЕРЬТЕ ВАШИ ЗНАНИЯ (САМОКОНТРОЛЬ УСВОЕНИЯ ТЕМЫ)

Задание 1. Назовите известные Вам методы, с помощью которых можно разделить смесь белков, приведенных в таблице. Укажите, различия каких физико-химических свойств белков лежат в основе каждого метода разделения.

Название белка	Молекулярная масса, Да	ИЭТ
Церулоплазмин	151 000	4,4
γ-Глобулин	150 000	6,3
β-Лактальбумин	37 000	5,2

Задание 2. В какой последовательности выйдут из колонки, заполненной сефадексом G-200, следующие белки: пепсин ($M = 36000$), миоглобин ($M = 17000$), каталаза ($M = 250000$) при вымывании их растворителем:

- А. Каталаза, пепсин, миоглобин.
 Б. Пепсин, миоглобин, каталаза.
 В. Миоглобин, каталаза, пепсин.
 Г. Миоглобин, пепсин, каталаза.

Задание 3. Подберите к пронумерованному методу разделения и очистки белков соответствующие принципы, на которых основан данный метод:

- | | |
|---|---|
| A. Ультрацентрифугирование. | 1. Метод основан на различной сорбционной способности веществ. |
| B. Гель-фильтрация. | 2. Метод основан на различиях в молекулярной массе белков. |
| C. Электрофорез в поликарбамидном геле. | 3. Метод основан на комплементарном присоединении белка к иммобилизованному лиганду. |
| D. Аффинная хроматография. | 4. В основе метода лежит использование различий в молекулярной массе и заряде белков. |

Задание 4. В 1987 году были установлены критерии для интерпретации серологического теста при проведении Вестерн-блота на СПИД. Эти критерии следующие:

Нет полос	Отрицательная проба
Наличие полос, соответствующих p31 или p24, и полос, соответствующих gp160 или gp120	Положительная проба
Полосы присутствуют, но не соответствуют критериям положительной пробы	Сомнительная проба

gp160 — предшественник белка вирусной оболочки;

gp120 — белок вирусной оболочки;

p24 — белок вирусного ядра;

p31 — обратная транскриптаза.

В таблице (см. ниже) приведены результаты blot-анализа для диагностики СПИДа, проанализируйте полученную картину и ответьте на вопросы:

4.1. Что выявляет этот тест?

- A. Только антитело к вирусу СПИД.
- B. Только антиген вируса СПИД.
- C. Присутствие свободного циркулирующего вируса у пациента.
- D. Присутствие вируса только в инфицированных лимфоцитах.

4.2. Вторичные антитела связывают:

- A. Белки вируса СПИД.
- B. Только антивирусные первичные антитела человека.
- C. Первичное антитело.
- D. Ферментный коньюгат.

4.3. Кто из обследуемых людей является иммунодефицит-положительным по результатам Вестерн-блота?

- A. Пациент A.
- B. Пациенты B и C.
- C. Пациент C.
- D. Пациент B — неопределенный, а пациент C — положительный.

	1	2	A	B	C	Интерпретация полос:
gp160	—			—		1 — вирус + сыворотка (положительный контроль)
gp120	—			—	—	2 — вирус — сыворотка (отрицательный контроль)
p55	—			—		A — пациент A
gp41	—			—		B — пациент B
p31	—			—		C — пациент C
p24	—			—	—	

Ответы к решению заданий

Для самопроверки исходного уровня знаний:

1, 2 — все правильные. 3 — В. 4 — А, Б. 5 — В.

Для самостоятельной работы:

1.1. «0» а) «+ +»; б) «— —»; 1.2. 1) к аноду; 2) к катоду. 2.1 — А, Б, В, Г; 2.2 — В; 2.3 — Б, В, Г; 2.4. 1 — Б, 2 — В, 3 — Г, 4 — А. 3 — А. 4 — Б. 5.1 — В, Г, Д.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА (70 минут)

Колоночная гель-фильтрация. Для гель-фильтрации используют так называемые молекулярные сите — инертные гидратированные полисахаридные молекулы. Их получают из бактериальных полисахаридов (севадекс), агара или полимеризованных акриламидных гелей (акрилекс). При набухании в растворе гранул геля в них образуются поры, через которые могут проходить молекулы разных размеров (в зависимости от величины пор). Молекулы, которые хорошо проникают внутрь гранул, проходят через хроматографическую колонку медленнее, чем более крупные молекулы. Эффективность разделения смеси веществ определяют по составу вытекающего из колонки раствора (элюата).

Ход работы:

1. Колонку для гель-фильтрации закрыть резинкой-заглушкой, поставить в пробирку. Содержимое стаканчика с севадексом перемешать и влить в колонку. Дать отстояться, снять заглушку. Жидкость при этом свободно вытекает из колонки.

2. Из бюретки в пробирку отмерить 1 мл белка (высокомолекулярное соединение) и добавить 3–5 капель рибофлавина (низкомолекулярное соединение).

3. В 12 чистых пробирок отмерить из бюретки по 1 мл биуретового реактива. Колонку поместить в первую пробирку с биуретовым реагентом, удалить слой жидкости над севадексом и внести в колонку разделяемый образец (смесь: белок + рибофлавин).

После погружения нанесенного раствора в севадекс колонку переставить в другую пробирку с биуретовым реагентом, аккуратно заполнить расширенную часть колонки водой и, отсчитав 5–7 капель вытекающей из колонки жидкости, переставить колонку в следующую пробирку. Повторять до выхода белков из колонки (положительная биуретовая реакция), постоянно добавляя в колонку воду.

4. По окончании работы (появление желто-зеленого окрашивания в пробирке с биуретовым реагентом, которое обусловлено вытеканием рибофлавина) содержимое колонки выдывают в стаканчик и ополаскивают колонку водой.

Результат:

№ пробирки	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Цвет раствора												
Вывод (что присутствует в р-ре)												

Вывод:

Подпись преподавателя:

ФЕРМЕНТЫ

ЗАНЯТИЕ 4 ФЕРМЕНТЫ. КЛАССИФИКАЦИЯ, СТРОЕНИЕ, СВОЙСТВА

Актуальность темы. Ферменты — это биологические катализаторы белковой природы, которые контролируют практически все химические процессы, протекающие в живых организмах. В отличие от небелковых катализаторов каждый фермент способен катализировать лишь очень небольшое число реакций, часто только одну.

Знание энзимологии имеет большое значение для подготовки и практической деятельности врача. Многие болезни (врожденные нарушения метаболизма) определяются генетически обусловленными нарушениями в синтезе ферментов. При повреждении клеток (вызванном, например, недостатком кровообращения или воспалением) некоторые ферменты попадают в плазму крови. Измерение активности таких ферментов обычно используется для диагностики многих распространенных заболеваний. Диагностическая энзимология — область медицины, использующая определение активности ферментов для диагностики заболеваний и контроля за эффективностью лечения. Ферменты применяются и в терапии.

Цель занятия: научиться применять знания о свойствах ферментов и ферментном составе органов при последующем изучении метаболизма органов и систем, а также для решения вопросов диагностики, профилактики и лечения болезней, связанных с нарушением функционирования ферментов.

Требования к исходному уровню знаний. Для полного усвоения темы необходимо повторить из:

- *общей химии:*
 - общие закономерности и механизмы протекания химических реакций;
 - основные положения теории катализа;
- *биоорганической химии:*
 - классификация органических реакций по направлению и результатам реакции;
 - свойства и строение белков;
 - строение коферментов, биологическая роль;
 - качественные реакции на крахмал и глюкозу, используемые для оценки степени гидролиза крахмала.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ ИСХОДНОГО УРОВНЯ ЗНАНИЙ

Задание 1. Катализаторы увеличивают скорость реакции, так как:

- А. Изменяют свободную энергию реакции.
- Б. Уменьшают скорость обратной реакции.
- В. Изменяют состояние равновесия реакции.
- Г. Уменьшают энергию активации.

Д. Избирательно увеличивают скорость прямой реакции, но не увеличивают скорость обратной реакции.

Задание 2. Подберите соответствующие пары вопрос – ответ:

- | | |
|------------------------|---|
| А. Водородные связи. | 1. Участвуют в образовании вторичной структуры. |
| Б. Ионные связи. | 2. Участвуют в формировании первичной структуры. |
| В. Гидрофобные связи. | 3. Участвуют в формировании третичной структуры. |
| Г. Пептидные связи. | 4. Участвуют в формировании четвертичной структуры. |
| Д. Дисульфидные связи. | |

Задание 3. Назовите коферменты, структура которых изображена схематически ниже:

3.1. Изоаллоксазин – рибitol – остаток фосфорной кислоты – остаток фосфорной кислоты – рибоза – аденин.

3.2. Никотинамид – рибоза – остаток фосфорной кислоты – остаток фосфорной кислоты – рибоза – аденин.

Задание 4. Вам даны четыре пробирки с неизвестными растворами. Проделав реакцию с реагентом Люголя, получили следующие окраски: 1) синяя; 2) бурая; 3) желтая; 4) фиолетовая.

4.1. В какой пробирке произошел полный гидролиз крахмала?

А. В первой пробирке. В. В третьей пробирке.

Б. Во второй пробирке. Г. В четвертой пробирке.

4.2. Какое вещество образовалось при кратковременном гидролизе крахмала?

А. Глюкоза. Б. Декстрины. В. Сахароза.

Правильность решений проверьте, сопоставив их с ответами.

Вопросы для обсуждения:

1. Особенности ферментов как белковых катализаторов.
2. Современная классификация ферментов и номенклатура ферментов (систематическое и рабочее названия). Шифр ферментов. Общая характеристика классов.
3. Строение ферментов. Коферменты, их классификация и роль в катализе. Блок-схемы структуры НАД⁺, НАДФ⁺, ФАД и ФМН.
4. Кинетика ферментативных реакций. Зависимость скорости ферментативных реакций от концентрации субстрата, pH, температуры (молекулярный механизм, графическая зависимость). Константа Михаэлиса (K_m), использование K_m для прогнозирования протекания биохимических реакций.
5. Специфичность действия ферментов. Виды специфичности.
6. Единицы активности ферментов.

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ

Основная

1. Биологическая химия / В. К. Кухта [и др.]. Москва : Бином, Минск : Асар, 2008. С. 46–49, 53–54, 56–66.
2. Биологическая химия / А. Д. Таганович, [и др.]. Минск : Выш. шк., 2013. С. 38–56, 62–68.
3. Конспект лекций.

Дополнительная

1. Лениндженер, А. Основы биохимии / А. Лениндженер. Москва : Мир, 1985. С. 226–241.
2. Биохимия человека / Р. Марри [и др.]. Москва : Мир, 1993.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Задание 1. Обратите внимание на то, что катализаторы:

- а) увеличивают скорость химической реакции;
- б) в процессе реакции не расходуются;
- в) в равной степени катализируют как прямую, так и обратную реакции.

1.1. Запомните, что белковая природа ферментов обусловливает специфичность их действия.

1.2. Подберите соответствующие пары вопрос – ответ:

- | | |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| 1. Увеличивают энергию активации. | А. Небиологические катализаторы. |
| 2. В процессе реакции не расходуются. | Б. Ферменты. |
| 3. Неспецифичны. | В. Обе группы катализаторов. |
| 4. Ингибируются аналогами субстрата. | Г. Ни один из катализаторов. |

1.3. Запишите, в общем виде, реакцию с участием фермента, используя символы: S-субстрат, Е-фермент, ES-промежуточный комплекс, Р-продукт.

1.4. Назовите основные факторы, влияющие на активность ферментов.


Решите задачу. Оптимальные условия для действия глутаматдегидрогеназы: $t = 37^\circ\text{C}$, $\text{pH} = 7,5$. При изменении температуры инкубационной пробы до 75°C и pH инкубационной среды до 4,5 скорость ферментативной реакции снизилась на 50 %. Объясните причину снижения скорости реакции.

Задание 2. Запомните, чтобы назвать ферменты по написанным реакциям, требуется:


- сравнить структуру субстратов и продуктов;
- определить тип превращения.

2.1. Укажите класс и название ферментов, катализирующих следующие реакции:

2.1.1.



2.1.2.



Задание 3. Изобразите схематически структуру коферментов: НАД⁺, НАДФ⁺, ФАД, ФМН.

Задание 4. Рассчитайте удельную активность ацетилхолинэстеразы, если 5 мг фермента за 30 с расщепляют 200 мкмоль ацетилхолина.

Задание 5. Нормальные клетки способны превращать аспарагиновую кислоту в аспаргин. Некоторые лейкозные клетки лишены этой способности. Добавление аспарагиназы (фермента, расщепляющего аспарагин) в кровь больных лейкозом может привести к гибели раковых клеток. Какой вид специфичности проявляет этот фермент?

- А. Относительную. Б. Абсолютную. В. Стереоспецифичность.

Правильность решений проверьте, сопоставив их с ответами.

ПРОВЕРЬТЕ ВАШИ ЗНАНИЯ (САМОКОНТРОЛЬ УСВОЕНИЯ ТЕМЫ)


Задание 1. В лаборатории выделили фермент лизоцим и определили его активность при различных значениях pH среды. Установили, что ферментативная активность лизоцима максимальна при pH 5,2 и уменьшается как при снижении, так и при повышении этого значения pH. Укажите возможную причину:

- А. Изменение конформации молекулы фермента.
- Б. Утрата комплементарности активного центра и субстрата.
- В. Изменение ионизации функциональных групп фермента.
- Г. Гидролиз пептидных связей фермента.
- Д. Уменьшение свободной энергии реакции.

Задание 2. Экспериментально доказали, что активный центр фермента лизоцима содержит аминокислотные остатки глутаминовой и аспарагиновой кислот, необходимых для катализа. Какие группы в составе субстрата функционально важны для фермента?

- А. Аминогруппы.
- Б. Карбоксильные группы.
- В. Тиогруппы.
- Г. Алкильные радикалы.
- Д. Гидроксильные группы.

Задание 3. Температура 37 °C, pH 7,5 — оптимальные условия для действия лактатдегидрогеназы (ЛДГ), катализирующей превращение:



3.1. Объясните причины уменьшения активности фермента:

- а) при повышении температуры до 60 °C;
- б) при хранении фермента в буферном растворе с pH 5,0;

3.2. Рассчитайте удельную активность фермента, если за 5 с 10 мг ЛДГ вызывает превращение 80 мкмоль пирувата; запишите размерность этой величины.

3.3. По изменению концентрации каких веществ можно определить активность ЛДГ?

Ответы к решению заданий

Для самопроверки исходного уровня знаний:

- 1 — Г; 2 (1 – А; 2 – Г, **Д**; 3 – А, Б, В, Д; 4 – А, Б, В, Д);
- 3.1 — ФАД; 3.2 — НАД⁺; 4.1 — В; 4.2 — Б.

Для самостоятельной работы:

- 1.2 (1 – Г; 2 – В; 3 – А; 4 – Б).

1.4. При повышении температуры до 75 °C скорость ферментативной реакции снижается, так как вследствие денатурации количество активных молекул фермента уменьшается.

От pH зависят:

- ионизация аминокислотных остатков, включенных в катализ;
- ионизация субстрата;
- конформация фермента и его активного центра.

2.1.1. Лигаза, пируваткарбоксилаза.

2.1.2. Лиаза, фумаратгидратаза.

4. Международные единицы: 1,33 мккатал/мг фермента; стандартные единицы: 80 мкмоль/мин/мг фермента.

5 — Б.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА (60 минут)

Работа 1. Изучение влияния различных факторов на скорость ферментативных реакций.

1.1. Определение активности амилазы слюны и ее термолабильности.

Одним из характерных свойств ферментов является термолабильность, т. е. чувствительность фермента к температуре, при которой протекает ферментативная реакция. Для большинства ферментов температурный оптимум наблюдается при 38–40 °С. Ферменты при нагревании выше 70 °С, как правило, утрачивают свойства биологических катализаторов.

Гидролиз крахмала под действием α -амилазы слюны происходит до стадии образования декстринов. Нерасщепленный крахмал с йодом дает синее окрашивание. Декстрины, в зависимости от размера, дают с йодом различное окрашивание: амилодекстрины — фиолетовое, эритродекстрины — красно-буровое, мальтоза — желтое. Конечные продукты гидролиза крахмала — мальтоза и глюкоза — имеют свободные альдегидные группы и могут быть обнаружены реакцией Троммера.

О действии фермента судят по уменьшению количества субстрата или появлению продуктов реакции.

Ход работы. В чистую пробирку отливают небольшое количество неразведенной слюны (2–3 мл) и кипятят ее в течение 5 мин, после чего охлаждают. В 3 пробирки наливают по 10 капель 1 % раствора крахмала. В 1-ю пробирку добавляют 10 капель некипяченой слюны, разведенной в 10 раз, во 2-ю — 10 капель прокипяченной слюны, в 3-ю — 10 капель воды в качестве контроля. Все пробирки помещают в термостат при температуре 38 °С на 10 мин. После этого с содержимым пробирок проводят качественные реакции на крахмал и продукты его расщепления.

Реакция на крахмал. К 5 каплям исследуемого раствора приливают 1 каплю раствора йода в йодиде калия (реактив Люголя). В присутствии крахмала появляется синее окрашивание.

Реакция на глюкозу (реакция Троммера). К 5 каплям исследуемой жидкости приливают 5 капель 10 % раствора NaOH и 3 капли 1 % раствора сульфата меди. Осторожно кипятят 1 мин до появления красного окрашивания, которое указывает на наличие глюкозы.

Результаты опыта запишите в виде таблицы:

№ пробирки	Реакция с реагентом Люголя	Реакция Троммера
1 (некипяченая слюна)		
2 (прокипяченная слюна)		
3 (H_2O)		

Вывод:

1.2. Влияние pH среды на активность ферментов.

Для разных ферментов существует свой оптимум pH, при котором фермент наиболее активен. Например, для пепсина оптимум pH — 1,5–2,5, для аргиназы — 9,5. Определите оптимум pH для амилазы слюны по следующей методике.

Ход работы. Слюну предварительно разводят водой в 10 раз. Берут 3 пробирки и в каждую наливают по 2 мл буферного раствора с различным значением pH: 6,0; 6,8; 8,0. Затем приливают по 1 мл 1 % раствора крахмала и по 1 мл разведенной слюны. Перемешивают содержимое пробирок и помещают в термостат при 38 °С на 10 мин. Затем во все пробирки добавляют по 1 капле раствора йода, перемешивают, наблюдают окраску и отмечают pH, при котором амилаза действует наиболее активно.

Результаты опыта запишите в виде таблицы:

pH среды	6,0	6,8	8,0
Реакция с реагентом Люголя			

Вывод:

1.3. Влияние активаторов и ингибиторов на активность амилазы слюны.

Ход работы. В три пробирки наливают по 1 мл слюны, разведенной в 10 раз. В первую пробирку добавляют 2 капли воды, во вторую — 2 капли 1 % раствора NaCl, в третью — 2 капли 1 % раствора CuSO₄. После этого во все пробирки добавляют по 5 капель 1 % раствора крахмала и оставляют их при комнатной температуре на 2 мин. Затем во все пробирки добавляют по 1 капле раствора Люголя, перемешивают, наблюдают окраску и определяют, в какой пробирке действует активатор или ингибитор.

Результат:

Номер пробирки	1 (H ₂ O)	2 (NaCl)	3 (CuSO ₄)
Реакция с реагентом Люголя			

Вывод:

Работа 2. Специфичность ферментов

В отличие от неорганических катализаторов, ферменты обладают специфичностью (абсолютной, относительной, стереоспецифичностью). Это свойство определяется уникальным строением активного центра каждого фермента. Определите тип специфичности амилазы слюны по следующей методике.

Ход работы. Для исследования специфичности амилазы берут слюну, разведенную в 10 раз, и наливают по 1 мл в 2 пробирки.

В 1-ю пробирку добавляют 1 мл 1 % раствора крахмала, во 2-ю — 1 мл 1 % раствора сахарозы. Обе пробирки помещают на 10 минут в термостат при 38 °C, после чего проводят реакцию Фелинга для обнаружения глюкозы.

Реакция Фелинга: к 15 каплям исследуемого раствора прибавить равный объем реактива Фелинга и довести до кипения. При положительной реакции на глюкозу наблюдается красное окрашивание, которое дает закись меди.

Результат:

№ пробирки	Фермент	Субстрат	Реакция Фелинга
1			
2			

Вывод:

Подпись преподавателя:

ЗАНЯТИЕ 5

РЕГУЛЯЦИЯ ДЕЙСТВИЯ ФЕРМЕНТОВ.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ АКТИВНОСТИ ФЕРМЕНТОВ

Актуальность темы. Знание механизмов, посредством которых клетки и целые организмы координируют и регулируют весь набор метаболических процессов, важны при исследованиях в разных областях биомедицинских наук. Из всех факторов, от которых зависит определение активности фермента — концентрация фермента и субстрата, температура, pH и присутствие регуляторов, наибольший клинический интерес представляют два последних.

Активаторы и ингибиторы влияют на активность фермента, способствуя формированию или блокированию его активного центра. Они могут взаимодействовать с аллостерическим центром и, тем самым, менять ферментативную активность. Нередко ингибиторы — продукты промежуточных или конечных реакций какого-либо биохимического процесса. Некоторые природные или синтетические вещества оказывают избирательное ингибирующее действие на ферменты и используются в качестве лекарственных веществ. В больших дозах подобные вещества могут оказаться ядами.

Большинство лекарственных препаратов оказывает свое действие, влияя на соответствующие ферментативные реакции. Многие такие препараты сходны с природными субстратами и потому могут действовать как конкурентные ингибиторы ферментов. Чтобы понять многие процессы, которые существенны для фармакологии и токсикологии, необходимо иметь четкое представление о механизмах ингибирования ферментов.

Цель занятия: научится использовать знания о механизмах регуляции активности ферментов в последующем изучении клинических дисциплин для усвоения принципов диагностики заболеваний и контроля за эффективностью лечения, а также для понимания механизмов действия лекарственных препаратов, регулирующих активность ферментов.


Требования к исходному уровню знаний. Для полного усвоения темы необходимо повторить из:

- общая химия;
- основные положения теории катализа;
- биоорганической химии:
- примеры различных типов химических реакций;
- конформационные превращения белков.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ ИСХОДНОГО УРОВНЯ ЗНАНИЙ

Задание 1. Известно, что скорость взаимодействия веществ A и B увеличилась в три раза после добавления вещества K. В качестве конечных продуктов обнаруживается вещество ABK. Является ли вещество K катализатором?

Задание 2. При интенсивной мышечной работе в скелетной мускулатуре накапливается молочная кислота, образующаяся в реакции:



К какому типу относится приведенная реакция?

- А. Окислительно-восстановительная реакция.
- Б. Реакция гидролиза.
- В. Реакция синтеза.
- Г. Реакция электролиза.

Задание 3. Вещества А и В взаимодействуют по схеме $A + B \leftrightarrow AB$. При заданной концентрации А и В через 30 минут устанавливается подвижное равновесие, т. е. скорости прямой и обратной реакции уравниваются. Какую из приведенных характеристик реакции изменит внесение катализатора?

- А. Скорость прямой реакции.
- Б. Константу равновесия.
- В. Скорость обратной реакции.
- Г. Время наступления равновесия.
- Д. Концентрацию продуктов реакции.

Правильность решений проверьте, сопоставив их с ответами.

Вопросы для обсуждения:

1. Механизм ферментативного катализа. Теория промежуточных фермент-субстратных комплексов, типы связей.
2. Представление об активном центре фермента, его организация. Теории, объясняющие работу активного центра (Э. Фишер, Д. Кошленд).
3. Особенности строения аллостерических ферментов, аллостерический центр.
4. Механизмы регуляции скорости ферментативных процессов: регуляция количества ферментов (синтез, распад), активности ферментов, изменение количества субстрата, наличие изоферментов, объединение ферментов в полиферментные комплексы, компартментализация процессов.
5. Ключевые ферменты, характеристика.
6. Регуляция активности ферментов: ковалентная модификация, активаторы и ингибиторы (примеры). Виды ингибиции (необратимое и обратимое, изостерическое и аллостерическое), характеристика, примеры.
7. Изоферменты. Примеры, биологическая роль.
8. Медицинские аспекты энзимологии.

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ

Основная

1. *Биологическая химия* / В. К. Кухта [и др.]. Москва : Бином, Минск : Асар, 2008. С. 58–60, 68–86.
2. *Биологическая химия* / А. Д. Таганович [и др.]. Минск : Выш. шк., 2013. С. 55–62, 68–75.
3. Конспект лекций.

Дополнительная

1. *Лениндженер, А.* Основы биохимии / А. Лениндженер. Москва : Мир, 1985. С. 226–241.
2. *Биохимия человека* / Р. Марри [и др.]. Москва : Мир, 1993.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Задание 1. Получите представление о механизмах ферментативного катализа. Обратите внимание на то, что:

- а) в активный центр входят радикалы аминокислот различных участков полипептидного остова;
- б) активный центр составляет относительно небольшую часть объема фермента;
- в) активный центр располагается в углублении фермента.

1.1. Ускорение реакции в присутствии фермента происходит за счет образования промежуточного фермент-субстратного комплекса. Какие связи стабилизируют этот комплекс?

- | | |
|----------------|-------------------|
| А. Ионные. | Г. N-гликозидные. |
| Б. Водородные. | Д. Сложноэфирные. |
| В. Пептидные. | |

1.2. Методом ИК-спектроскопии изучали природу связей между субстратом и связывающим участком активного центра фермента. В чем заключается взаимодействие фермента и субстрата по Д. Кошленду?

А. Изменяется только конформация активного центра фермента.

Б. В молекуле фермента изменяется конформация аллостерического центра под действием субстрата.

В. При образовании фермент-субстратного комплекса в ферменте и субстрате одновременно изменяется напряжение химических связей.

Г. Активный центр подходит к субстрату, как ключ к замку.

Задание 2. Усвойте, что действие ферментов можно полностью или частично подавить (ингибиовать) определенными химическими веществами (ингибиторами). Дайте характеристику основным типам ингибиторов.

2.1. При исследовании влияния салицилатов на активность фермента глутаматдегидрогеназы установлено, что с увеличением концентрации субстрата (глутамата) от 1,5 до 8 ммоль степень ингибиования не изменяется. Удалив ингибитор, активность фермента можно восстановить. Определите тип ингибиования:

А. Необратимое.

Б. Обратимое конкурентное.

В. Обратимое неконкурентное.

Г. Ингибиование по принципу «обратной связи».

2.2. Для лечения некоторых инфекционных заболеваний, вызываемых бактериями, применяются сульфаниламидные препараты, блокирующие синтез фолиевой кислоты — фактора роста бактерий. Выберите механизм действия сульфаниламидных препаратов:

А. Являются ферментами.

Б. Участвуют в окислительно-восстановительных процессах.

В. Являются аллостерическими ингибиторами.

Г. Конкурируют с п-аминобензойной кислотой за место связывания с активным центром фермента, синтезирующего фолиевую кислоту.

Д. Ингибируют всасывание фолиевой кислоты.

Задание 3. Усвойте основные способы регуляции каталитической активности ферментов и понятие «множественные формы ферментов».

3.1. В клинику доставили пациента с приступом бронхиальной астмы. У больного вследствие дыхательного ацидоза (рН крови 7,2) снижена активность ферментов плазмы. Укажите основную причину инактивации ферментов крови:

А. Изменение степени ионизации молекул ферментов.

Б. Необратимая денатурация.

В. Разрыв пептидных связей.

Г. Изменение концентрации ферментов.

Д. Репрессия синтеза ферментов.

3.2. При обследовании больного установлено повышение в крови активности изоферментов креатинкиназы ММ и МВ. Укажите их общие свойства:

А. Термолабильность.

Б. Чувствительность к различным ингибиторам.

В. Электрофоретическая подвижность.

Г. Молекулярная масса.

Д. Катализ одной и той же реакции.

3.3. К какому классу относится этот фермент (см. 3.2)?

- | | |
|---------------------|---------------|
| А. Оксидоредуктазы. | Г. Гидролазы. |
| Б. Трансферазы. | Д. Изомеразы. |
| В. Лиазы. | Е. Лигазы. |

Правильность решений проверьте, сопоставив их с ответами.

ПРОВЕРЬТЕ ВАШИ ЗНАНИЯ (САМОКОНТРОЛЬ УСВОЕНИЯ ТЕМЫ)

Задание 1. Больной С. после приема внутрь 20 мл метанола в тяжелом состоянии доставлен в клинику, где ему ввели внутривенно этиловый спирт в количестве, которое у здорового человека вызывает интоксикацию. Объясните, почему такое лечение оказывается эффективным, учитывая, что высокая токсичность метанола обусловлена действием продукта его метаболизма — формальдегида, образующегося в печени под действием алкогольдегидрогеназы:

- А. Этанол — конкурирующий субстрат для алкогольдегидрогеназы.
- Б. Этанол вызывает денатурацию фермента.
- В. Вследствие изменения рН среды.
- Г. Происходит частичный протеолиз молекулы фермента.
- Д. Этанол связывает формальдегид.

Задание 2. При лечении опухолей мочеполовой системы в клинике применяется препарат метотрексат, обратимый конкурентный ингибитор дигидрофолатредуктазы, катализирующей синтез тетрагидрофолиевой кислоты. На взаимодействии с каким компонентом основан механизм действия этого препарата?

- А. Апоферментом.
- Б. Активным центром фермента.
- В. Аллостерическим центром фермента.
- Г. Простетической группой.
- Д. Субстратом.

Задание 3. Кроме H^+ и углекислого газа, связывание кислорода гемоглобином регулируется 2,3-бисfosфоглицератом, который присоединяется к белку в участках, пространственно удаленных от гема. Как называется такой вид регуляции?

- А. Регуляция по принципу обратной связи.
- Б. Частичный протеолиз молекулы фермента.
- В. Присоединение или отщепление белка-регулятора.
- Г. Присоединение или отщепление низкомолекулярного эффектора (модулятора).
- Д. Фосфорилирование молекулы.

Задание 4. В клетках *E. coli* синтез пиrimидиновых нуклеотидов осуществляется по схеме метаболического пути: $\text{CO}_2 + \text{NH}_3 + 2\text{ATF} \rightarrow \text{P}_1 \rightarrow \text{P}_2 \rightarrow \text{УТФ} \rightarrow \text{ЦТФ}$. При увеличении в клетке концентрации ЦТФ синтез пиrimидиновых нуклеотидов прекращается. Какой вид регуляции описан?

- А. Аллостерическая регуляция.
- Б. Частичный протеолиз.
- В. Фосфорилирование молекулы фермента.
- Г. Присоединение белков ингибиторов.
- Д. Отщепление белков ингибиторов.

Задание 5. В инкубационную среду, содержащую субстраты аланин, аспартат и креатин, внесли ферменты: аланинаминотрансферазу, аспартатаминотрансферазу и креатинкиназу. Какие общие признаки характерны для этих ферментов?

- А. Ферменты катализируют одну и ту же реакцию.
- Б. Ферменты катализируют один тип реакций.
- В. Являются изоферментными формами.

Г. Осуществляют передачу нервных импульсов.

Д. Обладают групповой специфичностью.

Ответы к решению заданий

Для самопроверки исходного уровня знаний:

1 — нет. 2 — А. 3 — Г.

Для самостоятельной работы:

1.1 — А, Б; 1.2 — В. 2.1 — В; 2.2 — Г. 3.1 — А; 3.2 — А, Д; 3.3 — Б.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА (60 минут)

Работа 1. Определение активности а-амилазы слюны.

Принцип метода. Метод основан на определении наименьшего количества амилазы (при максимальном разведении слюны), полностью расщепляющего весь добавленный крахмал. Амилазная активность слюны выражается количеством 0,1 % раствора крахмала в миллилитрах, которое расщепляется 1 мл неразведенной слюны при 38 °С в течение 30 мин. В норме амилазная активность слюны равна 160–320. Амилазная активность обозначается «А 38°/30'». Этот метод широко используется для определения амилазной активности крови и мочи.

Ход работы. В 10 пробирок наливают по 1 мл воды и в 1-ю из них добавляют 1 мл разведенной в 10 раз слюны. Содержимое этой пробирки перемешивают, несколько раз втягивая и выпуская жидкость из пипетки. Набирают в пипетку 1 мл смеси и переносят ее во 2-ю пробирку. Содержимое этой пробирки перемешивают и 1 мл смеси переносят в 3-ю пробирку

и т. д. до 10-й пробирки. Из 10-й пробирки отбирают 1 мл смеси и выливают. Во все пробирки добавляют по 1 мл воды и по 2 мл 0,1 % раствора крахмала, перемешивают, встряхивая пробирки, и помещают в термостат при 38 °С на 30 мин. После инкубации пробирки охлаждают водопроводной водой, добавляют по 1 капле 0,1 % раствора йода и перемешивают. При реакции с йодом жидкость в пробирках окрашивается в желтый, розовый и фиолетовый цвета. Отмечают последнюю пробирку с желтой окраской, где гидролиз крахмала прошел полностью, и делают расчет.

Результат:

Гидролиз крахмала в присутствии ферментов слюны при различном ее разведении

	Разведение слюны									
	1:20	1:40	1:80	1:160	1:320	1:640	1:1280	1:2560	1:5120	1:10240
	Пробирки									
Окраска раствора с йодом										
Выводы										

Пример расчета. Отметив пробирку, где гидролиз крахмала прошел полностью при наименьшем количестве фермента (желтая окраска раствора), по количеству неразведенной слюны в данной пробирке рассчитывают амилазную активность слюны по следующей пропорции: A мл слюны расщепили 2 мл 0,1 % раствора крахмала; 1 мл слюны расщепил x мл 0,1 % раствора крахмала, где A — количество неразведенной слюны. Например: желтая окраска появилась в 4-й пробирке, где слюна была разведена в 160 раз; 1/160 мл слюны рас-

щепили 2 мл 0,1 % раствора крахмала; 1 мл неразведенной слюны расщепил x мл 0,1 % раствора крахмала:

$$x = 2 \cdot 1 \cdot 160 / 1 = 320 \text{ мл } 0,1 \% \text{ раствора крахмала.}$$

Следовательно, амилазная активность А 38⁰/30⁰ равна 320.

Расчет:

Вывод:

Работа 2. Количественное определение активности амилазы (диастазы) мочи.

Метод основан на определении времени, необходимого для полного расщепления крахмала в присутствии 1 мл мочи. Условно за единицу активности амилазы мочи принимают количество фермента, расщепляющее 2 мг крахмала за 15 мин. Активность амилазы выражают количеством единиц в 1 мл мочи. В норме она составляет 1–2 ЕД.

Моча здоровых людей обладает низкой амилазной активностью по сравнению с амилазой слюны. Определение активности α -амилазы в моче и сыворотке крови широко используется в клинике при диагностике заболеваний поджелудочной железы. В 1-е сутки заболевания амилазная активность увеличивается в моче и сыворотке крови в десятки раз, а затем постепенно возвращается к норме. При почечной недостаточности амилаза в моче отсутствует.

В детском возрасте увеличение активности амилазы наблюдается при эпидемическом паротите, что указывает на одновременное поражение поджелудочной железы вирусом паротита. Вирус гриппа также поражает поджелудочную железу, но реже.

Ход работы. На сухое предметное стекло капают в разных местах по одной капле 0,1 % раствора йода в йодиде калия (всего 8–10 капель). В пробирку вносят 2 мл 0,1 % раствора крахмала, содержащего 2 мг крахмала, 1 мл 0,85 % раствора хлорида натрия и помещают пробирку в термостат при температуре 37 °C на 2 мин. Через 2 мин добавляют в нее 0,5 мл мочи, перемешивают и отмечают время начала реакции. Затем каждые 2–3 мин стеклянной палочкой переносят каплю смеси из пробирки на предметное стекло в каплю раствора йода и так продолжают до тех пор, пока окраска капли йода не перестанет изменяться, т. е. останется желтой. Отмечают время реакции в мин. Активность амилазы мочи рассчитывают по формуле:

$$X_{\text{ЕД}} = 15 / (0,5 T),$$

где $X_{\text{ЕД}}$ — активность амилазы в 1 мл мочи; 15 — время, необходимое для полного расщепления 2 мг крахмала, мин; 0,5 — количество мочи, взятое в реакционную смесь, мл; T — время реакции, мин.

Результат: $T_{\text{мин.}} =$

Расчет: $X_{\text{ед.}} =$

Вывод:

Подпись преподавателя:

ЗАНЯТИЕ 6

КОЛЛОКВИУМ ПО ТЕМАМ «ХИМИЯ БЕЛКОВ», «ФЕРМЕНТЫ»

Вопросы для подготовки к коллоквиуму:

1. Классификация и физико-химические свойства аминокислот (общие и специфические). Роль в структурной организации белка. Применение аминокислот как лекарственных препаратов.
2. Первичная и вторичная структуры белковой молекулы. Связи, стабилизирующие их. Особенности строения пептидной связи и их роль в формировании пространственной структуры белка (постулаты Полинга-Кори). Виды вторичной структуры.
3. Понятие о надвторичной структуре белка. Структурные и функциональные домены. Причины формирования третичной структуры белковой молекулы.
4. Третичная структура белка. Силы, стабилизирующие третичную структуру. Конформационные изменения при функционировании белков. Денатурация белка и факторы, ее вызывающие. Использование явления денатурации в медицинской практике.
5. Четвертичная структура белков. Преимущества существования белков с четвертичной структурой. Кооперативные изменения конформации полипептидных цепей при функционировании белков с четвертичной структурой на примере гемоглобина. Сравнительные особенности строения и функций гемоглобина и миоглобина.
6. Основы функционирования белков.
7. Растворимость белков.
 - Почему белки растворяются в воде? Факторы устойчивости белков в растворе.
 - Высаливание и осаждение белков. Механизм и практическое использование.
 - Денатурация белка, денатурирующие факторы, использование в медицине.
8. Гидролиз белка. Типы гидролиза, роль в организме. Практическое использование.
9. Методы выделения и очистки белков.
 - Этапы исследования структуры белка.
 - Методы очистки белка от низкомолекулярных примесей.
 - Принципы разделения и очистки белков методами хроматографии:
 - а) адсорбционной;
 - б) распределительной;
 - в) ионообменной;
 - г) аффинной;
 - д) гель-хроматографией.
 - Ультрацентрифугирование. Принцип метода.
 - Электрофорез. Принцип метода, практическое применение. Электрофорез в полиакриламидном геле. Изоэлектрофокусирование.
 - Метод «отпечатков пальцев» (метод Ингрэма). Принцип метода, практическое применение.
 - Использование вестерн-блот анализа для идентификации белков. Основные этапы, практическое применение. Понятие «молекулярный зонд».
10. Методы исследования аминокислотного состава (ионообменная хроматография) и аминокислотной последовательности белков и пептидов (Сэнджер, Эдман, Акабори, секвениатор Эдмана–Бэга).
11. Сложные белки. Строение, классификация, биологическая роль каждого класса.
12. Какие функции выполняют в организме белки и пептиды?
13. Ферменты, классификация. Уметь назвать класс фермента и порядковый номер класса на основании приведенной реакции.

14. Свойства ферментов. Термолабильность, специфичность, влияние pH и концентрации субстрата на активность фермента. Понятие о кинетике ферментативных реакций. Константа Михаэлиса и принципы ее определения.
15. Активность фермента, единицы измерения активности.
16. Активный центр и его строение.
17. Коферменты, классификация и роль.
18. Механизмы регуляции активности ферментов, обратимая и необратимая регуляция, изостерическая и аллостерическая регуляция, ковалентная модификация структуры фермента.
19. Механизмы регуляции количества фермента в клетке (схема Львова-Жакоба-Моно).
20. Изоферменты. Примеры, биологическая роль.
21. Примеры использования ферментов и их регуляторов в медицинской практике.

Вопросы для подготовки к коллоквиуму для студентов МФИУ:

1. Аминокислоты и их классификация. Общие свойства. Формулы протеиногенных аминокислот.
2. Пептиды, их строение. Классификация и биологическая роль пептидов. Правила написания пептидов (белков), их названия и определения заряда.
3. Белки как класс органических соединений, их функции. Классификация белков.
4. Количественное определение белка в биологических жидкостях.
5. Пептидная связь и ее свойства (постулаты Полинга-Кори).
6. Гидролиз белка. Значение реакций гидролиза для организма и практическое использование белковых гидролизатов в медицинской практике.
7. Вторичная, надвторичная, третичная, четвертичная структуры белковой молекулы (понятие, разновидности и связи, стабилизирующие структуру).
8. Конформационные изменения при функционировании белков. Взаимодействие белков с лигандами.
9. Денатурация. Обратимость денатурации. Механизмы действия денатурирующих факторов.
10. Общие физико-химические свойства белков (вязкость растворов, незначительная диффузия, оптическая активность, подвижность в электрическом поле, поглощение УФ-лучей, растворимость в воде).
11. Факторы устойчивости белковых растворов (заряд белка, гидратная оболочка, молекулярная масса, форма молекулы). Изоэлектрическое состояние.
12. Методы разделения и очистки белков: высаливание, хроматография (аффинная, гель-хроматография), электрофорез (на бумаге, в ПААГ), диализ, вестерн-блот анализ. Принципы.
13. Сложные белки, их классификация, строение и биологическая роль.
14. Ферменты как белковые катализаторы.
15. Современная классификация и номенклатура ферментов (системное и рабочее название). Шифр фермента. Общая характеристика классов.
16. Строение ферментов. Коферменты, их классификация и роль в катализе. Блок-схемы НАД⁺, НАДФ⁺, ФАД и ФМН.
17. Механизм ферментативного катализа. Кинетика ферментативных реакций. Зависимость скорости ферментативных реакций от концентрации субстрата, pH, температуры (молекулярный механизм, графическая зависимость). Константа Михаэлиса (K_m), использование K_m для прогнозирования протекания биохимических реакций.
18. Специфичность действия ферментов. Типы специфичности.
19. Единицы активности ферментов.
20. Активный центр фермента, его строение. Теории, объясняющие работу активного центра (Э. Фишер, Д. Кошленд).

21. Особенности строения аллостерических ферментов, аллостерический центр. Понятие о ключевых ферментах.
22. Механизмы регуляции скорости ферментативных процессов: регуляция количества ферментов (синтез, распад), активности ферментов, изменение количества субстрата, наличие изоферментов, объединение ферментов в полиферментные комплексы, компартментализация процессов.
23. Регуляция активности ферментов: ковалентная модификация, активаторы и ингибиторы (примеры). Виды ингибирования (обратимое и необратимое, изостерическое и аллостерическое), характеристика, примеры.
24. Изоферменты. Примеры, биологическая роль.
25. Медицинские аспекты энзимологии. Примеры использования ферментов и их ингибиторов для диагностики и лечения заболеваний.

ВВЕДЕНИЕ В МЕТАБОЛИЗМ. БИОЛОГИЧЕСКОЕ ОКИСЛЕНИЕ

ЗАНЯТИЕ 7

ВВЕДЕНИЕ В МЕТАБОЛИЗМ. ЦЕНТРАЛЬНЫЕ МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ПУТИ (ОКИСЛИТЕЛЬНОЕ ДЕКАРБОКСИЛИРОВАНИЕ ПВК, ЛИМОННОКИСЛЫЙ ЦИКЛ КРЕБСА)

Актуальность темы. Знание закономерностей и особенностей метаболизма необходимо для дальнейшего изучения обмена углеводов, липидов и белков на уровне клетки и организма, для понимания механизмов регуляции их метаболизма и возможной коррекции нарушений обмена веществ. Усвоив значение центральных метаболических путей для энергообеспечения клеток, можно понять причины гипоксических состояний и их связь с клеточной энергетикой. Поскольку нарушения энергетического обмена лежат в основе патогенеза многих заболеваний, знание механизма функционирования цикла Кребса позволит врачу провести правильную коррекцию метаболических нарушений (кокарбоксилаза, компоненты адениловой системы, сукцинат и др.).

Цель занятия: получить представление о метаболизме, анаболических и катаболических метаболических путях, их взаимосвязи на различных уровнях; сформировать представление об окислительном декарбоксилировании пировиноградной кислоты и лимоннокислом цикле Кребса как центральных (общих) метаболических путях, о значении водород-донорной функции ЦТК для дальнейших окислительно-восстановительных реакций в цепи тканевого дыхания, понять катаболическую и анаболическую функции цикла Кребса.

Требования к исходному уровню знаний. Для полного усвоения темы необходимо повторить из:

- *биологии:*
 - понятия «обмен веществ», «ассимиляция», «диссимиляция» и связь между ними;
 - *общей химии:*
 - понятие «окислительно-восстановительные реакции», способы окисления веществ, основы биоэнергетики, понятия «макроэргическая связь», «макроэрг»;
 - *биоорганической химии:*
 - строение АМФ, АДФ, АТФ, пирофосфата, дикарбоновых, трикарбоновых кислот, α -кетокислот, гидроксикислот;
 - *нормальной физиологии:*
 - понятие «основной обмен», энергетическая роль обмена веществ;
 - *цитологии:*
 - структура митохондрий;
 - *биохимии:*
 - класс оксидоредуктазы; дегидрогеназы; строение коферментов ФМН, ФАД, НАД⁺, НАДФ⁺; реакции декарбоксилирования.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ ИСХОДНОГО УРОВНЯ ЗНАНИЙ


Задание 1. К раствору гидрохинона добавили окислитель, в результате чего раствор потемнел. Какова причина изменения окраски гидрохинона?

- А. Гидрохинон присоединил 2 электрона.
- Б. Гидрохинон окислился.
- В. Гидрохинон присоединил 2 атома водорода.
- Г. Гидрохинон восстановился.
- Д. Гидрохинон отдал 2 атома водорода.








Задание 2. Проанализируйте формулы указанных ниже соединений и укажите, к какому классу веществ они относятся:

- А. Дикарбоновые кислоты.
- Б. Трикарбоновые кислоты.
- В. Монокарбоновые кислоты.

- Г. α -Кетокислоты.
- Д. Гидроксикислоты.



Задание 3. К написанным ниже реакциям подберите ферменты. Укажите класс:



Правильность решений проверьте, сопоставив их с ответами.

Вопросы для обсуждения:

1. Метаболизм, метаболические пути, регуляторные (ключевые) ферменты.
2. Катаболизм и анаболизм, различия и взаимосвязь между ними.
3. Реакции дегидрирования как основной способ окисления веществ в организме. Пиридинзависимые и flavинзависимые дегидрогеназы. Роль витаминов PP и В₂ в окислительно-восстановительных реакциях. Схематическое строение коферментов НАД⁺, НАДФ⁺, ФАД, ФМН.
4. Адениловая система клетки, ее участие в энергетическом обмене. Центральная роль АТФ в процессах, связанных с затратой энергии. Способы синтеза АТФ: субстратное, окислительное и фотосинтетическое фосфорилирование. Понятие о макроэргах.
5. Окислительное декарбоксилирование ПВК. Пиреватдегидрогеназный комплекс (ферменты, коферменты, схема).
6. Цикл трикарбоновых кислот (ЦТК) как центральный (общий) метаболический путь. Локализация ферментов ЦТК, схема процесса, ферменты, коферменты.

7. Дегидрогеназные реакции ЦТК как источник водорода для системы тканевого дыхания. Декарбоксилирование в цикле Кребса как механизм образования в клетках CO_2 — конечного продукта катаболизма соединений углерода.

8. Функции ЦТК: интегративная, катаболическая, анаболическая, энергетическая, водороддонорная. Регуляция. Анаплеротические реакции.

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ

Основная

1. *Биологическая химия* / В. К. Кухта [и др.]. Москва : Бином, Минск : Асар, 2008. С. 133–139, 177–182.

2. *Биологическая химия* / А. Д. Таганович [и др.]. Минск : Выш. шк., 2013. С. 90–102.

3. Конспект лекций.

Дополнительная

1. *Биохимия человека* / Р. Марри [и др.]. Москва : Мир, 1993.

2. *Страйер, Л. Биохимия* / Л. Страйер. Москва : Мир, 1985. Т. 2. С. 6–21, 49–68.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Для усвоения материала темы следует обратить внимание на то, что:

1. ЦТК представляет собой конечный общий путь для окисления продуктов распада белков, жиров и углеводов.

2. ЦТК служит источником строительных блоков для процессов биосинтеза (гем, аминокислоты, глюкоза и т. д.).

3. Большинство топливных молекул вступают в цикл в виде ацетил-КоА.

4. В ходе реакций цикла дважды происходит декарбоксилирование с образованием конечного продукта — CO_2 .

5. В результате четырех дегидрогеназных реакций восстанавливаются три молекулы НАД⁺ и одна молекула ФАД. Эти восстановленные переносчики окисляются затем в цепи переноса электронов внутренней мембранны митохондрий.

6. ЦТК функционирует только в аэробных условиях, поскольку регенерация восстановленных коферментов происходит только при переносе электронов на O_2 .

7. Перенос электронов на кислород сопряжен с одновременным образованием АТФ (окислительное фосфорилирование). Скорость цикла зависит, в первую очередь, от энергетического заряда клетки.

Задание 1. У экспериментальных животных исследовали влияние витаминов на скорость ЦТК. При отсутствии какого витамина скорость реакций ЦТК не нарушалась?

А. Цианокобаламин. Г. Никотинамид.

Б. Тиамин. Д. Рибофлавин.

В. Пантотеновая кислота.

Задание 2. В ходе реакций цикла Кребса происходит восстановление коферментов четырех дегидрогеназ. Укажите субстраты ЦТК, причастные к появлению атомов водорода в составе соответствующих коферментов:

А. Цитрат. Д. Аконитат.

Б. α -Кетоглутарат. Е. Изоцитрат.

В. Фумарат. Ж. Сукцинат.

Г. Малат.

Задание 3. Подберите ферменты к соответствующим реакциям:

1. Оксалоацетат + ацетил-КоА + $\text{H}_2\text{O} \rightarrow$ цитрат + КоA-SH.

2. Изоцитрат + НАД⁺ \rightarrow α -кетоглутарат + НАДН·Н⁺ + CO_2 .

3. Сукцинил-КоА + ГДФ + $\text{H}_3\text{PO}_4 \leftrightarrow$ сукцинат + ГТФ + КоA-SH.

4. Фумарат + $\text{H}_2\text{O} \leftrightarrow$ малат.

А. Фумаратгидратаза. В. Сукцинил-КоА-синтетаза.

Б. Цитратсингтаза. Г. Изоцитратдегидрогеназа.

Задание 4. К каждому ферменту подберите соответствующий кофермент:

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. Сукцинатдегидрогеназа. | А. ФМН. |
| 2. НАДН ⁺ -дегидрогеназа. | Б. ФАД. |
| 3. Малатдегидрогеназа. | В. НАД ⁺ . |
| 4. α -Кетоглутаратдегидрогеназный комплекс ферментов. | Г. ТПФ. |
| | Д. КоA-SH. |
| | Е. Липоевая кислота. |

Правильность решений проверьте, сопоставив их с ответами.

ПРОВЕРЬТЕ ВАШИ ЗНАНИЯ (САМОКОНТРОЛЬ УСВОЕНИЯ ТЕМЫ)

Задание 1. В цикле лимонной кислоты для расщепления ацетил-КоА используются восемь ферментов:

1) цитратсинтаза; 2) аконитатгидратаза; 3) изоцитратдегидрогеназа; 4) α -кетоглутаратдегидрогеназный комплекс; 5) сукцинил-КоА-синтетаза; 6) сукцинатдегидрогеназа; 7) фумаратгидратаза; 8) малатдегидрогеназа.

1.1. Напишите химическую реакцию (схема), катализируемую каждым из этих ферментов:

1.2. Какой кофермент или коферменты необходимы для работы третьего, четвертого, шестого и восьмого ферментов?

1.3. Для каждого из ферментов укажите, к какому из перечисленных ниже типов приналежит катализируемая им реакция: конденсация, дегидратация, гидратация, декарбоксилирование, окислительно-восстановительная реакция, субстратное фосфорилирование, изомеризация.

1.4. Укажите, к какому классу относится каждый из ферментов цикла Кребса.

Задание 2. У экспериментального животного на фоне внутривенного введения глюкозы определили снижение активности ферментов ЦТК. Какие соединения являются непосредственными их ингибиторами?

А. НАДФН⁺. Б. НАД⁺. В. НАДН⁺. Г. АТФ. Д. АДФ.

Задание 3. Будет ли происходить накопление оксалоацетата, если к экстракту, содержащему субстраты, ферменты и коферменты ЦТК, добавить ацетил-КоА? Объясните Ваш ответ.

Задание 4. В клинику доставили пострадавших во время землетрясения, находившихся без пищи 10 дней. Исследования активности ферментов ЦТК (цитратсинтазы и альфа-кетоглутаратдегидрогеназы) в лейкоцитарной фракции крови показали резкое снижение скорости этого процесса. Какие последствия это имеет для организма?

- А. Обезвоживание.
- Б. Снижение уровня АТФ.
- В. Снижение уровня глюкозы в крови.
- Г. Образование большого количества эндогенной воды.

Задание 5. В образовании ацетил-КоА из пирувата участвует мультиферментный комплекс. Выберите коферменты, необходимые для работы этого комплекса:

- А. ФМН, HS-КоА, ТПФ, НАД⁺.
- Б. ФМН, HS-КоА, ТПФ, НАД⁺, ЛК.
- В. ФМН, HS-КоА, ТПФ, НАДФ⁺.
- Г. ФАД, HS-КоА, ТПФ, НАД⁺, ЛК.
- Д. ФАД, HS-КоА, ТПФ, НАД⁺.

Ответы к решению заданий

Для самопроверки исходного уровня знаний:

1 — Б, Д. 2.1 — А; 2.2 — Г; 2.3 — Д; 2.4 — Б; 2.5 — В. 3.1 — дегидрогеназа, I; 3.2 — декарбоксилаза, IV; 3.3 — дегидратаза, IV.

Для самостоятельной работы:

1 — А. 2 — Б, Г, Е, Ж. 3 (1 — Б, 2 — Г, 3 — В, 4 — А). 4 (1 — Б, 2 — А, 3 — В, 4 — Б, В, Г, Д, Е).

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА (60 минут)

Работа 1. Изучение функционирования ЦТК по убыли ацетил-КоА.

Принцип метода. Первый этап ЦТК — реакция конденсации ацетил-КоА с оксалоацетатом, которая осуществляется цитратсинтазой. Образовавшаяся лимонная кислота подвергается превращению в цикле трикарбоновых кислот, а освободившийся КоA-SH можно определить, используя реактив Фолина (появляется синее окрашивание). Если блокировать ЦТК малоновой кислотой, то ацетил-КоА не используется и КоA-SH не образуется. Для работы используем готовый гомогенат печени.

Схема постановки опыта:

Содержимое пробирок	Контроль (мл)	Опыт (мл)
Фосфатный буфер pH=7,4	2,0	2,0
Р-р ацетил-КоА	0,5	0,5
Р-р оксалоацетата	0,5	0,5
Р-р малоновой кислоты	1,0	—
Физиологический р-р	—	1,0
Гомогенат печени	0,5	0,5
Инкубация 10 минут при комнатной температуре		
Реактив Фолина А	0,5	0,5
Реактив Фолина Б	0,5	0,5
Результат (окраска растворов):		

Вывод:

Работа 2. Изучение функционирования ЦТК по образованию углекислого газа.

Принцип метода. При окислении ацетил-КоА в ЦТК образуется углекислый газ, который связывается гидроксидом кальция и определяется при добавлении серной кислоты по выделению пузырьков газа.

Схема постановки опыта:

Содержимое пробирок	Контроль (мл)	Опыт (мл)
Фосфатный буфер pH=7,4	2,0	2,0
P-р ацетил-КоА	0,5	0,5
P-р оксалоacetата	0,5	0,5
P-р малоновой кислоты	1,0	—
Инкубационный раствор	—	1,0
P-р Ca(OH) ₂	1,0	1,0
Гомогенат печени	0,5	0,5
Инкубация 10 минут при комнатной температуре		
0,1н р-р серной кислоты	1,0	1,0
Результат (выделение углекислого газа):		

Вывод:

Работа 3. Изучение функционирования ЦТК по образованию восстановительных эквивалентов.

Принцип метода. При окислении ацетил-КоА в ЦТК образуется 8 атомов водорода, которые отщепляются от субстрата при участии соответствующих дегидрогеназ. В качестве акцептора водорода используется 2,6-дихлорфенолиндофенол (2,6-ДХФИ). Если цикл функционирует, то 2,6-ДХФИ восстанавливается и обесцвечивается.

Схема постановки опыта:

Содержимое пробирок	Контроль (мл)	Опыт (мл)
Фосфатный буфер pH=7,4	2,0	2,0
P-р ацетил-КоА	—	0,5
P-р ЩУК	—	0,5
Дистиллированная вода	1,0	—
Гомогенат печени	1,0	1,0
0,001н р-р ДХФИ	1,0	1,0
Инкубация 15–20 минут при комнатной температуре		
Результат (окраска растворов):		

Вывод:

Подпись преподавателя:

ЗАНЯТИЕ 8

БИОЛОГИЧЕСКОЕ ОКИСЛЕНИЕ. ОКИСЛИТЕЛЬНОЕ ФОСФОРИЛИРОВАНИЕ. ПУТИ УТИЛИЗАЦИИ КИСЛОРОДА КЛЕТКАМИ

Актуальность темы. Знание процесса окисления водорода в митохондриях с образованием эндогенной воды, который протекает с выделением значительного количества энергии, запасаемой в макроэргических связях АТФ, необходимо для понимания основного пути утилизации кислорода в клетке в норме и патологии. Гипоэнергетические состояния, возникающие в результате нарушения работы дыхательной цепи, нарушения сопряжения дыхания и фосфорилирования, недостаточного поступления субстратов окисления, лежат в основе развития многих патологических состояний. Лечение последних требует четкого представления об окислительном фосфорилировании, о способах его регуляции, энергетической ценности субстратов, поставляющих атомы водорода в дыхательную цепь. Некоторые из них (субстраты цикла Кребса — цитрат, сукцинат) используются для коррекции метаболических нарушений. Оксигеназный путь утилизации кислорода имеет важное значение в процессах обезвреживания в организме ксенобиотиков и токсичных метаболитов.

Цель занятия: получить представление о путях утилизации кислорода клетками; о локализации, строении и функционировании компонентов дыхательной цепи и цепи микросомного окисления, об окислительном фосфорилировании; усвоить, что сопряжение дыхания и фосфорилирования служит основой нормального энергообеспечения клетки; научиться применять эти знания при последующем изучении клеточного метаболизма.

Требования к исходному уровню знаний. Для полного усвоения темы необходимо повторить из:

▪ *общей химии:*

- понятия «окисление» («окислитель»), «восстановление» («восстановитель»), «окислительно-восстановительные реакции», «редокс-потенциал», «макроэргическая связь», «макроэрги»;

▪ *биоорганической химии:*

- строение АТФ, ее роль как универсального макроэрга; барбитурную кислоту и ее производные;

▪ *цитологии:*

- строение митохондриальной мембрany;

▪ *бioxимии:*

- класс оксидоредуктазы, пиридин- и flavинзависимые дегидрогеназы, строение и функционирование НАД⁺, ФМН, ФАД; водороддонорная функция цикла Кребса; субстраты ЦТК, поставляющие водород в дыхательную цепь.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ ИСХОДНОГО УРОВНЯ ЗНАНИЙ

Задание 1. Какие из приведенных утверждений не характеризуют АТФ?

А. Пуриновый нуклеотид.

Б. Универсальный макроэрг в клетках.

В. Имеет две гуанидинфосфатные связи.

Г. Имеет две фосфоангидридные связи.

Д. Является формой запасания, хранения и передачи энергии в клетках.

Задание 2. Какие из ниже перечисленных субстратов ЦТК не являются донорами водорода для дыхательной цепи?

А. Сукцинат.

Г. Фумарат.

Б. Цитрат.

Д. Оксалоацетат.

В. Изоцитрат.

Е. Сукцинил-КоА.

Задание 3. Напишите формулу АТФ, обозначив макроэргические связи.

Задание 4. В цикле Кребса протекают четыре дегидрогеназные реакции:

- А. Изоцитрат → α-кетоглутарат.
- Б. α-Кетоглутарат → сукцинил-КоА.
- В. Сукцинат → фумарат.
- Г. Малат → оксалоацетат.

4.1. Укажите соответствующий каждой реакции фермент.

4.2. Укажите соответствующий каждой дегидрогеназе кофермент.

4.3. Отнесите каждую дегидрогеназу к разряду пиридиновых либо флавиновых дегидрогеназ.

Правильность решений проверьте, сопоставив их с ответами.

Вопросы для обсуждения:

1. Тканевое дыхание — процесс окисления водорода субстратов в дыхательной цепи с образованием эндогенной воды в клетках. Отличия образования воды в процессе тканевого дыхания от такого же процесса *in vitro*.
2. Строение компонентов дыхательной цепи, комплексы ферментов, коферменты, механизм функционирования.
3. Схема дыхательной цепи, пункты фосфорилирования, механизм формирования электрохимического потенциала.
4. Механизмы митохондриального синтеза АТФ. Н⁺-АТФ-синтаза. Сопряжение процессов дыхания и фосфорилирования. Хемиосмотическая теория Митчелла. Коэффициент фосфорилирования (Р/О) для различных субстратов, поставляющих водород в дыхательную цепь.
5. Регуляция работы дыхательной цепи и Н⁺-АТФ-синтазы.
6. Причины развития гипоэнергетических состояний. Разобщение окислительного фосфорилирования (механизм, разобщители). Ингибиторы переноса электронов и окислительного фосфорилирования.
7. Микросомальное окисление, роль его в клетке.

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ

Основная

1. *Биологическая химия* / В. К. Кухта [и др.]. Москва : Бином, Минск : Асап, 2008. С. 134–154.
2. *Биологическая химия* / А. Д. Таганович [и др.]. Минск : Выш. шк., 2013. С. 76–89.
3. Конспект лекций.

Дополнительная

1. *Биохимия человека* / Р. Марри [и др.]. Москва : Мир, 1993. Т. 1. С. 111–139.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Для усвоения темы необходимо уяснить, что:

1. Окисление водорода в цепи тканевого дыхания является основным источником энергии для реакции синтеза АТФ.
2. Процесс образования воды в организме и вне его совершается с выделением 210–230 кДж/моль энергии.
3. В организме синтез Н₂O происходит при участии дыхательной цепи.
4. Часть энергии этого процесса ($\approx 40\%$) используется для реакции синтеза АТФ.
5. Реакция окисления водорода субстратов в дыхательной цепи в организме сопряжена с процессом окислительного фосфорилирования (синтез АТФ из АДФ и Н₃РО₄).

6. Коэффициент фосфорилирования (Р/О) — это число молей поглощенного Ф_н, которые пошли на образование АТФ, в расчете на один атом кислорода, использованный в процессе тканевого дыхания.

7. Оксигеназный путь утилизации кислорода осуществляется в мембранах эндоплазматического ретикулума и способствует включению кислорода в субстрат. Таким способом происходит обезвреживание многих токсичных веществ (микросомальное окисление).

Задание 1. Изобразите схему дыхательной цепи для субстратов пиридинзависимых дегидрогеназ (малат, α -кетоглутарат, изоцитрат). Укажите коэффициент фосфорилирования.

Задание 2. Изобразите схему дыхательной цепи для субстратов, дегидрируемых с участием ФАД. Укажите коэффициент фосфорилирования. Сколько АТФ будет синтезировано при окислении 5 моль сукцинатов?

Задание 3. Какое (какие) из приведенных утверждений верно? Последовательность расположения компонентов дыхательной цепи определяется:

- А. Химической структурой переносчика электронов.
- Б. Величиной редокс-потенциала (E_0').
- В. Величиной протонного электрохимического потенциала ($\Delta\mu H^+$).
- Г. Является произвольной.

Задание 4. Подберите к каждому комплексу дыхательной цепи соответствующий небелковый компонент:

- | | |
|---|----------------------|
| 1. НАДН H^+ : убихинон оксидоредуктаза. | А. ФАД. |
| 2. Убихинол: цитохром с оксидоредуктаза. | Б. Гем. |
| 3. Сукцинатдегидрогеназа. | В. ФМН. |
| 4. Цитохромоксидаза. | Г. НАД $^+$. |
| | Д. Гем, Cu $^{2+}$. |

Задание 5. Подберите к этим же ферментативным комплексам (см. задание 4) соответствующие ингибиторы:

- | | |
|----------------------|-----------------------------------|
| А. Цианиды. | Д. Амитал (барбитуровая кислота). |
| Б. СО. | Е. Ротенон. |
| В. H ₂ S. | Ж. Антимицин А. |
| Г. Азид натрия. | З. Малонат. |

Правильность решений проверьте, сопоставив их с ответами.

ПРОВЕРЬТЕ ВАШИ ЗНАНИЯ (САМОКОНТРОЛЬ УСВОЕНИЯ ТЕМЫ)

Задание 1. Какое (какие) из приведенных утверждений, согласно хемиосмотической теории Митчелла, неверно?

А. В процессе функционирования дыхательной цепи происходит перенос H $^+$ через внутреннюю мембрану в матрикс митохондрий.

Б. Энергия, выделяющаяся при транспорте электронов I, III, IV комплексами дыхательной цепи, используется на перекачивание протонов из матрикса в межмембранные пространство.

В. В процессе тканевого дыхания на внутренней мембране митохондрий формируется протонный электрохимический потенциал.

Г. Энергия электрохимического потенциала на внутренней митохондриальной мембране используется для работы V комплекса.

Д. Обратный ток протонов из межмембранныго пространства в матрикс по протонным каналам Н⁺-АТФ-сингтазы сопровождается синтезом АТФ.

Задание 2. Какие из следующих утверждений характеризуют Н⁺-АТФ-сингтазу?

- А. В ферментный комплекс на внутренней мембране митохондрий.
- Б. Ингибитируется олигомицином.
- В. Имеет протонные каналы.
- Г. Может проявлять АТФ-азную активность.
- Д. Переходит в рабочее состояние под влиянием движущихся через нее протонов.
- Е. Ингибитируется атрактилозидом.

Задание 3. Процесс тканевого дыхания стимулируется при добавлении к суспензии митохондрий:

- | | |
|---------|-----------------------|
| А. АТФ. | Г. Барбитуратов. |
| Б. АДФ. | Д. 2,4-Динитрофенола. |
| В. КСН. | |

Задание 4. Причинами гипоэнергетических состояний (нарушение синтеза АТФ) в митохондриях могут быть:

- А. Недостаток субстратов тканевого дыхания.
- Б. Недостаток кислорода.
- В. Избыток витаминов РР и В₂.
- Г. Добавление к изолированным дышащим митохондриям олигомицина.
- Д. Низкая концентрация АДФ в матриксе митохондрии.
- Е. Разобщение с участием 2, 4-динитрофенола.

Задание 5. В клинику поступила пациентка с отравлением снотворными препаратами — производными барбитуровой кислоты. Какие соединения нужно ввести больной для восстановления тканевого дыхания на период выведения снотворного препарата из организма?

- А. Изоцитрат.
- Б. Ацил-КоА.
- В. Малат.
- Г. Сукцинат.

Задание 6. Студенты в лабораторной работе *in vitro* исследовали действие малоната на ряд ферментов цикла Кребса. Накопление какого метаболита они обнаружили?

- | | |
|---------------|--------------------|
| А. Малат. | Г. Сукцинил-КоА. |
| Б. Изоцитрат. | Д. α-Кетоглутарат. |
| В. Сукцинат. | |

Задание 7. Сколько моль АТФ может синтезироваться при окислении 1 моль субстрата в указанных процессах?

- | | |
|---|--------------|
| 1. Ацетил-КоА → CO ₂ + H ₂ O. | А. 4 моль. |
| 2. Сукцинат → ЩУК. | Б. 10 моль. |
| 3. α-Кетоглутарат → ЩУК. | В. 7,5 моль. |
| 4. Изоцитрат → сукцинат. | Г. 6 моль. |
| 5. Сукцинат → CO ₂ , H ₂ O. | Д. 24 моль. |

Ответы к решению заданий

Для самопроверки исходного уровня знаний:

- 1 — В. 2 — Б, Г, Д, Е.
- 4.1. А – изоцитрат ДГ; Б – α-кетоглутарат ДГ; В – сукцинат ДГ; Г – малат ДГ.
- 4.2. А – НАД⁺; Б – НАД⁺, ФАД, ТПФ, КоА, липоевая кислота; В – ФАД; Г – НАД⁺.
- 4.3. А, Б, Г – пиридиновые ДГ; В – флавиновая ДГ.

Для самостоятельной работы:

- 1 — $P/O = 2,5$. 2 — $P/O = 1,5$, синтезируется 7,5 АТФ. 3 — Б. 4 (1 – В; 2 – Б; 3 – А; 4 – Д).
- 5 (1 – Д, Е; 2 – Ж; 3 – З; 4 – А, Б, В, Г).

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА (60 минут)

Работа 1. Изучение реакций окислительного фосфорилирования.

Принцип метода. При окислении различных субстратов в дыхательной цепи высвобождается энергия, часть которой используется на реакцию окислительного фосфорилирования. Степень последнего (энергетическая ценность субстратов) определяется по убыли неорганического фосфата, коэффициент Р/О может равняться 0,5; 1,5; 2,5. Используя различные субстраты (яблочная, янтарная, аскорбиновая кислоты), оцениваем эффективность окислительного фосфорилирования. Содержание фосфорной кислоты определяем в реакции с молибдатом аммония и редуцирующим раствором аскорбиновой кислоты по интенсивности окраски образующейся молибденовой сини.

Схема постановки опыта:

Содержимое пробирок	Контрольная проба, мл	Опытные пробы, мл		
		1	2	3
Инкубационная смесь	1,0	1,0	1,0	1,0
Физиологический раствор	0,5	—	—	—
Раствор яблочной кислоты	—	0,5	—	—
Раствор янтарной кислоты	—	—	0,5	—
Раствор аскорбиновой кислоты + цитохром с	—	—	—	0,5
Суспензия митохондрий	0,5	0,5	0,5	0,5
Инкубация 10 мин при комнатной температуре, затем добавить:				
Раствор трихлоруксусной кислоты (ТХУ)	1,0	1,0	1,0	1,0
Раствор молибдата аммония	0,5	0,5	0,5	0,5
Редуцирующий раствор Фиске и Субарроу	0,5	0,5	0,5	0,5
Содержимое всех пробирок разбавить водой в 8 раз				
Инкубация 10 минут.				
Результат:				
1. Оцените интенсивность окраски по 4-балльной шкале:				
2. Коэффициент Р/О:				

Вывод:

Работа 2. Изучение влияния 2,4-динитрофенола (2,4-ДНФ) на окислительное фосфорилирование.

Принцип метода. 2,4-ДНФ — разобщитель фосфорилирования, сопряженного с окислением. Об эффективности окислительного фосфорилирования судят по убыли в инкубационной среде неорганического фосфата, который определяется, как описано в работе № 1.

Содержимое пробирок	Контроль (мл)	Опыт (мл)
Раствор яблочной кислоты	0,5	0,5
Раствор 2,4-ДНФ	—	0,5
Физиологический раствор	0,5	—
Суспензия митохондрий	0,5	0,5
Инкубация 10 мин при комнатной температуре		
Раствор ТХУ	1,0	1,0
Раствор молибдата аммония	0,5	0,5
Редуцирующий раствор	1,0	1,0
Результат (интенсивность окраски):		

Вывод:

Работа 3. Открытие альдегиддегидрогеназы в молоке.

Фермент вырабатывается микроорганизмами, попадающими в молоко извне. По химической природе он относится к флавопротеинам, способным окислять альдегиды, в частности, формальдегид. При добавлении к некипяченому молоку формальдегида и метиленовой сини альдегиддегидрогеназа окисляет формальдегид в муравьиную кислоту, а освобождающиеся при этом протоны и электроны переносятся на метиленовую синь, восстанавливая ее в бесцветное соединение.

Ход работы. В 1-ю пробирку вносят 15 капель кипяченого молока, во 2-ю — 15 капель некипяченого. В каждую пробирку вносят по капле 0,4 % раствора формальдегида и по капле 0,01 % раствора метиленовой сини. Пробирки встряхивают и закрывают пробками, чтобы создать относительно анаэробные условия.

Пробирки помещают в термостат при 37 °C и отмечают через 5 мин постепенное обесцвечивание метиленовой сини.

Результат:

Вывод:

Работа 4. Обнаружение каталазы крови.

В процессе тканевого дыхания образуется не только вода, но и токсичная для клеток перекись водорода. Разложение перекиси водорода катализируется гемсодержащим ферментом — каталазой:



Ход работы. В пробирку вносят 10–15 капель 3 % H₂O₂ и 1 каплю крови. Отмечают выделение пузырьков кислорода.

Результат:

Вывод:

Работа 5. Открытие пероксидазы.

Как и каталаза, пероксидаза — гемсодержащий фермент. Пероксидаза катализирует окисление некоторых веществ (фенолы, ароматические амины) в присутствии перекиси водорода. В организме млекопитающих пероксидазной активностью обладают гемоглобин, миоглобин и цитохромы. Об активности пероксидазы можно судить по изменению окраски гвяжковой смолы в присутствии перекиси водорода.

Ход работы. В две пробирки наливают по 5 капель 1 % раствора гвяжковой смолы и по 5 капель 3 % раствора H₂O₂. В первую пробирку добавляют 1 каплю крови, во вторую — 1 каплю H₂O. Наблюдают за изменением окраски.

Результат:

Вывод:

Подпись преподавателя:

ОБМЕН УГЛЕВОДОВ

ЗАНЯТИЕ 9 ПЕРЕВАРИВАНИЕ УГЛЕВОДОВ. ГЛИКОГЕНЕЗ И ГЛИКОГЕНОЛИЗ. ГЛИКОЛИЗ И СПИРТОВОЕ БРОЖЕНИЕ

Актуальность темы. В практике врача встречаются заболевания, сопровождающиеся нарушением переваривания и всасывания углеводов пищи. Диагностика этих состояний и правильный подход к лечению основаны на знаниях, полученных на этом занятии. Состояние гипоксии часто встречается при заболеваниях внутренних органов. Перестройки внутриклеточного обмена при таких состояниях затрагивают и процесс гликолиза. Разные органы обладают неодинаковой способностью адаптироваться к гипоксии, что и лежит в основе направленного врачебного вмешательства. Знакомство с процессом гликолиза дает представление о возможностях энергетического обеспечения клеток в анаэробных условиях.

Цель занятия: закрепить знания по структуре углеводов животных тканей и растительных углеводов пищи; сформировать представление об особенностях переваривания углеводов, транспорта глюкозы в клетки, о молекулярных механизмах депонирования и мобилизации гликогена, физиологическом значении и регуляции этих процессов; усвоить анаэробные процессы окисления глюкозы и их значение.

Требования к исходному уровню знаний. Для полного усвоения темы необходимо повторить из:

- биоорганической химии:
 - общее представление об углеводах;
 - химическое строение и свойства моносахаридов (глюкоза, галактоза, фруктоза);
 - строение олигосахаридов (мальтоза, лактоза, сахароза);
 - строение гомополисахаридов (крахмал, гликоген, декстраны, целлюлоза);
 - гидролиз полисахаридов *in vitro*;
- биохимии:
 - классификация ферментов, механизм действия, регуляция активности;
 - пути образования АТФ в клетках.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ ИСХОДНОГО УРОВНЯ ЗНАНИЙ

Задание 1. Укажите, какие моносахариды входят в состав следующих соединений:

- | | |
|----------------------------------|--------------|
| 1. Глюкоза + глюкоза. | A. Лактоза. |
| 2. Глюкоза + фруктоза. | Б. Мальтоза. |
| 3. Галактоза + глюкоза. | В. Сахароза. |
| 4. Фруктоза+ глюкоза+ галактоза. | Г. Рафиноза. |

Задание 2. Какие из перечисленных ниже углеводов имеют свободный полуацетальный гидроксил и будут обладать восстанавливающими свойствами?

- А. Сахароза. Б. Мальтоза. В. Крахмал. Г. Лактоза.

Правильность решений проверьте, сопоставив их с ответами.

Вопросы для обсуждения:

1. Переваривание углеводов, продукты. Нарушения переваривания и их молекулярные механизмы, симптомы, подходы к диагностике и лечению. Роль клетчатки и пектинов в питании человека.
2. Всасывание продуктов переваривания углеводов. Молекулярные механизмы, нарушения. Судьба всосавшихся моносахаридов. Транспорт глюкозы в клетки.
3. Синтез гликогена, назначение. Последовательность реакций, энергозатраты и регуляция. Агликогеноз.

4. Распад (фосфоролиз, гидролиз) гликогена в печени и мышцах. Последовательность реакций, регуляция. Гликогенозы.

5. Гликолиз, биологическая роль. Субклеточная локализация, этапы (неокислительный, гликолитической оксидоредукции), реакции, ферменты, энергетический выход и механизм образования АТФ. Регуляция гликолиза, ключевые ферменты.

6. Спиртовое брожение. Реакции, общие с гликолизом. Различие гликолиза и спиртового брожения, регуляция.

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ


1. Биологическая химия / В. К. Кухта [и др.]. Москва : Бином, Минск : Асап, 2008. С. 155–172.
2. Биологическая химия / А. Д. Таганович [и др.]. Минск : Выш. шк., 2013. С. 102–134.
3. Конспект лекций.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Задание 1. Выучите основные этапы переваривания углеводов в пищеварительном тракте. Усвойте, что в процессе переваривания углеводов происходит ферментативный гидролиз гликозидных связей. Запомните названия ферментов, принимающих участие в переваривании, и места их образования.

Задание 2. Вспомните способы всасывания моносахаридов из кишечника в кровь. Знать, что первое химическое превращение глюкозы в клетках — ее фосфорилирование, катализируемое гексокиназой (глюкокиназой). Умейте написать эту реакцию.

Рассмотрите схему превращения глюкозо-6-фосфата в клетке:



Задание 3. Запомните: а) из каких мономеров построен гликоген; б) какие связи соединяют мономеры в молекуле гликогена; в) в каких органах преимущественно откладывается гликоген.

3.1. Выучите реакции синтеза и распада (фосфоролиза) гликогена. Умейте писать их в виде схемы, запомните ферменты. Найдите необратимые стадии процессов и реакции, связанные с потреблением энергии.

3.2. Запомните реакции синтеза и распада гликогена, катализируемые регуляторными ферментами.

3.3. Объясните молекулярный механизм перехода фосфорилазы и гликогенсинтазы из неактивного состояния в активное.

Задание 4. Гликолиз — серия реакций, в результате которых глюкоза распадается на две молекулы пирувата. Умейте писать эти реакции.

4.1. Обратите внимание на то, что:

а) в гликолизе можно выделить несколько этапов:

— подготовительный (активирование глюкозы и распад глюкозо-6-фосфата на две молекулы глицеральдегид-3-фосфата);

- гликолитическая оксидоредукция (окисление глицеральдегид-3-фосфата до пирувата в аэробных условиях или до лактата в анаэробных условиях);
- б) большинство реакций гликолиза, за исключением трех, обратимы;
 - в) все промежуточные продукты находятся в фосфорилиированном состоянии;
 - г) источником фосфата при гликолизе является АТФ;
 - д) образование АТФ при гликолизе идет путем субстратного фосфорилирования.

4.2. Сравните гликолиз со спиртовым брожением, установите сходства и различия.

ПРОВЕРЬТЕ ВАШИ ЗНАНИЯ (САМОКОНТРОЛЬ УСВОЕНИЯ ТЕМЫ)

Задание 1. У больного, страдающего энтероколитом, после приема молока появились диарея, колики, метеоризм. С недостатком какого фермента это связано?

- А. Амилазы.
- Б. Сахаразы.
- В. Лактазы.
- Г. Мальтазы.
- Д. Гликогенсинтазы.

Задание 2. Часть поступившей в организм глюкозы откладывается в виде гликогена. Какой фермент участвует в его синтезе?

- А. Глюкозо-6-фосфатаза.
- Б. Фосфорилаза.
- В. Гликогенсинтаза.
- Г. α -1,4-Гликозидаза.
- Д. α -1,6-Гликозидаза.

Задание 3. Глюкозо-6-фосфат — основная активная форма глюкозы. Какой фермент участвует в ее образовании?

- А. Глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа.
- Б. Гексокиназа.
- В. Глюкозо-6-фосфатаза.
- Г. Глюкозо-1-фосфатуридилтрансфераза.
- Д. Фосфоглюкомутаза.

Задание 4. В гликолизе имеются реакции, приводящие к образованию макроэргических соединений. Укажите такую реакцию:

- А. Фосфодиоксиацитон \leftrightarrow глицеральдегид-3-фосфат.
- Б. 3-Фосфоглицерат \leftrightarrow 2-фосфоглицерат.
- В. Пируват \leftrightarrow лактат.
- Г. Глицеральдегид-3-фосфат \leftrightarrow 1,3-дифосфоглицерат.
- Д. Глюкоза \rightarrow глюкозо-6-фосфат.

Задание 5. Известно, что в гликолизе имеются реакции, сопряженные с синтезом АТФ путем субстратного фосфорилирования. Укажите такую реакцию:

- А. Глюкоза \rightarrow глюкозо-6-фосфат.
- Б. Фруктозо-6-фосфат \rightarrow фруктозо-1,6-дифосфат.
- В. Фосфодиоксиацитон \leftrightarrow глицеральдегид-3-фосфат.
- Г. Глицеральдегид-3-фосфат \leftrightarrow 1,3-дифосфоглицерат.
- Д. Фосфоенолпируват \rightarrow пируват.

Задание 6. В одной из реакций гликолиза образуется НАДН \cdot H $^+$. Какова его судьба в анаэробных условиях?

- А. Участвует в превращении малата в оксалоацетат.
- Б. Используется для восстановления оксалоацетата.
- В. Является источником электронов и H $^+$ для дыхательной цепи.
- Г. Превращает пируват в лактат.
- Д. Используется в субстратном фосфорилировании.

Ответы к решению заданий

Для самопроверки исходного уровня знаний:

1 (1 – Б; 2 – В; 3 – А; 4 – Г). 2 — Б, В, Г.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА (60 минут)

Работа 1. Спиртовое брожение.

Спиртовое брожение — ферментативный процесс распада глюкозы с образованием этилового спирта и углекислого газа:



Процесс гликолиза и брожение протекают одинаково до образования пировиноградной кислоты с выделением тепла и образованием двух молекул АТФ. В анаэробных условиях под действием дрожжевой декарбоксилазы (ТПФ) пировиноградная кислота декарбоксилируется и превращается в уксусный альдегид, который восстанавливается в этиловый спирт под действием алкогольдегидрогеназы.

Ход работы. Пробирку на 1/3 заполняют раствором дрожжей, доливают доверху 5 % раствором глюкозы и закрывают корковой пробкой со стеклянной трубкой. Такой бродильный аппарат помещают в термостат при 37 °С на 30–50 минут (в зависимости от активности ферментов дрожжей). Когда в процессе брожения произойдет накопление газа в верхней части пробирки, проделывают качественные реакции на CO₂ и спирт.

1. Обнаружение CO₂.

В бродильный аппарат наливают 10 % раствор NaOH почти до краев пробирки и, закрыв отверстие большим пальцем, перемешивают ее содержимое. Углекислый газ поглощается щелочью, создавая вакуум, и палец присасывается к отверстию пробирки.

2. Обнаружение этилового спирта.

Спирт можно открыть с помощью реакции получения йodoформа:



Для этого около 2–3 мл жидкости из бродильного аппарата отфильтровывают в пробирку, добавляют несколько капель 10 % раствора йода до получения желтого окрашивания и нагревают, не доводя до кипения, в пламени спиртовки. Через некоторое время ощущается характерный запах йodoформа.

Результаты:

Вывод:

Работа 2. Количественное определение пировиноградной кислоты в моче.

Пировиноградная кислота — один из промежуточных продуктов углеводного обмена.

В анаэробных условиях (гипоксия) пировиноградная кислота восстанавливается в лактат. В аэробных условиях пировиноградная кислота под влиянием пируватдегидрогеназного комплекса (коферменты: ТПФ, липоевая кислота в виде амида, КоA-SH, НАД⁺, ФАД) в результате окислительного декарбоксилирования превращается в ацетил-КоА, который в цикле Кребса окисляется до CO₂ и H₂O.


За сутки с мочой выделяется 113,7–283,9 мкмоль (10–25 мг) пировиноградной кислоты.

Принцип метода. Пировиноградная кислота, взаимодействуя с 2,4-динитрофенилгидразином в щелочной среде, образует 2,4-динитрофенилгидразоны пировиноградной кислоты желто-оранжевого цвета, интенсивность окрашивания которых пропорциональна концентрации пировиноградной кислоты.

Ход работы. Берут 2 пробирки: в контрольную наливают 1 мл H_2O , а в опытную — 1 мл мочи. Затем в обе пробирки приливают по 0,5 мл 2,4-динитрофенилгидразина и оставляют на 20 мин при комнатной температуре. После этого в каждую пробирку добавляют по 5 мл 0,4н NaOH и через 10 мин колориметрируют опытную пробу против контрольной пробы на реактивы в кюветах 10 мм с зеленым светофильтром (длина волны 540 нм).

Расчет проводят по готовому калибровочному графику. Найденную величину умножают на суточный диурез (1500 мл для мужчин и 1200 мл для женщин) и получают содержание пировиноградной кислоты в суточной моче. Коэффициент пересчета в единицы СИ (мкмоль/сут) — 11,4.

Клинико-диагностическое значение. При авитаминозе и гиповитаминозе В₁ в крови и других тканях, особенно в мозге, накапливается большое количество пировиноградной кислоты и увеличивается ее выделение с мочой. Содержание этой кислоты в крови возрастает при сахарном диабете, сердечной недостаточности, гиперфункции гипофизарно-адреналовой системы. Количество пировиноградной кислоты увеличивается после введения некоторых лекарств — камфоры, стрихнина, адреналина. При наркозе содержание этой кислоты в крови снижается.



Калибровочный график зависимости величины оптической плотности раствора (D) от концентрации ПВК в пробе

Результат: $D =$ $C =$

Расчет:

Вывод:

Подпись преподавателя:

ЗАНЯТИЕ 10
ПУТИ МЕТАБОЛИЗМА ПИРУВАТА. ГЛЮКОНЕОГЕНЕЗ.
АЭРОБНЫЙ РАСПАД ГЛЮКОЗЫ ДО КОНЕЧНЫХ ПРОДУКТОВ (CO₂ и H₂O).
КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ

Актуальность темы. Изучаются центральные пути, обеспечивающие связь анаболизма и катаболизма, пути, в которые вовлечены основные пищевые вещества (углеводы, белки, жиры). Понимание значения центральных метаболических путей, аэробных процессов обмена глюкозы для энергообеспечения клеток различных органов позволяет понять механизмы нарушения функций отдельных органов и систем при торможении этих процессов (гипогликемическая кома, ишемия и инфаркт миокарда и др.). В медицинской практике некоторые промежуточные продукты этих путей используются для коррекции метаболических нарушений (лимонная кислота, никотинамид, кокарбоксилаза, компоненты адениловой системы и др.). Содержание глюкозы в крови — основной биохимический показатель состояния углеводного обмена в организме. Отклонение его от нормы происходит при ряде заболеваний. На занятии изучаются механизмы поддержания нормального уровня глюкозы в крови.

Цель занятия: закрепить знания о путях превращения ПВК в клетках в зависимости от энергетического статуса и особенностей окислительного метаболизма клеток, о глюконеогенезе как важном процессе поддержания уровня глюкозы в крови; сформировать представление о взаимосвязи центральных путей метаболизма с аэробным гликолизом; овладеть глюкооксидазным методом количественного определения глюкозы.

Требования к исходному уровню знаний. Для полного усвоения темы необходимо повторить из:

- *биоорганической химии:*
 - реакции окислительного декарбоксилирования α -кетокислот;
 - реакции альдольной конденсации;
 - природные макроэргические ацилирующие реагенты;
- *биологической химии:*
 - тканевое дыхание, субстраты, механизм;
 - гликолиз;
 - окислительное декарбоксилирование ПВК;
 - цикл трикарбоновых кислот.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ ИСХОДНОГО УРОВНЯ ЗНАНИЙ

Задание 1. Подберите к каждому ферменту соответствующий кофермент:

- | | |
|---|---------------------------|
| 1. НАДН·H ⁺ – дегидрогеназа. | A. ФАД. |
| 2. QH ₂ – дегидрогеназа. | Б. Гем. |
| 3. Цитохромоксидаза. | В. ФМН. |
| 4. Малатдегидрогеназа. | Г. Гем, Cu ⁺ . |
| 5. Сукцинатдегидрогеназа. | Д. НАД ⁺ . |
| | Е. НАДФ ⁺ . |

Задание 2. Укажите, к какому классу относятся перечисленные ферменты:

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| 1. Гексокиназа. | A. Оксидоредуктазы. |
| 2. Альдолаза. | Б. Лиазы. |
| 3. Фософруктокиназа. | В. Лигазы. |
| 4. Фосфоглицераткиназа. | Г. Трансферазы. |
| 5. Дегидрогеназа 3-ФГА. | Д. Гидролазы. |
| 6. Енолаза. | Е. Изомеразы. |
| 7. Пируваткиназа. | |
| 8. Триозофосфатизомераза. | |

Задание 3. Укажите, в каких реакциях гликолиза используется, а в каких синтезируется АТФ:

- | | |
|---|--|
| 1. $2\text{-ФГК} \leftrightarrow \text{ФЕПВК}$. | A. Используется АТФ как донор фосфатной группы. |
| 2. $3\text{-ФГА} \leftrightarrow 1,3\text{-ДФГК}$. | B. Синтезируется АТФ. |
| 3. $\text{Фр-6-ф} \rightarrow \text{фр-1,6-фф}$. | C. Реакция не связана с затратой или синтезом АТФ. |
| 4. $\text{ФЕПВК} \rightarrow \text{ПВК}$. | |
| 5. $\text{Гл} \rightarrow \text{гл-6-ф}$. | |
| 6. $1,3\text{-ДФГК} \leftrightarrow 3\text{-ФГК}$. | |
| 7. $\text{Фр-1,6-фф} \leftrightarrow 3\text{-ФГА} + \text{ФДА}$. | |

Задание 4. Аэробный распад глюкозы — это процесс полного окисления ее до CO_2 и H_2O . Он включает реакции аэробной дихотомии (сравните с анаэробной) и последующее окисление пирувата в общем пути катаболизма.

4.1. Напишите реакции, катализируемые отдельными ферментами пируватдегидрогеназного комплекса:


4.2. Определите количество молей АТФ, синтезируемое за счет дегидрирования 1 моля ПВК. Для этого:

- напишите суммарное уравнение окислительного декарбоксилирования;
- покажите путь от восстановленного кофермента до кислорода;
- вспомните определение коэффициента фосфорилирования и рассчитайте его для этого процесса.

Задание 5. Вспомните последовательность реакций, составляющих цитратный цикл, название ферментов, катализирующих эти реакции, и их коферменты.

5.1. Используя схему связи общего пути катаболизма с цепью тканевого дыхания, проследите путь водорода от окисляемых субстратов к кислороду и оцените выход АТФ для отдельных реакций и общего пути катаболизма в целом.

5.2. Расставьте в уравнении соответствующие коэффициенты:



Для этого:

- найдите на схеме связи общего пути катаболизма с цепью тканевого дыхания реакции, в которых происходит декарбоксилирование, выпишите названия метаболитов, которые декарбоксилируются;
- найдите на схеме реакции дегидрирования и выпишите названия первичных доноров водорода;
- найдите на схеме компоненты дыхательной цепи, на которые поступает водород от первичных доноров.

Правильность решений проверьте, сопоставив их с ответами.

Вопросы для обсуждения:

1. Пируват как центральный метаболит. Пути превращения ПВК в зависимости от энергетического статуса и особенностей окислительного метаболизма клеток.
2. Восстановление пируата в лактат (реакция, изоферменты ЛДГ, назначение реакций), цикл Кори. Утилизация лактата клетками.
3. Глюконеогенез (назначение, субстраты, ключевые реакции и ферменты, регуляция, энергозатраты).
4. Аэробное окисление глюкозы до CO_2 и H_2O (этапы, сопряжение с процессом окислительного фосфорилирования, энергетика). Челюстные механизмы транспорта цитоплазматического НАДН $\cdot\text{H}^+$ в митохондрию.

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ

1. *Биологическая химия* / В. К. Кухта [и др.]. Москва : Бином, Минск : Асар, 2008. С. 172–182.
2. *Биологическая химия* / А. Д. Таганович [и др.]. Минск : Выш. шк., 2013. С. 134–142.
3. Конспект лекций.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Задание 1. Выучите:

- а) реакции синтеза глюкозы из ПВК (умейте писать);
- б) ферменты глюконеогенеза (обратите внимание на ключевые ферменты);
- в) основные субстраты и пути их включения в глюконеогенез.

Задание 2. Образовавшийся в сердечной мышце лактат наряду с диффузией в кровь окисляется в самих кардиомиоцитах в аэробных условиях. Укажите этапы окисления лактата и энергетический выход этого процесса.

Правильность решений проверьте, сопоставив их с ответами.

ПРОВЕРЬТЕ ВАШИ ЗНАНИЯ (САМОКОНТРОЛЬ УСВОЕНИЯ ТЕМЫ)

Задание 1. Сколько молей АТФ может синтезироваться при окислении 1 моля субстрата в указанных реакциях:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Пируват $\rightarrow \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$. | А. 2,5 моль. |
| 2. Ацетил-КоА $\rightarrow \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$. | Б. 4 моль. |
| 3. Пируват \rightarrow ацетил -КоА. | В. 10 моль. |
| 4. Сукцинат \rightarrow ЩУК. | Г. 12,5 моль. |

Задание 2. Назовите ферменты, катализирующие следующие реакции:

1. Оксалоацетат + ацетил-КоА + $\text{H}_2\text{O} \rightarrow$ цитрат + HS-КоА.
 2. Изоцитрат + НАД $^+$ $\rightarrow \alpha$ -кетоглутарат + CO_2 + НАДН $\cdot\text{H}^+$.
 3. Сукцинил-КоА + ГДФ + $\text{H}_3\text{PO}_4 \leftrightarrow$ сукцинат + ГТФ + HS-КоА.
 4. Фумарат + $\text{H}_2\text{O} \leftrightarrow$ малат.
- А. Фумаратгидратаза.
Б. Цитратсинтаза.
В. Сукцинил-КоА-синтетаза.
Г. Изоцитратдегидрогеназа.

Задание 3. Глюконеогенез — ферментативный процесс, включающий необратимые реакции. Выберите фермент, участвующий в одной из них:

- А. Гексокиназа.
Б. Пируваткарбоксилаза.
В. Лактатдегидрогеназа.
Г. Пируватдегидрогеназа.
Д. Пируватдекарбоксилаза.

Задание 4. В образовании ацетил-КоА из пирувата участвует мультиферментный комплекс. Выберите коферменты, необходимые для работы этого комплекса:

- А. ФМН, HS-КоА, ТПФ, НАД⁺.
- Б. ФМН, HS-КоА, ТПФ, НАД⁺, ЛК.
- В. ФМН, HS-КоА, ТПФ, НАДФ⁺.
- Г. ФАД, HS-КоА, ТПФ, НАД⁺, ЛК.
- Д. ФАД, HS-КоА, ТПФ, НАД⁺.

Задание 5. В глюконеогенезе имеются необратимые реакции. Выберите из перечисленных необратимую:

- А. Фруктозо-6-фосфат → глюкозо-6-фосфат.
- Б. 2-Фосфоглицерат → 3-фосфоглицерат.
- В. Лактат → пируват.
- Г. Пируват → фосфоенолпируват.
- Д. Фосфодиоксиацетон → глицеральдегид-3-фосфат.

Задание 6. В процессе синтеза глюкозы из пирувата затрачивается энергия. Сколько молей АТФ необходимо для этого метаболического пути?

- А. 2 АТФ.
- Б. 4 АТФ.
- В. 6 АТФ.
- Г. 5 АТФ.
- Д. 7 АТФ.

Ответы к решению заданий

Для самопроверки исходного уровня знаний:

- 1. 1 – В; 2 – Б; 3 – Г; 4 – Д; 5 – А.
- 2. 1 – Г; 2 – Б; 3 – Г; 4 – Г; 5 – А; 6 – Б; 7 – Г; 8 – Е.
- 3. 1 – В; 2 – В; 3 – А; 4 – Б; 5 – А; 6 – Б; 7 – В.


Для самостоятельной работы:

2 — 15 АТФ.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА (60 минут)

Определение концентрации глюкозы в сыворотке крови ферментативным методом.

Принцип метода. Метод основан на следующих ферментативных реакциях:



Образующийся продукт имеет розовую окраску. Интенсивность окраски прямо пропорциональна концентрации глюкозы и измеряется фотометрически.

Ход работы. Белки сыворотки крови осаждают депротеинизирующим реагентом. Глюкозу определяют в надосадочной жидкости после центрифугирования.

Схема постановки опыта:

	Опытная проба, мл	Стандартная проба, мл
В центрифужные пробирки вносят:		
Сыворотка крови	0,1	—
Стандартный раствор глюкозы	—	0,1
Депротеинизирующий раствор (3 % ТХУ)	1,0	1,0
Перемешивают и центрифугируют при 3000 об/мин в течение 15 минут		
В сухие пробирки вносят:		
Надосадочная жидкость	0,2	0,2
Рабочий раствор ферментов	2,0	2,0
Перемешивают и инкубируют реакционную смесь 10 мин при 37 °C или 30 мин при комнатной температуре		

По окончании инкубации измеряют оптическую плотность опытной и стандартной проб на ФЭК (длина волны 490–540 нм) в кюветах 5 мм против контроля.

Контрольная проба содержит 0,2 мл дегидратирующего раствора и 2,0 мл рабочего раствора ферментов. Контрольную пробу можно готовить одну на группу.

Расчет производят по формуле:

$$C_{\text{оп.}} = E_{\text{оп.}} \cdot C_{\text{ст.}} / E_{\text{ст.}},$$

где $C_{\text{оп.}}$ — концентрация глюкозы в крови (ммоль/л); $C_{\text{ст.}}$ — концентрация глюкозы в стандартном растворе (5,5 ммоль/л); $E_{\text{оп.}}$ — экстинкция опытной пробы; $E_{\text{ст.}}$ — экстинкция стандартной пробы.

Нормальные величины концентрации глюкозы в плазме и сыворотке крови — 3,9–6,1 ммоль/л, в спинномозговой жидкости — 2,78–3,89 ммоль/л.

Результат: $E_{\text{оп.}} =$

$E_{\text{ст.}} =$

Расчет:

Клинико-диагностическое значение. Нормальные величины концентрации глюкозы в плазме и сыворотке крови — 3,9–6,1 ммоль/л, в спинномозговой жидкости — около 2,78–3,89 ммоль/л.

Увеличение содержания глюкозы в крови (гипергликемия) наблюдается при сахарном диабете, остром панкреатите, панкреатических циррозах, эмоциональных стрессах, после эфирного наркоза, обильного приема углеводов с пищей, а также при повышении гормональной активности ряда желез (щитовидной, гипофиза, коркового и мозгового слоя надпочечников).

Снижение уровня глюкозы в крови (гипогликемия) встречается при поражении паренхимы печени, нарушении ферментативной активности при распаде гликогена; недостаточной функции щитовидной железы, надпочечников, гипофиза; передозировке инсулина при лечении сахарного диабета, нарушении всасывания углеводов, отравлениях фосфором, бензолом, хлороформом, при недостатке приема с пищей углеводов, после больших потерь крови.

Вывод:

Подпись преподавателя:

ЗАНЯТИЕ 11
ВТОРИЧНЫЕ ПУТИ ОБМЕНА ГЛЮКОЗЫ.
МЕТАБОЛИЗМ ГАЛАКТОЗЫ, ФРУКТОЗЫ, ЭТАНОЛА.
ВЛИЯНИЕ ГОРМОНОВ НА УРОВЕНЬ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ

Актуальность темы. Пентозофосфатный путь (ПФП) и глюкуроновый путь обмена глюкозы не приводят к синтезу АТФ. Они выполняют следующие главные функции: 1) образование НАДФН·Н⁺ для восстановительных синтезов (ПФП); 2) обеспечение рибозой синтеза нуклеотидов и нуклеиновых кислот (ПФП); 3) образование глюкуроновой кислоты для синтеза гетерополисахаридов соединительной ткани и детоксикации продуктов метаболизма и ксенобиотиков (чужеродных веществ) в печени путем их связывания и выведения в виде глюкуронидов (глюкуроновый путь).

Недостаточность ряда ферментов ПФП — причина гемолиза эритроцитов. Тот факт, что аскорбиновая кислота — незаменимый компонент пищи у морских свинок и приматов (в том числе и человека), объясняется отсутствием одного из ферментов синтеза этого витамина из гулоновой кислоты (у большинства других млекопитающих он есть).

Будущему врачу необходимо четко представлять, как протекает метаболизм фруктозы и галактозы у человека, поскольку недостаточная активность ферментов, участвующих в обмене этих гексоз, приводит к таким заболеваниям, как идиопатическая фруктозурия и галактоземия. Знание особенностей обмена этанола в организме необходимо для понимания патогенеза алкоголизма и основных подходов к его терапии.

Концентрация глюкозы в крови поддерживается на постоянном уровне и находится под строгим гормональным контролем. В связи с этим патологические изменения со стороны эндокринной системы нередко сопровождаются нарушением углеводного обмена. Так, недостаток инсулина приводит к гипергликемии и сахарному диабету.


Цель занятия: сформировать представление о значении пентозофосфатного и глюкуронового путей превращения глюкозы; изучить метаболизм галактозы, фруктозы, этанола; усвоить роль гормональной регуляции обмена углеводов в поддержании концентрации глюкозы в крови для умения интерпретировать характер биохимических нарушений у больных при патологии углеводного обмена.

Требования к исходному уровню знаний. Для полного усвоения темы необходимо повторить из:

- *биоорганической химии:*
 - строение и свойства рибозы, дезоксирибозы, галактозы, фруктозы, глюкуроновой кислоты;
 - реакции альдольной конденсации;
- *нормальной физиологии:*
 - нейрогормональные механизмы регуляции углеводного обмена.

Для проверки исходного уровня знаний выполните следующее задание:

Задание 1. Напишите названия углеводов:



Правильность решения проверьте, сопоставив его с ответами.

Вопросы для обсуждения:

1. Пентозофосфатный путь (субклеточная локализация, этапы, ключевые ферменты, метаболиты, биологическая роль).
2. Глюкуроновый путь (тканевая и субклеточная локализация, пути метаболизма глюкуроновой кислоты, биологическая роль).
3. Катаболизм фруктозы в печени, схема реакций. Нарушения обмена фруктозы (идиопатическая фруктозурия, врожденная непереносимость фруктозы), молекулярные механизмы, подходы к диагностике и лечению.
4. Катаболизм галактозы в печени, схема реакций. Нарушение обмена галактозы (галактоземия), причины, подходы к диагностике и лечению.
5. Метаболизм экзогенного этанола (пути, схема реакций).
6. Регуляция содержания глюкозы в крови. Механизмы регуляторного действия гормонов (инсулин, адреналин, глюкагон, глюкокортикоиды и др.).

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ

Основная

1. *Биологическая химия* / В. К. Кухта [и др.]. Москва : Бином, Минск : Асап, 2008. С. 182–192.
2. *Биологическая химия* / А. Д. Таганович [и др.]. Минск : Выш. шк., 2013. С. 142–162.
3. Конспект лекций.

Дополнительная

1. *Лениндженер, А.* Основы биохимии / А. Лениндженер. Москва : Мир, 1985.
2. *Биохимия человека* / Р. Марри [и др.]. Москва : Мир, 1993. Т. 1. С. 199–224.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Задание 1. Рассмотрите реакции, составляющие окислительный этап ПФП. Обратите внимание на то, что в двух реакциях дегидрирования в качестве кофермента используется НАДФ⁺.

1.1. Вспомните и укажите сходство и различия в структуре и функциях НАДН·Н⁺ и НАДФН·Н⁺.

1.2. Запомните:

а) отличия неокислительного этапа ПФП от окислительного (ферменты, коферменты, обратимость реакций). Обратите внимание на значение окислительной и неокислительной части ПФП;

б) наиболее активно ПФП протекает в печени, жировой ткани, лактирующей молочной железе, коре надпочечников, половых железах, эритроцитах, макрофагах.

Умейте объяснить значение ПФП для этих клеток и тканей.

1.3. Обратите внимание на то, что окислительный путь образования пентоз и путь превращения пентоз в гексозы (неокислительный) вместе могут составлять циклический процесс — пентозофосфатный цикл. Выучите суммарное уравнение пентозофосфатного цикла. Напишите стехиометрические коэффициенты для превращения:

? Пентозо-5-фосфат → ? глюкозо-6-фосфат.

Задание 2. Ознакомьтесь со схемой глюкуронового пути обмена углеводов. Отметьте для себя главные промежуточные метаболиты этого пути.

2.1. Умейте объяснить роль глюкуронового пути для печени и фибробластов, ответьте на вопрос: какие из приведенных утверждений о глюкуроновом пути обмена глюкозы являются справедливыми?

А. Обеспечивает потребности гепатоцитов в УДФ-глюкуроновой кислоте для реакций обезвреживания билирубина, стероидов, лекарственных веществ и ксенобиотиков.

Б. Метаболиты глюкуронового пути используются для синтеза протеогликанов основного вещества соединительной ткани.

В. Это источник гулоноевой кислоты для синтеза аскорбиновой кислоты у большинства животных.

Г. Это дополнительный путь синтеза пентоз.

Д. Выполняет энергетическую функцию.

2.2. Разберитесь, в чем будет проявляться недостаточность фермента, превращающего L-ксилулозу в D-ксилулозу.

Задание 3. Запомните, что сродство фермента гексокиназы к фруктозе значительно ниже, чем к глюкозе, поэтому вероятность участия этого фермента в превращении фруктозы крайне мала. Напишите реакцию, которую катализирует печеночный фермент — фруктокиназа:

3.1. Оцените последствия недостаточности ферментов, участвующих в превращении фруктозы в глюкозу. Верны ли высказывания:

А. Идиопатическая фруктузуря сопровождается выведением нефосфорилированной фруктозы с мочой, ПОТОМУ ЧТО дефицит фермента фруктокиназы не позволяет осуществлять нормальный метаболизм экзогенной фруктозы;

Б. При генетически обусловленной непереносимости фруктозы наблюдается индуцируемая фруктозой гипоглюкоземия, потому что накапливающийся фруктозо-1-фосфат блокирует мобилизацию глюкозы из гликогена путем ингибирования фосфорилазы печени.

3.2. Подпишите ферменты и коферменты, которые осуществляют цепочку превращений:



Ответьте на вопрос: обратим ли этот процесс?

Задание 4. Разберитесь, каким образом включается в метаболизм галактозы, поступающая с пищей.

4.1. У ребенка с рождения отмечаются рвота и диарея после каждого кормления. При обследовании выявлено отставание в массе тела, увеличение печени, желтуха, задержка нервно-психического развития, частичное помутнение хрусталика.

Ответьте на вопросы:

А. Ваш предположительный диагноз?

Б. Лабораторный анализ активности какого фермента можно провести, чтобы подтвердить диагноз?

В. Какие рекомендации по кормлению ребенка Вы дадите матери?

4.2. Запомните, что галактоза необходима:

- а) для синтеза лактозы в лактирующей молочной железе;
- б) для синтеза гликолипидов, гликопротеинов и протеогликанов.

Обратите внимание на возможность синтеза галактозы из глюкозы и умейте схематически изобразить этот процесс.

Задание 5. Рассмотрите основной путь метаболизма этилового спирта. Запомните, что метаболизм этанола на 90 % происходит в печени, поэтому при любой патологии, сопровождающейся нарушением функции печени, наблюдается снижение толерантности к алкоголю.

5.1. Для окисления 50 г этанола требуется такое же количество НАД⁺, как и для окисления 200 г глюкозы. Причем обмен этанола осуществляется значительно быстрее, чем окисление глюкозы. Учитывая эту информацию, ответьте на вопросы:

а) как изменится при приеме алкоголя отношение НАДН·Н⁺/НАД⁺ в клетках печени?

б) как изменится в этих условиях концентрация пирувата и лактата в клетках печени?

Ответ подтвердите соответствующей реакцией.

5.2. Верно ли высказывание: при приеме алкоголя отмечается гипогликемия, ПОТОМУ ЧТО в этих условиях в клетках печени снижается концентрация пирувата, что приводит к снижению скорости глюконеогенеза, являющегося одним из источников глюкозы в крови.

Задание 6. Заполните таблицу, обобщающую сведения о влиянии гормонов на обмен углеводов, выбирая правильные варианты ответов из приведенных ниже:

Название гормона	Место синтеза гормона	Химическая природа гормона	Ткани-мишени	Влияние на процессы обмена углеводов	Влияние на концентрацию глюкозы в крови
Инсулин					
Адреналин					
Глюкагон					
Кортизол					

6.1. Место синтеза гормона:

- а) α -клетки островков Лангерганса поджелудочной железы;
- б) клетки коркового слоя надпочечников;
- в) клетки мозгового слоя надпочечников;
- г) β -клетки островков Лангерганса поджелудочной железы.

6.2. По химической природе представляют собой:

- а) белок;
- б) полипептид;
- в) производное тирозина;
- г) стероид.

6.3. Ткани-мишени для этих гормонов:

- а) печень;
- б) мышечная ткань (гладкая, поперечно-полосатая);
- в) жировая ткань.

6.4. Концентрация глюкозы в крови зависит от скорости следующих процессов:

- а) поступление глюкозы из кишечника в кровь;
- б) синтез гликогена;
- в) мобилизация гликогена;
- г) глюконеогенез;
- д) поступление глюкозы из крови в клетки.

6.5. Запомните: концентрация глюкозы в плазме (сыворотке) крови в норме — **3,9–6,1 ммоль/л.**

6.6. Подберите соответствующие пары гормон – механизм действия:

- | | |
|---------------|---|
| 1. Кортизол. | A. Активация аденилаткиназы → повышение уровня цАМФ в клетке → активация протеинкиназы А → фосфорилирование ферментов, участвующих в обмене глюкозы, и изменение их активности. |
| 2. Адреналин. | B. Ускорение транспорта глюкозы через мембранные клеток-мишени, активация фосфодиэстеразы и снижение уровня цАМФ в клетке. |
| 3. Инсулин. | C. Индукция синтеза ферментов на генетическом уровне. |

Правильность решений проверьте, сопоставив их с ответами.

ПРОВЕРЬТЕ ВАШИ ЗНАНИЯ (САМОКОНТРОЛЬ УСВОЕНИЯ ТЕМЫ)

Задание 1. Тиаминпирофосфат — необходимый кофермент для следующего фермента ПФП:

- А. Эпимераза. Б. Трансальдолаза. В. Изомераза. Г. Транскетолаза. Д. Дегидрогеназа.

Задание 2. Применение некоторых лекарственных препаратов может вызвать гемолиз эритроцитов, снижение содержания гемоглобина в крови, желтуху (лекарственная гемолитическая анемия). Причиной является нарушение в эритроцитах реакции восстановления дисульфидной формы глутатиона в сульфгидрильную:



Восстановленный глутатион (Г-SH) — необходимый фактор для восстановления SH-групп в гемоглобине, поддержания нормальной формы эритроцитов, стабилизации клеточной мембраны и т. д. Недостаточная активность каких ферментов ПФП может быть причиной заболевания?

Задание 3. Метаболиты ПФП могут быть использованы для синтеза:

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| А. НАД ⁺ . | Г. Кофермента А. |
| Б. ФАД. | Д. Жирных кислот. |
| В. УТФ. | Е. Половых гормонов. |

Задание 4. Пищевая фруктоза фосфорилируется в печени и расщепляется с образованием:

- А. Двух молекул фосфодиоксиациетона.
Б. Молекулы фосфодиоксиациетона и глицеринового альдегида.
В. Молекулы диоксиациетона и 3-фосфоглицеринового альдегида.
Г. Молекулы фосфодиоксиациетона и 3-фосфоглицеринового альдегида.
Д. Двух молекул 3-фосфоглицеринового альдегида.

Задание 5. Какой из следующих ферментов не участвует в реакциях последовательного превращения галактозы в УДФ-глюкозу?

- | | |
|-------------------|-----------------------|
| А. Галактокиназа. | В. Фосфоглюкомутаза. |
| Б. Эпимераза. | Г. Уридилтрансфераза. |

Задание 6. У больного хронический гепатит с признаками печеночной недостаточности. На приеме у врача он спрашивает, как часто может употреблять спиртные напитки. Что бы вы посоветовали больному? Обоснуйте свой ответ.

Задание 7. Кофеин ингибирует 3',5'-фосфодиэстеразу, превращающую цАМФ в АМФ. Какой из перечисленных эффектов будет наблюдаться после воздействия кофеина?

- А. Снижение активности протеинкиназы А в печени.
Б. Снижение активности протеинкиназы А в мышцах.
В. Повышение активности пируваткиназы в печени.
Г. Снижение активности гликогенсинтазы в печени.

Задание 8. Больной сахарным диабетом после инъекции инсулина не смог своевременно поесть. На работе его состояние резко ухудшилось. Врач скорой помощи при осмотре отмечает беспокойство больного, бледность и влажность кожных покровов, угнетение рефлексов. Уровень глюкозы в крови составляет 2,8 ммоль/л. Что следует срочно ввести этому пациенту?

А. Адреналин. Б. Глюкозу. В. Инсулин. Г. Нитроглицерин.

Задание 9. Почечный порог для глюкозы составляет:

А. 5,5 ммоль/л. Б. 10 ммоль/л. В. 20 ммоль/л. Г. 30 ммоль/л.

Ответы к решению заданий

Для самопроверки исходного уровня знаний:

1 — а) Глюкоза; б) Галактоза; в) Глюкуроновая кислота; г) Рибоза.

Для самостоятельной работы:

2.1 — А, Б, В, Г. 3.1. А — верно; Б — верно.

4.1. А — галактоземия; Б — Гал-1-фосфат-уридилтрансфераза; В — исключить галактозу из пищи (искусственное вскармливание).

5.1 — а) увеличится; б) пируват снижается, лактат нарастает; 5.2 — верно.

6.6. 1 — В; 2 — А; 3 — Б, В.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА (60 минут)

Изучение влияния гормонов на содержание глюкозы в крови.

Для изучения влияния гормонов на уровень глюкозы в крови предлагаются три пробы крови (опытные). Одна из них взята до введения гормонов, другая — после введения инсулина, а третья — после введения адреналина.

1. Определите содержание глюкозы в каждой из проб.

2. На основании полученных результатов сделайте вывод, какая из проб соответствует приведенным выше состояниям.

Определение концентрации глюкозы в пробах проводят **ферментативным (глюкозооксидазным) методом**. Параллельно ставят опытные и стандартную пробы.

Ход работы: см. предыдущее занятие. Контрольную пробу можно готовить одну на группу.

Расчет концентрации глюкозы производят по формуле:

$$C_{\text{оп}} \text{ (ммоль/л)} = E_{\text{оп}} \cdot C_{\text{ст}} (5,5 \text{ ммоль/л}) / E_{\text{ст}}$$

Результаты:

Проба	Оптическая плотность (E)	Концентрация глюкозы (ммоль/л)
1		
2		
3		
Стандарт		5,55

Нормальные величины концентрации глюкозы в плазме и сыворотке крови — 3,9–6,1 ммоль/л, в спинномозговой жидкости — около 2,78–3,89 ммоль/л.

Вывод:

Подпись преподавателя:

ЗАНЯТИЕ 12
КОЛЛОКВИУМ ПО ТЕМАМ «ВВЕДЕНИЕ В МЕТАБОЛИЗМ»,
«ЦЕНТРАЛЬНЫЕ МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ПУТИ», «БИОЛОГИЧЕСКОЕ
ОКИСЛЕНИЕ», «ОКИСЛИТЕЛЬНОЕ ФОСФОРИЛИРОВАНИЕ»,
«ОБМЕН УГЛЕВОДОВ»

Вопросы для подготовки к коллоквиуму:

1. Метаболизм. Понятие о катаболизме (привести примеры) и об анаболизме (привести примеры), различия и связь между ними на уровне субстрата, восстановленных коферментов, энергии и регуляторов обмена.

2. Виды метаболических путей. Понятие о ключевых (регуляторных) ферментах. Центральные (общие) пути метаболизма.

3. Адениловая система, ее компоненты, роль в клетке. Способы синтеза АТФ в клетке и способы ее гидролиза. Перечислите реакции и процессы, сопряженные с гидролизом АТФ. Их роль для клеток и организмов.

4. Окислительное декарбоксилирование ПВК. Почему процесс окислительного декарбоксилирования пирувата называют центральным метаболическим путем (покажите на схеме катаболизма)? Напишите суммарное уравнение и реакции окислительного декарбоксилирования пирувата. Укажите ферменты и коферменты пируватдегидрогеназного комплекса. Какие витамины участвуют в этом процессе? Что произойдет при дефиците этих витаминов в организме? Как осуществляется регуляция пируватдегидрогеназного комплекса? Рассчитайте энергетический выход (в молях АТФ) окисления пирувата до конечных продуктов обмена.

5. Цикл трикарбоновых кислот. Почему цикл Кребса является центральным метаболическим путем? Покажите на схеме. Функции ЦТК. Что такое анаплеротические реакции (пример такой реакции)? Напишите схему ЦТК, назовите витамины, участвующие в этом процессе. Какие реакции цикла Кребса связаны с комплексами дыхательной цепи? Сколько моль АТФ можно при этом получить? Покажите это на схеме ферментов тканевого дыхания. Рассчитайте энергетический баланс окисления ацетил-КоА. Катаболическая функция цикла Кребса. Умейте рассчитать и показать на схеме, сколько АТФ синтезируется в митохондриях при окислении различных субстратов (аминокислоты) до конечных продуктов:

- а) тир \rightarrow фумарат \rightarrow CO₂ + H₂O;
- б) про \rightarrow α -кетоглутарат \rightarrow CO₂ + H₂O;
- в) асн \rightarrow оксалоацетат \rightarrow CO₂ + H₂O;
- г) арг \rightarrow α -кетоглутарат \rightarrow CO₂ + H₂O;
- д) мет \rightarrow сукцинил-КоА \rightarrow CO₂ + H₂O;
- е) фен \rightarrow ацетил-КоА \rightarrow CO₂ + H₂O;
- ж) вал \rightarrow сукцинил-КоА \rightarrow CO₂ + H₂O;
- з) гис \rightarrow α -кетоглутарат \rightarrow CO₂ + H₂O;
- и) иле \rightarrow сукцинил-КоА \rightarrow CO₂ + H₂O.

6. Виды биологического окисления. Витамины РР и В₂ как участники окислительно-восстановительных реакций. Нарисуйте блок-схемы НАД⁺, НАДФ⁺, ФМН и ФАД. Оксигеназный путь утилизации кислорода в клетках. Ферменты. Окисление в микросомах. Схема микросомальной цепи. Сравните оксидазный и оксигеназный пути утилизации кислорода. Роль этих процессов в клетке.

7. Тканевое дыхание. Схема ферментов тканевого дыхания. Комплексы дыхательной цепи. Укажите на схеме участки с энергией, достаточной для образования АТФ. На основании какого измеряемого показателя можно определить количество энергии, выделяемой в реакции переноса электронов? Регуляция активности ферментов дыхательной цепи, роль АДФ, АТФ. Умейте изобразить схему ферментов тканевого дыхания для НАД-зависимых и ФАД-зависимых субстратов. Умейте включать субстраты цикла Кребса (изоцитрат, α -кето-

глутарат, малат, сукцинат) в дыхательную цепь. Определите, чему равен коэффициент фосфорилирования (Р/О) для каждого из этих субстратов. На схеме обязательно указывайте участки сопряжения транспорта электронов и фосфорилирования. Можно ли использовать для окисления субстратов в митохондриях НАДФ⁺? Роль НАДФ⁺ в клетке.

8. Что такое окислительное фосфорилирование (определение, субклеточная локализация)? Основные положения теории П. Митчелла, объясняющие механизм окислительного фосфорилирования. Как изменяется процесс окислительного фосфорилирования при недостатке кислорода в клетках (объяснить механизм)? Что такое разобщение окислительного фосфорилирования? Какими свойствами должен обладать разобщитель? Как изменяется поглощение кислорода при действии разобщителей (пояснить механизм)? Сравните механизмы окислительного и субстратного фосфорилирования. Какой из них преобладает в митохондриях?

9. Гипоэнергетические состояния. Ингибиторы переноса электронов по дыхательной цепи. В каком состоянии (окисленном или восстановленном) будут находиться переносчики электронов при блокаде цепи: а) производными барбитуровой кислоты; б) малоновой кислотой; в) цианидами, угарным газом; г) ротеноном; д) антимицином А?

10. Переваривание углеводов. Что понимают под врожденной непереносимостью дисахаридов? Причины нарушения переваривания лактозы. Лактулоза и обоснование её использования в питании. Роль пищевых волокон (клетчатка, пектин) в питании человека. Механизмы всасывания углеводов в кишечнике.

11. Механизм транспорта глюкозы в клетки. Напишите реакцию активирования поступившей в клетку глюкозы и укажите пути ее дальнейшего превращения.

12. Химизм реакций неокислительного и окислительного этапов анаэробного гликолиза. Биологическая роль гликолиза, назначение лактатдегидрогеназной реакции. Регуляция анаэробного распада глюкозы. Какой из ключевых ферментов гликолиза является ключевым и для других путей обмена глюкозы? Регуляторная роль 2,3-дифосфоглицерата. Энергетический выход гликолиза. Механизм синтеза АТФ в анаэробных условиях.

13. Химизм спиртового брожения (неокислительный этап, окислительный этап). Реакции, общие для спиртового брожения и гликолиза. Различия этих двух процессов. Ключевые ферменты спиртового брожения. Какие соединения могут регулировать этот процесс?

14. Обмен экзогенного этанола (схема), тканевая локализация процесса. Механизм развития алкогольной гипогликемии и лактацидемии.

15. Аэробное окисление глюкозы. Этапы и их субклеточная локализация, энергетический выход (расчет проводите поэтапно) и механизмы синтеза АТФ. Уровни регуляции, ключевые ферменты и их регуляторы. Сравните энергетический выход анаэробного и аэробного (поэтапно) окисления глюкозы и механизмы синтеза АТФ.

16. Судьба конечных продуктов гликолиза — пировиноградной и молочной кислот. Какова судьба лактата, образовавшегося в эритроцитах? Этапы и энергетический выход аэробного окисления лактата (расчет проводите поэтапно). Пути метаболизма пирувата. Какой путь утилизации пирувата стимулируется при энергодефиците в клетках?

17. Глюконеогенез. Биологическая роль, субклеточная локализация, субстраты, ключевые ферменты и регуляция процесса. Химизм ключевых реакций. Умейте рассчитать энергетический баланс синтеза моля глюкозы из ПВК и ЩУК.

18. Схема гликогенеза в гепатоцитах и миоцитах. Каковы запасы углеводов в мышцах, в печени и в целом организме? Рассчитайте энерготраты включения молекулы (моля) глюкозы в молекулу гликогена. Гормональная регуляция гликогенеза. Как проявляется у человека снижение активности гликогенсинтазы? Что такое агликогеноз?

19. Гликогенолиз, биологическая роль. Что такое фосфоролиз и гидролиз гликогена? Возможны ли реакции гидролиза гликогена в клетках? Схема фосфоролиза гликогена. Знайте различия этого процесса в печени и мышцах. Есть ли в этих различиях биологический смысл, а если есть, то какой? Изобразите схему гликогенолиза под влиянием глюкагона, тканевая локализация. Механизмы активирования гликогенфосфорилазы адреналином (схема). Пока-

жите на схеме, что выгоднее в энергетическом отношении: сразу окислять глюкозу или вначале присоединить ее к гликогену или это не имеет значения (расчет провести для анаэробных условий). Что называют гликогенозами? Причины болезни Гирке, болезни Помпе.

20. Пентозофосфатный путь распада глюкозы, этапы, биологическая роль.

21. Изобразите схематически образование УДФ-глюкозы. Какова биологическая роль процессов, использующих УДФ-глюкозу? Значение глюкуронового пути расщепления глюкозы в печени и фибробластах.

22. Превращение галактозы в глюкозу (схема). Каковы причины галактоземии? Синтез галактозы из глюкозы (схема). Напишите реакцию синтеза лактозы в клетках молочной железы.

23. Схема превращения фруктозы в глюкозу. Причины идиопатической фруктозурии и врождённой непереносимости фруктозы.

24. Методы определения содержания глюкозы в крови и ее физиологическая концентрация. Гормональная регуляция уровня глюкозы в крови.

Вопросы для подготовки к коллоквиуму для студентов МФИУ:

1. Метаболизм, катаболизм и анаболизм, их различия и связь между ними. Линейные и циклические метаболические пути, регуляторные (ключевые ферменты).

2. Пиридин-зависимые и flavin-зависимые дегидрогеназы. Блок-схемы коферментов НАД⁺, НАДФ⁺, ФАД, ФМН.

3. Адениловая система, ее компоненты, роль в клетке. Способы синтеза АТФ: субстратное, окислительное и фотосинтетическое фосфорилирование.

4. Окислительное декарбоксилирование пирувата как центральный метаболический путь. Пируват-дегидрогеназный комплекс (ферменты, коферменты, схема реакций).

5. Цикл трикарбоновых кислот как центральный метаболический путь. Клеточная локализация ЦТК, схема реакций, ферменты, коферменты. Функции ЦТК. Анаплеротические реакции.

6. Тканевое дыхание. Схема ферментов тканевого дыхания. Комплексы ферментов, коферменты, механизм функционирования. Схема дыхательной цепи, пункты фосфорилирования, механизм формирования электрохимического потенциала. Н⁺-АТФ-синтаза. Хемиосмотическая теория Митчелла. Коэффициент фосфорилирования (Р/О) для различных субстратов, поставляющих водород в дыхательную цепь. Регуляция работы дыхательной цепи и Н⁺-АТФ-синтазы.

7. Причины развития гипоэнергетических состояний. Разобщение окислительного фосфорилирования (механизм, разобщители). Ингибиторы переноса электронов и окислительного фосфорилирования.

8. Углеводы, классификация, основные представители.

9. Переваривание углеводов, продукты, нарушения переваривания. Роль клетчатки и пектинов в питании человека.

10. Всасывание продуктов переваривания углеводов, молекулярные механизмы. Судьба всосавшихся моносахаридов. Транспорт глюкозы в клетки.

11. Синтез гликогена, назначение, последовательность реакций, энергозатраты и регуляция. Агликогеноз.

12. Распад гликогена в печени и мышцах, последовательность реакций, регуляция. Гликогенозы.

13. Гликолиз, биологическая роль, субклеточная локализация, этапы (неокислительный, гликолитической оксидоредукции), реакции, ферменты, энергетический выход и механизм образования АТФ. Регуляция гликолиза, ключевые ферменты.

14. Пируват как центральный метаболит. Пути превращения ПВК в зависимости от энергетического статуса и особенностей окислительного метаболизма клеток.

15. Глюконеогенез, назначение, субстраты, ключевые реакции и ферменты, регуляция, энергозатраты.
16. Аэробное окисление глюкозы до СО₂ и Н₂О (этапы, энергетический выход, механизмы образования АТФ).
17. Пентозофосфатный путь, субклеточная локализация, этапы, ключевые ферменты, метаболиты, биологическая роль, регуляция.
18. Глюкуроновый путь (тканевая и субклеточная локализация, биологическая роль).
19. Регуляция содержания глюкозы в крови. Механизмы регуляторного действия гормонов (инсулин, адреналин, глюкагон, глюкокортикоиды и др.). Определение концентрации глюкозы в крови (глюкозооксидазный метод).

ОБМЕН ЛИПИДОВ

ЗАНЯТИЕ 13

ОБМЕН ЛИПИДОВ: ПЕРЕВАРИВАНИЕ, ВСАСЫВАНИЕ, РЕСИНТЕЗ. ТРАНСПОРТ ЭКЗОГЕННЫХ ЛИПИДОВ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ АКТИВНОСТИ ЛИПАЗ

Актуальность темы. Липиды — важная составная часть пищевых продуктов не только вследствие высокой энергетической ценности, но также и потому, что в натуральных пищевых жирах содержатся жирорастворимые витамины и «незаменимые» жирные кислоты (полиненасыщенные). Такие жирные кислоты в организме — предшественники эйказаноидов — липидных гормонов, играющих важную роль в развитии воспаления, аллергии, процесса свертывания крови.

Переваривание липидов в желудочно-кишечном тракте — сложный биохимический процесс. Для создания физиологических условий гидролиза липидов в кишечнике необходимо полноценное функционирование нескольких органов: печени, поджелудочной железы, тонкого кишечника. Дефект участия этих органов в усвоении пищевых липидов организмом приводит к нарушению обмена жиров и развитию патологических проявлений. Одно из таких проявлений — стеаторея (появление в фекалиях непереваренных жиров).

Поскольку липиды — гидрофобные соединения, их присутствие в кровотоке возможно только в виде специальных транспортных форм — липопротеинов. Хиломикроны (один из классов липопротеинов) служат для доставки липидов из кишечника в различные ткани и печень. Нарушения на уровне образования липопротеинов (или их утилизации) являются причинами развития различных форм гипо- и гиперлипопротеинемий. Наиболее распространенные заболевания, связанные с нарушениями обмена липидов, — сахарный диабет и атеросклероз.

Цель занятия: закрепить знания по химии липидов; усвоить молекулярные механизмы переваривания и всасывания липидов пищи, ресинтеза липидов, транспорта экзогенных липидов по кровеносному руслу для последующего анализа биохимических аспектов нарушений этих процессов.

Требования к исходному уровню знаний. Для полного усвоения темы необходимо повторить из:

- *общей химии:*
 - свойства поверхностно-активных веществ, мицеллообразование;
 - титрометрические методы анализа;
- *биоорганической химии:*
 - строение и свойства многоатомных спиртов (глицерол, инозитол), природных высших карбоновых кислот;
 - строение простых липидов (восков и нейтральных жиров);
 - особенности структуры и физико-химических свойств фосфолипидов и желчных кислот;
 - состав и свойства желчи, ее участие в процессах пищеварения. Механизмы регуляции желчеобразования и желчевыделения;
 - состав и свойства пищеварительных соков; переваривание жиров и всасывание продуктов гидролиза жиров.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ ИСХОДНОГО УРОВНЯ ЗНАНИЙ

Задание 1. Вспомните, что природные жирные кислоты бывают насыщенными и ненасыщенными. Полиеновые жирные кислоты являются незаменимыми факторами питания и делятся на 2 группы — ω -3 и ω -6 — в зависимости от положения двойной связи от углеродного атома последней (метильной) группы.

Подберите для каждой жирной кислоты соответствующее обозначение:

- | | |
|-----------------------|--------------|
| 1. Пальмитиновая. | A. 18:2 ω-6. |
| 2. Стеариновая. | Б. 18:3 ω-3. |
| 3. Олеиновая. | В. 20:5 ω-3. |
| 4. Линолевая. | Г. 20:4 ω-6. |
| 5. Линоленовая. | Д. 18:1 ω-9. |
| 6. Арахидоновая. | Е. 18:0. |
| 7. Эйкозапентаеновая. | Ж. 16:0. |

Задание 2. При добавлении к капле неэмульгированного жира солей желчных кислот образовалось 10^{12} мелких капель жира. Каким свойством желчных кислот можно объяснить их эмульгирующее действие?

- А. Амфи菲尔ностью.
- Б. Растворимостью только в воде.
- В. Растворимостью только в неполярных растворителях.
- Г. Нерастворимостью в воде.
- Д. Нерастворимостью в органических растворителях.

Задание 3. В растворе с помощью специфических реакций определены следующие продукты гидролиза: глицерол и жирные кислоты. Какое вещество было подвергнуто гидролизу?

- А. Холестерол.
- Б. Триацилглицерол.
- В. Фосфатидилхолин.
- Г. Холевая кислота.
- Д. Сфингозин.

Задание 4. Обратите внимание, что в составе глициеролипидов ненасыщенные жирные кислоты обычно располагаются во втором (β)-положении. Напишите формулу 1-пальмитоил-2-линолеоил-3-стеароилглицерола. Это соединение:

- А. Гидрофильное.
- Б. Гидрофобное.
- В. Амфи菲尔ное.

Правильность решений проверьте, сопоставив их с ответами.

Вопросы для обсуждения:

1. Общая характеристика и классификация липидов (омыляемые и неомыляемые, простые и сложные). Характеристика групп липидов (химические формулы и номенклатура ацилглицеролов и глицерофосфолипидов; блок-схемы строения восков, сфингофосфолипидов, гликолипидов, сульфолипидов). Биологическая роль липидов.

2. Липиды пищи. Переваривание липидов, этапы. Эмульгирование (назначение, факторы, стабилизация жировой эмульсии). Желчь, желчные кислоты (первичные, конъюгированные, вторичные). Место образования, участие в усвоении липидов пищи. Печеночно-кишечная рециркуляция желчных кислот.

3. Гидролиз липидов (схемы превращений). Ферменты (место образования, субстратная специфичность). Механизмы активации панкреатической липазы. Всасывание (механизмы, мицеллярное растворение, судьба мицелл). Представление о нарушениях переваривания и всасывания липидов.

4. Ресинтез триацилглицеролов и глицерофосфолипидов в энтероцитах. Транспортные формы липидов в крови. Строение и метаболизм хиломикронов.

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ

Основная

1. *Биологическая химия* / В. К. Кухта [и др.]. Москва : Бином, Минск : Асап, 2008. С. 193–210, 213–216.
2. *Березов, Т. Т. Биологическая химия* / Т. Т. Березов, Б. Ф. Коровкин. Москва : Медицина, 1990. С. 276–291, 305–309, 315–316.
3. *Биологическая химия* / А. Д. Таганович [и др.]. Минск : Выш. шк., 2013. С. 163–186.
4. Конспект лекций.

Дополнительная

1. Ленинджер, А. Основы биохимии / А. Ленинджер. Москва : Мир, 1985.
2. Биохимия человека / Р. Марри [и др.]. Москва : Мир, 1993. Т. 1. С. 151–164, 238–246, 256–268. Т. 2. С. 287–290, 295–296.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Задание 1. Вспомните классификацию липидов и напишите формулы триацилглицеролов и глицерофосфолипидов. Запомните, что важное свойство некоторых липидов — *амфи菲尔ность*, т. е. способность взаимодействовать как с гидрофобными, так и с гидрофильными молекулами. Обратите внимание на то, что липиды выполняют разные функции в зависимости от их строения и свойств. Сопоставьте перечисленные липиды с характерными для них функциями:

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. Холестерол. | A. Резерв энергии. |
| 2. Триацилглицеролы. | Б. Компоненты биомембран. |
| 3. Полиненасыщенные жирные кислоты. | В. Предшественник стероидных гормонов, витамина D ₃ , желчных кислот. |
| 4. Фосфолипиды. | Г. Субстраты для синтеза эйкозаноидов. |
| 5. Гликолипиды. | |

Задание 2. Запомните этапы переваривания и всасывания пищевых жиров (эмульгирование, гидролиз, образование мицелл и всасывание в слизистую кишечника). Умейте назвать факторы, способствующие эмульгированию жиров, и механизм стабилизации эмульсии под действием солей желчных кислот, исходя из структуры этих соединений.

2.1. Укажите, какая из перечисленных желчных кислот является наиболее сильным эмульгатором:

- | | |
|------------------------|--------------------|
| А. Холевая. | Г. Литохолевая. |
| Б. Хенодезоксихолевая. | Д. Дезоксихолевая. |
| В. Гликохолевая. | |

2.2. Подберите место образования для вышеперечисленных желчных кислот:
1) печень; 2) кишечник; 3) поджелудочная железа.

2.3. Изучите схему печеночно-кишечной рециркуляции желчных кислот и обратите внимание на то, что ежедневно с калом выделяется 0,5–1 г желчных кислот. Это единственный значимый путь выведения холестерола из организма.

Задание 3. Эмульгирование гидрофобных жиров — одно из условий эффективной работы панкреатической липазы. Напишите в общем виде реакции поэтапного гидролиза ТАГ под действием этого фермента с учетом того, что панкреатическая липаза с большей скоростью расщепляет в жирах сложно-эфирные связи в α-положении. Подчеркните основные конечные продукты переваривания жиров.


3.1. Выберите правильный вариант ответа: перед всасыванием в слизистую тонкого кишечника из желчных кислот, холестерола и амфи菲尔ных продуктов гидролиза жиров (жирных кислот и β-моноацилглицеролов) образуются:

- | |
|-------------------------|
| А. Смешанные мицеллы. |
| Б. Липосомы. |
| В. Секреторные гранулы. |
| Г. Триацилглицеролы. |

3.2. Запомните, что признаком нарушения переваривания и всасывания жиров является стеаторея. При этом кал больного содержит нерасщепленный жир и имеет серовато-белый цвет. Выполните следующее задание: из левого столбика таблицы выберите состояния, которые могут привести к стеаторею; из правого столбика выберите возможные последствия нарушения переваривания липидов:

- Снижение секреции или активности панкреатической липазы (панкреатит).
- Нарушение эмульгирования жиров вследствие недостаточного поступления желчи в просвет кишечника (желчнокаменная болезнь).
- Нарушение функции печени и уменьшение синтеза желчных кислот (гепатит).
- Дисбактериоз.

3.3. Переваривание фосфолипидов происходит под действием панкреатических фосфолипаз с образованием глицерола, высших жирных кислот, азотистых соединений и фосфорной кислоты. Рассмотрите рисунок. Запомните, какие связи специфически гидролизуют разные виды фосфолипаз:



Задание 4. Запомните, что в клетках слизистой оболочки кишечника (в энтероцитах) происходит ресинтез ТАГ и фосфолипидов из всосавшихся продуктов гидролиза. Выучите реакции ресинтеза липидов.

4.1. Верно ли высказывание: состав жирных кислот ресинтезированных липидов может существенно отличаться от пищевых жиров, потому что субстраты ресинтеза жиров — не только всосавшиеся жирные кислоты, но и жирные кислоты, синтезированные в слизистой кишечника.

4.2. Для транспорта гидрофобных продуктов ресинтеза (ТАГ и эфиры холестерола) из кишечника служат хиломикроны (один из классов липопротеинов). Ознакомьтесь с общим принципом строения липопротеиновых частиц и укажите компоненты, которые составляют в хиломикроне:

А. Внутреннюю часть:

Б. Наружную часть:

4.3. Выберите особенности, характеризующие транспорт экзогенных липидов:

А. Хиломикроны поступают непосредственно в кровоток.

Б. Хиломикроны поступают в лимфу.

В. После гидролиза ТАГ в составе хиломикронов липопротеинлипазой, располагающейся на эндотелии сосудов, жирные кислоты поступают в клетки различных тканей.

Г. Окончательное расщепление ремнантов хиломикронов на составные компоненты происходит в гепатоцитах.

4.4. Запомните: у людей с наследственным дефектом липопротеинлипазы в крови повышается концентрация ТАГ и хиломикронов. К внешним проявлениям гиперлипидемии относится ксантоматоз (отложение жировых бляшек в коже).

Правильность решений проверьте, сопоставив их с ответами.

- Повышение уровня ТАГ в крови.
- Нарушение всасывания жирорастворимых витаминов («куриная слепота», кровоточивость).
- Нарушение всасывания незаменимых полиненасыщенных жирных кислот.
- Ожирение.

ПРОВЕРЬТЕ ВАШИ ЗНАНИЯ (САМОКОНТРОЛЬ УСВОЕНИЯ ТЕМЫ)

Задание 1. Все перечисленные липиды относятся к глицерофосфолипидам, кроме:

- А. Дипальмитоилфосфатидилхолина. Г. Фосфатидилсерина.
Б. Фосфатидной кислоты. Д. Фосфатидилинозитола.
В. Сфингомиелина.

Задание 2. Пищевые жиры в ЖКТ подвергаются ферментативному гидролизу. В каком отделе ЖКТ происходит расщепление жиров у взрослых людей?

- А. Ротовой полости. Г. Тонком кишечнике.
Б. Толстом кишечнике. Д. Пищеводе.
В. Желудке.

Задание 3. Больному с хроническим панкреатитом в курсе комплексной терапии рекомендован препарат желчи. Какие компоненты желчи участвуют в переваривании жиров?

- А. Высшие жирные насыщенные кислоты.
Б. Холестерол и его эфиры.
В. Соли желчных кислот.
Г. Панкреатическая липаза.
Д. Диацилглицеролы.
Е. Панкреатическая а-амилаза.

Задание 4. Сыворотка крови больного, взятой утром наутро, имеет молочный вид. При анализе обнаружено высокое содержание ТАГ и хиломикронов. Наследственный дефект какого фермента приводит к хиломикронемии?

- А. Тканевой гормон-чувствительной липазы.
Б. Холестеролэстеразы.
В. Липопротеинлипазы.
Г. Панкреатической липазы.
Д. Фосфолипазы.

Задание 5. Какой из перечисленных ферментов высвобождает арахидоновую кислоту из мембранных фосфолипидов?

- А. Фосфолипаза А₁. В. Панкреатическая липаза.
Б. Фосфолипаза А₂. Г. Гормон-чувствительная липаза.

Ответы к решению заданий

Для самопроверки исходного уровня знаний:

1 (1 – Ж; 2 – Е; 3 – Д; 4 – А; 5 – Б; 6 – Г; 7 – В). 2 — А. 3 — Б. 4 — Б.

Для самостоятельной работы:

1 (1 – Б, В; 2 – А; 3 – Г; 4 – Б; 5 – Б).

2.1 — В; 2.2. А – 1; Б – 1; В – 1; Г – 2; Д – 2.

3.1 — А; 3.2. — 1, 2, 3; Б, В.

4.1 — верно; 4.2. А — ТАГ, эфиры холестерола; Б — фосфолипиды, холестерол, апопротеины (апо-B48); 4.3 — Б, В, Г.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА (60 минут)

Работа 1. Кинетика действия панкреатической липазы

Принцип метода. Скорость действия липазы в отдельных порциях молока определяется по количеству жирных кислот, образующихся при гидролизе жира молока за определенный промежуток времени. Количество жирных кислот определяют титрованием щелочью.

Ход работы. В две пробирки наливают по 10 мл молока. В 1-ю пробирку приливают 1 мл воды, а во 2-ю — 1 мл желчи. Затем в каждую пробирку добавляют по 1 мл 10 % раствора панкреатина (сока поджелудочной железы, который содержит липазу). Жидкость в про-

бирках быстро перемешивают. Из каждой пробирки отбирают по 1 мл смеси в колбы, добавляют 1–2 капли 0,5 % раствора фенолфталеина и титруют 0,05 н раствором NaOH до слаборозовой окраски, не исчезающей в течение 30 секунд. Полученное значение титрования — это «время реакции «0». Обе пробирки помещают в термостат при 38 °C. Через каждые 10 минут из пробирок отбирают по 1 мл смеси и титруют 0,05 н раствором NaOH в присутствии фенолфталеина до слаборозовой окраски. Проводят 5 таких определений.

При построении графиков из каждого полученного значения вычитают величину, полученную при первом титровании («время реакции «0»). В этом случае кривые пройдут через начало координат, так как вычитается результат титрования исходного количества жирных кислот, присутствовавших в молоке. На основании полученных данных строят две кинетические кривые, отражающие процесс гидролиза жира под действием фермента липазы в зависимости от наличия или отсутствия желчи.

Результаты:

№ пробирки	Результат титрования	Время инкубации					
		0 мин	10 мин	20 мин	30 мин	40 мин	50 мин
1. (с водой)	Объем NaOH, мл						
2. (с желчью)	Объем NaOH, мл						



Вывод:

Работа 2. Действие фосфолипаз поджелудочной железы

Принцип метода. О действии фосфолипаз поджелудочной железы на глицерофосфолипиды яичного желтка можно судить по появлению свободной фосфорной кислоты, способной образовывать желтый осадок при нагревании с молибдатом аммония.

Ход работы. В две пробирки наливают по 5 капель суспензии яичного желтка. В 1-ю пробирку добавляют 2 капли панкреатина, а во 2-ю (контрольную) — 2 капли воды. Обе пробирки помещают в термостат при 38 °C на 30 мин. После инкубации в обе пробирки наливают по 5 капель молибденового реактива, нагревают их на пламени спиртовки и охлаждают водопроводной водой.

Результат:

Вывод:

Подпись преподавателя:

ЗАНЯТИЕ 14

ТРАНСПОРТ ЛИПИДОВ КРОВЬЮ. ОБМЕН ХОЛЕСТЕРОЛА. ДЕПОНИРОВАНИЕ И МОБИЛИЗАЦИЯ ЛИПИДОВ. КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ β -ЛИПОПРОТЕИНОВ

Актуальность темы. Процессы депонирования и мобилизации липидов из жировых депо взаимосвязаны и подвержены четкой гормональной регуляции.

Холестерол — важный элемент мембранный структуры, предшественник стероидных гормонов, витамина Д, желчных кислот. Холестерол присутствует в пищевых жирах и может синтезироваться многими тканями. Механизм его синтеза находится под строгим метаболическим контролем. Холестерол экскретируется с желчью либо в неизменном виде, либо в виде продуктов его метаболизма — желчных кислот. С нарушением обмена липидов и холестерола связаны такие заболевания, как ожирение, атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, желчнокаменная болезнь. Потому понимание вопросов синтеза, распада, транспорта и регуляции обмена липидов и холестерола необходимо при изучении этих заболеваний.

Липопротeinовый спектр плазмы крови — основной показатель липидного обмена в организме, и изменение соотношения липопротеинов свидетельствует о нарушении метаболизма липидов.

Цель занятия: изучить процессы синтеза и распада липидов в организме; сформировать представление о механизме синтеза холестерола в клетках; приобрести навыки количественного определения β -липопротеинов в крови.

Требования к исходному уровню знаний. Для полного усвоения темы необходимо повторить из:

- биоорганической химии:

— холестерол: вторичный спирт — производное циклопентанпергидрофенантрена, строение, свойства.

- биологической химии:

— гликолиз и пентозофосфатный путь окисления глюкозы, окислительное фосфорилирование.

ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ ИСХОДНОГО УРОВНЯ ЗНАНИЙ

Задание 1. Исследуемое вещество подвергли гидролизу и с помощью качественных реакций определили в гидролизате жирные кислоты и миристиновый спирт. Какое вещество исследовалось?

А. Холевая кислота. Б. Триацилглицерол. В. Фосфатидилхолин. Г. Воск.

Правильность решения проверьте, сопоставив его с ответами.

Вопросы для обсуждения:

1. Синтез ТАГ и глицерофосфолипидов в печени и жировой ткани (химизм, общие этапы синтеза, различия). Транспортные формы липидов в крови. Строение и метаболизм ЛПОНП, ЛПГП, ЛПНП, ЛПВП. Классификация дислипопротеинемий по Фредриксону.

2. Холестерол, биологическая роль, пищевые источники. Выведение холестерола из организма, желчные кислоты как основной конечный продукт обмена холестерола. Представление о желчнокаменной болезни. Биосинтез холестерола (тканевая и субклеточная локализация, субстраты, этапы, химизм I этапа, регуляция).

3. Механизмы поддержания баланса холестерола в клетках. Транспорт холестерола (ЭХ) во внепеченочные клетки, роль апоВ₁₀₀. Роль ЛПВП и ЛХАТ в разгрузке клеток от избытка холестерола. Метаболизм эфиров холестерола, роль АХАТ, холестеролэстеразы.

4. Гиперхолестерolemия и ее причины. Биохимия атеросклероза, гиперхолестерolemия как фактор риска, другие факторы риска. Механизм атерогенного действия аполипопротеина

(а). Основы профилактики и диагностики гиперхолестерolemий, атеросклероза (индекс атерогенности).

5. Мобилизация липидов из жировой ткани (схема, Ca^{2+} и цАМФ-зависимые механизмы активации гормон-чувствительной липазы, гормональная регуляция). Роль депонирования и мобилизации жиров.

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ

Основная

1. *Биологическая химия* / В. К. Кухта [и др.]. Москва : Бином, Минск : Асар, 2008. С. 210–231, 254–258.

2. *Биологическая химия* / А.Д. Таганович [и др.]. Минск : Выш. шк., 2013. С. 186–199, 210–212, 214–217.

3. Конспект лекций.

Дополнительная

1. *Маршалл, В. Дж. Клиническая биохимия* / В. Дж. Маршалл. Москва : БИНОМ, Санкт-Петербург : Невский Диалект, 1999. 368 с.

2. *Биохимия человека* / Р. Мари [и др.]. Москва : Мир, 1993. 384 с.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Задание 1. Холестерол — структурный компонент биомембран всех тканей организма. Для синтеза различных биологически активных веществ в организме используется свободный холестерол, тогда как этерифицированная форма — резерв холестерола в клетке.

1.1. Из организма человека ежедневно выводится около 1 г холестерола. Укажите наиболее значимые пути выделения холестерола:

- А. В составе хиломикронов. Г. В виде стероидных гормонов.
Б. В виде солей желчных кислот. Д. Расщепляется до ацетил-КоА.
В. Выделение с фекалиями.

1.2. Назовите источники и пути использования холестерола в организме.

Задание 2. Выучите последовательность реакций синтеза холестерола из ацетил-КоА до образования мевалоната, обратите внимание на ферменты.

2.1. Ответьте на вопрос: можно ли снижением потребления холестерола с пищей до 100 мг/ сут вызвать снижение концентрации холестерола в крови?

Задание 3. Выучите строение и роль различных липопротеинов в транспорте холестерола в организме, участие ЛПНП и ЛПВП в переносе холестерола из кровотока в ткани и избытка холестерола из тканей в печень.

- 3.1. Выберите, в какой форме пищевой холестерол поступает в кровоток:
А. ЛПНП. В. ЛПОНП.
Б. ЛПВП. Г. Хиломикроны.

Задание 4. При интенсивной физической работе активируется мобилизация нейтральных жиров из депо.

4.1. Какой фермент осуществляет внутриклеточный липолиз?

- А. Пепсин.
Б. Гормон-чувствительная липаза.
В. Липопротеинлипаза.
Г. Эндопептидаза.
Д. Фосфолипаза.

4.2. Каким гормоном активируется этот фермент?

- А. Инсулином. В. Кальцитонином.
Б. Глюкагоном. Г. Окситоцином.

Правильность решений проверьте, сопоставив их с ответами.

ПРОВЕРЬТЕ ВАШИ ЗНАНИЯ (САМОКОНТРОЛЬ УСВОЕНИЯ ТЕМЫ)

Задание 1. У больного после курса лечения атеросклероза и строгого соблюдения диетологических рекомендаций в плазме крови лабораторно подтверждено повышение уровня антиатерогенных липопротеинов. Какие липопротеины являются антиатерогенными?

- А. ЛПОНП. Б. ЛПНП. В. ЛПВП. Г. Хиломикроны.

Задание 2. У людей, в рационе которых преобладает растительная пища и рыба, значительно снижен риск заболевания атеросклерозом. Какие вещества, входящие в состав этих продуктов, могут оказывать антиатерогенное действие? Их роль в обмене холестерола?

Задание 3. Пациент, которому с лечебной целью назначено голодание, в течение двух недель значительно похудел. Каким гормоном регулируется скорость мобилизации жиров при изменении режима питания?

- | | |
|-----------------|-------------------|
| А. Глюкагоном. | Г. Кальцитонином. |
| Б. Окситоцином. | Д. Паратирином. |
| В. Адреналином. | |

Задание 4. При обследовании подростка, страдающего ксантоматозом, выявлена семейная гиперхолестерolemия. Концентрация каких липопротеинов резко повышена в крови при данной патологии?

- А. Хиломикроны. Б. ЛПНП. В. ЛПОНП. Г. ЛПВП.

Задание 5. Для ситуации, когда происходит депонирование липидов, характерно:

- А. Повышение секреции инсулина.
- Б. Увеличение в крови концентрации свободных жирных кислот.
- В. Увеличение в крови концентрации ЛПОНП и хиломикронов.
- Г. Повышенная активность гормон-чувствительной липазы.
- Д. Повышенная активность липопротеинлипазы.

Задание 6. Сравните особенности биосинтеза липидов (триацилглицеролов) в различных тканях. Заполните таблицу:

Ткань	Исходные субстраты синтеза	Форма транспорта липидов из органа
Слизистая оболочка тонкой кишки		
Печень		
Жировая ткань		

Задание 7. Какие положения правильны для ситуации, когда происходит мобилизация липидов?

- А. Концентрация жирных кислот в крови выше нормы.
- Б. Концентрация ЛПОНП выше нормы.
- В. Гормон-чувствительная липаза находится в фосфорилированной форме.
- Г. Липопротеинлипаза находится в фосфорилированной форме.
- Д. Активность липопротеинлипазы снижена.

Задание 8. Сравните биосинтез триацилглицеролов в печени и жировой ткани:

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. Биосинтез жиров в печени. | А. Свободный глицерол используется для синтеза жиров. |
| 2. Биосинтез жиров в жировой ткани. | Б. В процессе биосинтеза образуется фосфатидная кислота. |
| 3. Оба процесса. | В. Стимулируется при низкой концентрации глюкозы в крови. |
| 4. Ни один. | Г. Синтезируемый жир образует вакуоли, заполняющие цитоплазму. |

Ответы к решению заданий

Для самопроверки исходного уровня знаний:

1 — Г.

Для самостоятельной работы:

1.1 — Б, В. 2.1 — да. 3.1 — Г. 4.1 — Б; 4.2 — Б.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА (60 минут)

Определение содержания β -липопротеинов (липопротеинов низкой плотности) в плазме крови.

Большинство липидов находятся в крови не в свободном состоянии, а в составе белко-во-липидных комплексов (липопротеинов). Фракции липопротеинов отличаются по относительной молекулярной массе, количеству белка, процентному содержанию отдельных липидных компонентов. Липопротеины можно разделить различными методами: электрофореза, тонкослойной хроматографии, ультрацентрифугирования в солевых растворах различной плотности. При электрофоретическом разделении липопротеинов плазмы крови (на хроматографической бумаге, ацетатцеллюзозе, агаре, в полиакриламидном геле) получают фракции хиломикронов и липопротеинов различной плотности: α -липопротеины (ЛПВП) имеют подвижность α -глобулинов, β -липопротеины (ЛПНП) обладают подвижностью β -глобулинов. Пре- β -липопротеины (ЛПОНП) на электрофорограмме располагаются от линии старта перед β -липопротеинами, поэтому у них такое название.

Определение содержания β -липопротеинов в плазме крови имеет значение для диагностики атеросклероза, острых и хронических заболеваний печени, ксантоматоза и других патологий.

Принцип метода. Фотометрический метод. В основу метода положена способность β -липопротеинов (ЛПНП) осаждаться в присутствии хлорида кальция и гепарина; при этом изменяется мутность раствора. По степени помутнения раствора и судят о концентрации β -липопротеинов в сыворотке крови.

Ход работы. В пробирку вносят 2 мл 0,025 М раствора CaCl_2 и 0,2 мл сыворотки крови, перемешивают. Определяют оптическую плотность раствора (E_1) против раствора CaCl_2 на колориметре в кюветах 5 мм при красном светофильтре (630 нм). В кювету добавляют 0,1 мл раствора гепарина, перемешивают и точно через 4 мин снова определяют оптическую плотность раствора (E_2) в тех же условиях.

Расчет. Вычисляют разность оптических плотностей и умножают ее на 10 — эмпирический коэффициент, предложенный Ледвиной, т. к. построение калибровочной кривой со-пряжено с рядом трудностей:

$$x \text{ (г/л)} = (E_2 - E_1) \cdot 10.$$

В норме содержание β -липопротеинов составляет 3–4,5 г/л. Содержание β -липопротеинов колеблется в зависимости от возраста и пола.

Результаты: $E_1 =$

$E_2 =$

Расчет:

Вывод:

Подпись преподавателя:

ЗАНЯТИЕ 15

ВНУТРИКЛЕТОЧНЫЙ ОБМЕН ЖИРНЫХ КИСЛОТ. КЕТОНОВЫЕ ТЕЛА. КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХОЛЕСТЕРОЛА В СЫВОРОТКЕ КРОВИ

Актуальность темы. Жирные кислоты — неотъемлемый составной компонент большинства липидов. Понимание механизмов синтеза и распада жирных кислот имеет большое практическое значение в деятельности врача. Многие болезни, врожденные и приобретенные, определяются нарушениями в соотношении процессов анаболизма и катаболизма жирных кислот. Нарушение соотношения незаменимых жирных кислот в питании может приводить к существенным изменениям в составе эйкозаноидов и, как следствие, к различной патологии.

Один из важных показателей липидного обмена — содержание кетоновых тел. Кетоновые тела содержатся в крови здорового человека в небольших количествах. Однако, при сахарном диабете, голодании концентрация кетоновых тел может повышаться в несколько раз, развивается кетонемия.

Цель занятия: изучить процессы окисления и синтеза жирных кислот; познакомиться с метаболизмом кетоновых тел; сформировать представление об эйкозаноидах и их функциях; приобрести навыки определения холестерола и кетоновых тел.

Требования к исходному уровню знаний. Для полного усвоения темы необходимо повторить из:

- *биоорганической химии:*
 - реакции альдольной конденсации, формирование и характеристика сложноэфирной связи, высшие жирные кислоты (строение, номенклатура, свойства); ПОЛ, продукты ПОЛ;
 - кетоновые тела и их свойства;
- *биологической химии:*
 - центральные пути метаболизма (окислительное декарбоксилирование пировиноградной кислоты, ЦТК);
 - пентозофосфатный путь;
 - дихотомический распад глюкозы;
 - окислительное фосфорилирование.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ ИСХОДНОГО УРОВНЯ ЗНАНИЙ

Задание 1. Определите количество моль АТФ, синтезируемое за счет полного окисления одного моля:

- | | |
|------------------------|------------|
| 1. Глюкозы. | A. 17. |
| 2. Ацетил-КоА. | Б. 18. |
| 3. Сукцинил-КоА. | В. 10. |
| 4. Фосфодиоксиацетона. | Г. 25. |
| | Д. 32(30). |

Задание 2. В исследуемой моче определили выраженную кислую реакцию за счет вещества, обладающего свойствами кетонов. Какое из перечисленных веществ может обусловить это изменение pH мочи?

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| А. Ацетон. | Г. Ацетоуксусная кислота. |
| Б. Янтарная кислота. | Д. Уксусная кислота. |
| В. Угольная кислота. | |

Задание 3. В моче больного с выраженной кислой реакцией определили содержание β -гидроксибутиратата. Из какого предшественника он может образоваться?

- | | |
|---------------------------|------------------------------------|
| А. Ацетон. | Г. Янтарная кислота. |
| Б. Ацетоуксусная кислота. | Д. γ -Оксимасляная кислота. |
| В. Масляная кислота. | |

Правильность решений проверьте, сопоставив их с ответами.

Вопросы для обсуждения:

1. β -Окисление как центральный путь катаболизма жирных кислот. Субклеточная локализация процесса, активация жирных кислот, транспорт в митохондрии. Химизм окисления, участие витаминов. Сопряжение с процессом окислительного фосфорилирования и энергетический выход. β -Окисление жирных кислот с нечетным количеством углеродных атомов, ненасыщенных жирных кислот. Особенности β -окисления в пероксисомах.
2. α -Окисление и ω -окисление как вторичные пути обмена жирных кислот. Субклеточная локализация, продукты, биологическая роль.
3. Биосинтез жирных кислот. Субклеточная локализация, субстраты, химизм, регуляция. Особенности строения ацилсигнатазы. Роль малик-фермента.
4. Синтез ненасыщенных жирных кислот. Субстраты, ферментные системы. Полиненасыщенные) жирные кислоты как незаменимые факторы питания. Представители, биологическая роль.
5. Метаболизм арахидоновой кислоты. Биосинтез эйкозаноидов (простагландины, простациклины, лейкотриены, тромбоксаны) и их биологическая роль.
6. Кетогенез: тканевая и субклеточная локализация, субстраты, химизм. Оксиметилглутариловый путь образования кетоновых тел. Молекулярные механизмы кетонемии при сахарном диабете, недостаточном углеводном питании, голодании. Утилизация кетоновых тел (взаимопревращения, активация, включение в метаболизм, энергетика окисления).
7. Ацетил-КоА как центральный метаболит. Пути его потребления в клетках. Взаимосвязь липидного и углеводного обмена. Пути превращения глицерола в клетках. Энергетический баланс окисления глицерола.

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ

Основная

1. *Биологическая химия* / В. К. Кухта [и др.]. Москва : Бином, Минск : Асап, 2008. С. 234–249, 258–260.
2. *Биологическая химия* / А. Д. Таганович [и др.]. Минск : Выш. шк., 2013. С. 200–210, 212–214.
3. Конспект лекций.

Дополнительная

1. *Биохимия человека* / Р. Марри [и др.]. Москва : Мир, 1993.
2. *Биохимия. Краткий курс с упражнениями и задачами* / под ред. Е. С. Северина, А. Я. Николаева. Москва : ГЭОТАР-МЕД, 2001. С. 186–189, 193–198, 205–210.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Задание 1. Рассчитайте энергетический выход β -окисления жирных кислот. Для этого нужно помнить, что:

- А. Число молей ацетил-КоА, образующихся в результате окисления жирных кислот с четным числом атомов углерода (n), можно рассчитать по формуле: $n/2$.
- Б. Каждый моль ацетил-КоА далее окисляется в ЦТК с образованием 10 моль АТФ.
- В. В каждом витке β -окисления происходят две реакции дегидрирования, в которых восстанавливаются одна молекула NAD^+ ($\text{NADH}\cdot\text{H}^+$) и одна молекула ФАД (FADH_2), поэтому каждый виток дает четыре АТФ при сопряжении с процессом окислительного фосфорилирования.
- Г. Число витков можно рассчитать по формуле: $n/2 - 1$, т. к. в последний виток β -окисления всегда вступает бутирил-КоА и при его расщеплении образуется два ацетил-КоА, а не один, как во всех предыдущих витках.
- Д. Суммарный выход АТФ для β -окисления жирных кислот с четным числом атомов углерода можно рассчитать по формуле:

$$[(n/2) \cdot 10 + (n/2 - 1) \cdot 4] - 2^*$$

* Две АТФ расходуются на активацию жирных кислот.

1.1. Рассчитайте количество АТФ, образующееся при окислении одной молекулы трипальмитоилглицерола.

Алгоритм решения:

1) Напишите реакцию гидролиза этого соединения.
2) Рассчитайте количество АТФ, образующееся при окислении каждой молекулы пальмитиновой кислоты до CO_2 и H_2O .

3) Напишите реакции катаболизма глицерола (глицерол \rightarrow фосфоглицерол \rightarrow диокси-ацетонфосфат \rightarrow глицеральдегидфосфат) до CO_2 и H_2O .
4) Рассчитайте количество АТФ, образующееся при окислении одной молекулы глицерола до CO_2 и H_2O .
5) Рассчитайте суммарный выход АТФ при полном окислении трипальмитоилглицерола.

1.2. При каком условии активируется β -окисление жирных кислот?

- А. При уменьшении синтеза малонил-КоА в цитозоле.
- Б. При увеличении концентрации НАДН·Н⁺ в митохондриях.
- В. При гипоксии.
- Г. При наличии большого количества глюкозы.

Задание 2.

2.1. Напишите реакции первого витка синтеза пальмитиновой кислоты:

2.2. Напишите суммарное уравнение синтеза пальмитиновой кислоты и посчитайте количество циклов, необходимых для ее синтеза:

2.3. Сколько молекул глюкозы нужно затратить, чтобы синтезировать 1 молекулу трипальмитоилглицерола? Какие пути метаболизма глюкозы поставляют субстраты для ли-погенеза?

2.4. Укажите, какие из приведенных ниже жирных кислот

- 1) Синтезируются в организме. А. 18:2 (9, 12).
- 2) Не синтезируются в организме Б. 18:1 (9).
и должны поступать с пищей. В. 18:3 (9, 12, 15).
Г. 18:0.
Д. 16:0.

2.5. При каких условиях будет увеличиваться синтез жирных кислот?

- А. При повышении концентрации глюкозы в крови после еды.
- Б. При снижении секреции инсулина.
- В. При увеличении секреции глюкагона.
- Г. При дефосфорилировании ацетил-КоА-карбоксилазы.
- Д. При избыточном поступлении жиров с пищей.

Задание 3.

3.1. Укажите, какие функции регулируют перечисленные ниже эйкозаноиды:

- | | |
|--------------------|--|
| 1. Лейкотриены. | A. Сокращение гладких мышц, липолиз, секреция, проницаемость, электролитный баланс, свертывание крови. |
| 2. Простагландины. | B. Хемотаксис, воспаление, аллергические реакции, сокращение гладкой мускулатуры бронхов и ЖКТ. |
| 3. Тромбоксаны. | B. Агрегация тромбоцитов, сужение сосудов и бронхов, регуляция уровня цАМФ в тромбоцитах. |

3.2. Известно, что аспирин необратимо ингибитирует циклооксигеназу.

А. Объясните, почему аспирин в малых дозах может применяться для предотвращения образования тромбов.

Б. У некоторых людей (с генетической предрасположенностью) принятие аспирина может вызвать приступ бронхиальной астмы — так называемую аспириновую астму. Помогут ли данному больному стероидные препараты?

Задание 4. Изучите пути образования кетоновых тел в печени и их метаболизм. Обратите внимание на то, что ацетоацетат и β -гидроксибутират образуются в норме в небольших количествах, а ацетон — лишь при значительном накоплении кетоновых тел (голодание, сахарный диабет).

4.1. Какие органы в норме используют ацетоацетат в качестве источника энергии?

А. Печень. Б. Сердце. В. Мозг. Г. Скелетная мускулатура.

4.2. Оцените энергетический эффект (в молях АТФ) окисления 1 моль ацетоацетата до CO_2 и H_2O . Расчет запишите:

Правильность решений проверьте, сопоставив их с ответами.

ПРОВЕРЬТЕ ВАШИ ЗНАНИЯ (САМОКОНТРОЛЬ УСВОЕНИЯ ТЕМЫ)

Задание 1. 1.1. Один цикл β -окисления включает четыре последовательные реакции. Выберите правильную последовательность:

- А. Окисление, дегидратация, окисление, расщепление.
- Б. Восстановление, дегидрирование, восстановление, расщепление.
- В. Дегидрирование, гидратация, дегидрирование, расщепление.
- Г. Гидрирование, дегидратация, гидрирование, расщепление.
- Д. Восстановление, гидратация, дегидрирование, расщепление.

1.2. Известно наследственное заболевание, при котором в скелетных мышцах снижена концентрация карнитина в результате дефекта ферментов, участвующих в его синтезе. Ответьте на вопросы:

А. Как скажется на способности выполнять длительную работу снижение концентрации карнитина?

Б. Под микроскопом в клетках таких мышц видны вакуоли жира. Объясните их происхождение.

Задание 2. 2.1. Охарактеризуйте виды окисления жирных кислот:

Вид окисления	Локализация	Виды окисляемых жирных кислот
ω-Окисление		
α-Окисление		
β-Окисление	1) 2)	

2.2. Назовите причину и проявления болезни Рефзума.

Задание 3. 3.1. Изучив метаболизм жирных кислот, заполните таблицу:

Процессы	β-Окисление	Биосинтез
Локализация процесса		
Исходный субстрат		
Переносчик субстрата через митохондриальную мембрану		
Коферменты окислительно-восстановительных реакций		
Источник присоединяемого фрагмента или отщепляемый фрагмент		
Регуляторные ферменты		
Регулирующие факторы		
Активаторы		
Ингибиторы		

Задание 4. У пациента обнаружено повышение содержания кетоновых тел в крови. При каких состояниях организма наблюдается кетонемия?

- А. При длительной мышечной работе.
- Б. При избытке углеводов в пище.
- В. При отсутствии жиров в пище.
- Г. При голодании.
- Д. При нарушении переваривания жиров.

Ответы к решению заданий

Для самопроверки исходного уровня знаний:

1 (1 – Д; 2 – В; 3 – Г; 4 – А). 2 – Г. 3 – Б.


Для самостоятельной работы:

- 1.1 – 336,5. 1.2 – А. 2.3 – 34 молекулы глюкозы.
- 2.4. 1 – Б, Г, Д; 2 – А, В; 2.5 – А, Г.
- 3.1. 1 – Б; 2 – А; 3 – В. 4.1 – Б, Г; 4.2 – 20 АТФ.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА (60 минут)

Работа 1. Определение концентрации холестерола в сыворотке крови ферментативным методом.

Принцип метода. Определение холестерола после его ферментативного гидролиза и окисления. Индикатором является хинонимин, образуемый из перекиси водорода и 4-аминофеназона в присутствии фенола и пероксидазы.



Образующийся продукт имеет розовую окраску. Интенсивность окраски прямо пропорциональна концентрации холестерола и измеряется фотометрически.

Холестерол определяют в сыворотке крови.

Схема постановки опыта:

Содержимое пробирок	Опытная проба, мл	Стандартная проба, мл
Сыворотка крови	0,02	—
Стандартный раствор холестерола	—	0,02
Рабочий раствор ферментов	2,0	2,0

Перемешивают и инкубируют реакционную смесь 5 мин при 37 °C или 10 мин при комнатной температуре

По окончании инкубации измеряют оптическую плотность опытной и стандартной проб на колориметре (длина волны 540 нм — зеленый светофильтр) в кюветах 5 мм против контроля. **Контрольная проба** содержит 2,0 мл рабочего раствора ферментов. Контрольную пробу можно готовить одну на группу.

Расчет: С холест. (ммоль/л) = $5,17 \times (\text{E пробы} / \text{E станд.})$

Норма холестерола в сыворотке крови — 3,9–6,2 ммоль/л.

Клинико-диагностическое значение. При нарушении липидного обмена холестерол может накапливаться в крови. Увеличение уровня холестерола в плазме крови (гиперхолестерolemия) наблюдается при атеросклерозе, сахарном диабете, механической желтухе, нефrite, нефрозе (особенно при липоидных нефрозах), гипотиреозе. Понижение холестерола в крови (гипохолестерolemия) наблюдается при анемиях, голодании, туберкулезе, гипертриеозе, раковой кахексии, паренхиматозной желтухе, поражении центральной нервной системы, лихорадочных состояниях, при введении инсулина.

Результат: Еоп. = Ест. =

Расчет:

Вывод:

Работа 2. Качественные реакции на ацетон и ацетоуксусную кислоту

2.1. Проба Легаля на ацетон. Ацетон в щелочной среде дает с нитропруссидом натрия оранжево-красное окрашивание. После подкисления ледяной уксусной кислотой образуется соединение вишневого цвета.

Ход работы. В пробирку вносят 1 каплю мочи, 1 каплю 10 % раствора NaOH и 1 каплю свежеприготовленного нитропруссида натрия. Появляется оранжево-красное окрашивание. Добавляют 3 капли ледяной уксусной кислоты, появляется вишнево-красное окрашивание.

Результат:

2.2. Реакция Герхардта на ацетоуксусную кислоту.

Ход работы. К 5 каплям мочи прибавляют по каплям 5 % раствор хлорного железа; при этом выпадает осадок фосфатов в форме FePO₄. При наличии ацетоуксусной кислоты дальнейшее прибавление хлорного железа приводит к появлению вишнево-красного окрашивания. При стоянии краска бледнеет вследствие самопроизвольного декарбоксилирования ацетоуксусной кислоты.

Клинико-диагностическое значение. Гиперкетонемия и кетонурия наблюдаются при сахарном диабете, голодании, гиперпродукции гормонов-антагонистов инсулина.

Результат:

Выводы:

Подпись преподавателя:

ЗАНЯТИЕ 16

КОЛЛОКВИУМ ПО ТЕМЕ «ОБМЕН ЛИПИДОВ»

Вопросы для подготовки к коллоквиуму:

1. Какие вещества относятся к липидам, простым липидам, неомыляемым и омыляемым липидам? Структура, физико-химические свойства и функции природных восков, ацилглицеролов, глицеро- и сфингофосфолипидов, гликолипидов, сульфолипидов. Умейте писать химические формулы ацилглицеролов, фосфатидной кислоты, фосфатидилинозита, лизолецитина, фосфатидилэтаноламина, фосфатидилсерина, фосфатидилхолина, пальмитиновой, стеариновой, олеиновой, линолевой, линоленовой и арахидоновой кислот, блок-схемы строения церамида, цереброзидов и ганглиозидов (GM_1), сфингомиэлина.

2. Этапы переваривания липидов в желудочно-кишечном тракте. Представители первичных, конъюгированных и вторичных желчных кислот. Место их образования, роль в переваривании липидов. Эмульгирующие свойства желчных кислот в просвете кишечника. Роль таурина и глицина. Печеночно-кишечная рециркуляция желчных кислот.

3. Умейте писать реакции β -окисления жирных кислот с четным и нечетным числом углеродных атомов, подсчитывать энергетический выход полного окисления отдельных жирных кислот и ацилглицеролов. Какие жирные кислоты подвергаются β -окислению в пероксисомах? Отличие β -окисления в митохондриях и пероксисомах.

4. В какой части клетки осуществляется α -гидроксилирование и ω -окисление жирных кислот? Метаболические последствия нарушения синтеза рецептора для фитанатгидроксилизы, нарушения в организме при болезни Рефзума.

5. Регуляторная взаимосвязь β -окисления жирных кислот в клетках и аэробного окисления глюкозы. Этапы превращения углеводов в депонируемые липиды (схема).

6. Ферментные системы, ответственные за образование ненасыщенных жирных кислот в клетке. Ненасыщенные жирные кислоты, относящиеся к группе незаменимых факторов питания. Схема синтеза арахидоновой кислоты и пути её использования.

7. Виды эйкозаноидов, закономерности их действия, функции в организме. Механизм действия противовоспалительных лекарственных препаратов нестериоидной природы.

8. Условия, при которых активируется биосинтез жирных кислот в клетках. Внутриклеточная локализация этого процесса и происхождение исходных субстратов. Реакции синтеза жирных кислот. Уметь рассчитывать затрату молекул глюкозы на синтез молекулы заданного триацилглицерола.

9. Схемы путей образования $NADFH\cdot H^+$ для кетоацилредуктазной и еноилредуктазной реакций биосинтеза жирных кислот в гепатоцитах и адипоцитах.

10. Сколько АТФ нужно затратить на синтез жирных кислот (кислоты по вашему усмотрению), чтобы обеспечить ими образование одной молекулы глюкоцерамида?

11. Схема ферментов тканевого дыхания. Комплексы дыхательной цепи. Указать на схеме участки с энергией, достаточной для образования АТФ. На основании какого измеряемого показателя можно определить количество энергии, выделяемой в реакции переноса электронов? Регуляция дыхательной цепи, роль АДФ, АТФ.

12. Схема ферментов тканевого дыхания для НАД⁺-зависимых и ФАД-зависимых субстратов. Умейте включать субстраты β -окисления жирных кислот (β -гидроксиацил-КоА, ацил-КоА) в дыхательную цепь. Знайте, чему равен коэффициент фосфорилирования (Р/О) для каждого из этих субстратов. На схеме обязательно указывать участки сопряжения транспорта электронов и фосфорилирования. Можно ли использовать для окисления субстратов в митохондриях НАДФ⁺? Роль НАДФН⁺ в клетке.

13. Что такое окислительное фосфорилирование (определение, субклеточная локализация)? Основные положения теории П. Митчелла, объясняющие механизм окислительного фосфорилирования. Что такое разобщение окислительного фосфорилирования? Какими свой-

ствами должен обладать разобщитель? Примеры разобщителей. Как изменяется процесс окислительного фосфорилирования при недостатке кислорода в клетках (объяснить механизм)?

14. Ингибиторы переноса электронов по дыхательной цепи. В каком состоянии (окисленном или восстановленном) будут находиться переносчики электронов при блокаде цепи: а) производными барбитуровой кислоты; б) малоновой кислотой; в) цианидами, угарным газом; г) ротеноном; д) антимицином А?

15. Реакции образования β -гидрокси- β -метилглутарил-КоА и мевалоновой кислоты. Пути использования этих соединений в клетке. Регуляция активности ГМГ-КоА редуктазы.

16. Синтез холестерола в клетках (схема). Регуляция этого процесса, направленная на защиту клетки от перегрузки холестеролом. Составляющие механизма поддержания баланса холестерола в клетках, роль апо A₁, апо D, апо B-100, ЛХАТ, клеточных рецепторов, остатков хиломикронов, ЛППП и ЛПВП.

17. Факторы, способствующие высокому уровню холестерола в составе ЛПВП, в составе ЛПНП. Вероятный механизм участия холестерола в развитии атеросклероза. Происхождение и роль пенистых клеток. Исходя из метаболизма холестерола в организме и его регуляции, уметь обосновать подходы к снижению его уровня в крови.

18. Возможные механизмы атерогенного действия липопротеина (а).

19. Что такое дислипопротеинемия? Причины и проявления гиперлипопротеинемий I–V типов (по классификации Фредриксона).

20. Предложить механизм развития последствий в результате снижения активности липопротеинлипазы в крови, печеночной липазы, апо C-2, недостаточности рецепторов для апо B-48/E.

21. Особенности синтеза триацилглицеролов в клетках жировой ткани, печени и ресинтеза в кишечнике (реакции этих процессов).

22. Метаболизм липопротеинов крови (ХМ, ЛПОНП, ЛППП, ЛПНП и ЛПВП).

23. Возможные причины повышения уровня свободных жирных кислот в крови. Роль аполипопротеинов, гормон-чувствительной липазы.

24. Месторасположение действия фосфолипаз A₁, A₂, С и D на структуру фосфолипидов. Реакции синтеза лецитина. Липотропные факторы, их роль в нарушении синтеза глицерофосфолипидов в печени. Механизм развития жирового перерождения печени.

25. Понятие «кетоновые тела», их химические формулы. Реакции синтеза кетоновых тел, локализация в клетке. Роль в организме. Уметь рассчитать количество молекул кетоновых тел, образующихся из одной молекулы заданной жирной кислоты.

26. Уметь писать реакции включения кетоновых тел в процесс энергопродукции, его органная и внутриклеточная локализация, энергетический выход.

27. Понятие «кетоз», вероятный механизм его происхождения при сахарном диабете, голодании.

Вопросы для подготовки к коллоквиуму для студентов МФИУ:

1. Липиды, общая характеристика и классификация. Характеристика групп липидов (химические формулы и номенклатура ацилглицеролов и глицерофосфолипидов; блок-схемы строения восков, сфингофосфолипидов, гликолипидов, сульфолипидов).

2. Переваривание липидов, этапы. Эмульгирование (назначение, факторы, стабилизация жировой эмульсии). Желчь, желчные кислоты (первичные, конъюгированные, вторичные). Место образования, участие в усвоении липидов пищи. Печеночно-кишечная рециркуляция желчных кислот. Гидролиз липидов пищи (ферменты, схемы превращений). Всасывание (механизмы, мицеллярное растворение, судьба мицелл).

3. Ресинтез триацилглицеролов и глицерофосфолипидов в энтероцитах.

4. Транспортные формы липидов в крови. Строение и метаболизм хиломикронов.

5. Синтез ТАГ и глицерофосфолипидов в печени и жировой ткани (роль липотропных факторов).
6. Структура и метаболизм ЛПОНП (липопротеинов очень низкой плотности), ЛПП (липопротеинов промежуточной плотности), ЛПНП (липопротеинов низкой плотности), ЛПВП (липопротеинов высокой плотности). Биохимия атеросклероза, индекс атерогенности.
7. Холестерол, биологическая роль, биосинтез холестерола (тканевая и субклеточная локализация, субстраты, этапы, химизм I этапа, регуляция).
8. Мобилизация липидов из жировой ткани. Гормон-чувствительная липаза.
9. β -Окисление жирных кислот. Субклеточная локализация процесса, активация жирных кислот, транспорт в митохондрии. Химизм окисления, сопряжение с процессом окислительного фосфорилирования и энергетический выход. β -Окисление жирных кислот с нечетным количеством углеродных атомов, ненасыщенных жирных кислот. Особенности β -окисления в пероксисомах.
10. Биосинтез жирных кислот. Субклеточная локализация, субстраты, химизм, регуляция. Особенности строения ацилсинтазы. Роль малик-фермента.
11. Полиненасыщенные жирные кислоты как незаменимые факторы питания. Представители, биологическая роль.
12. Метаболизм арахидоновой кислоты. Биосинтез эйкозаноидов (простагландины, простациклины, лейкотриены, тромбоксаны) и их биологическая роль.
13. Кетогенез: тканевая и субклеточная локализация, субстраты, химизм. Молекулярные механизмы кетонемии при сахарном диабете и голодании. Утилизация кетоновых тел (взаимопревращения, активация, включение в метаболизм, энергетика окисления).
14. Ацетил-КоА как центральный метаболит.
15. Гормональная регуляция обмена липидов.

ОБМЕН БЕЛКОВ

ЗАНЯТИЕ 17

ПЕРЕВАРИВАНИЕ И ВСАСЫВАНИЕ БЕЛКОВ. АНАЛИЗ ЖЕЛУДОЧНОГО СОКА

Актуальность темы. Основным поставщиком азота в организме являются аминокислоты. Аминокислоты образуются в процессе протеолиза белков. Распад белков в организме осуществляют протеазы. Существует протеолиз двух типов — тотальный (неограниченный), при котором белки распадаются до аминокислот, и ограниченный (частичный), при котором отщепляется несколько аминокислот. Ограниченный протеолиз имеет регуляторное значение (активация ферментов, гормонов белковой природы, система свертывания крови, система комплемента и другие процессы). Переваривание белков в желудочно-кишечном тракте — это расщепление их до аминокислот. От этого зависит полноценное снабжение организма азотом и незаменимыми факторами питания, к которым относятся незаменимые аминокислоты. Переваривание осуществляют соляная кислота и протеазы. Об обмене белков судят по азотистому балансу — разнице между поступлением азота в составе белков и выделению азота из организма.

Цель занятия: сформировать представление об общей концепции обмена азота в организме, о белке как главном пищевом источнике азота и аминокислот; получить представление о молекулярных основах переваривания белков в ЖКТ, особенностях действия различных протеаз и использовании их ингибиторов в клинической практике, всасывании аминокислот и транспорте их в клетки; научиться применять полученные знания для объяснения причин нарушения усвоения белков пищи; освоить методы клинического анализа желудочного сока.

Требования к исходному уровню знаний. Для полного усвоения темы необходимо повторить из:

- биохимии:
- строение аминокислот;
- структурная организация белковой молекулы;
- ферменты.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ ИСХОДНОГО УРОВНЯ ЗНАНИЙ

Задание 1. При исследовании желудочного сока методом гель-фильтрации выделили неактивную форму пепсина с молекулярной массой 42 кДа. После добавления к ферменту соляной кислоты молекулярная масса пепсина уменьшилась до 35 кДа и фермент стал активным. Какой вид регуляции характерен для данного фермента?

- А. Фосфорилирование молекулы фермента.
- Б. Аллостерическая регуляция.
- В. Присоединение или отщепление белков ингибиторов.
- Г. Частичный протеолиз молекулы фермента.
- Д. Регуляция по принципу обратной связи.

Задание 2. В клинику госпитализирован больной с дерматитом открытых участков кожи, диареей, деменцией. Выберите, какая из перечисленных реакций, протекающая с участием НАД⁺-зависимого фермента, нарушается при данном заболевании:

- А. Окисление молочной кислоты.
- Б. Взаимопревращение оптических изомеров.
- В. Гидролиз жиров.

Задание 3. Для рассасывания послеоперационных рубцов больному проведен курс электрофореза трипсина. Активация какого типа химических реакций лежит в основе энзимотерапии?

- А. Изомеризации.
- Б. Оксидоредукции.
- В. Синтеза.
- Г. Гидролиза.
- Д. Переноса функциональных групп.

Правильность решений проверьте, сопоставив их с ответами.

Вопросы для обсуждения:

1. Что такое азотистый баланс? Какие виды азотистого баланса имеют место в норме и при патологии?

2. Потребность в белках. Биологическая ценность белков.

3. Что такое протеолиз? Роль ограниченного протеолиза в организме.

4. Где происходит переваривание белков? Какие ферменты участвуют в этом процессе?

Общая характеристика протеаз. Их субстратная специфичность и место действия.

5. Роль желудочного сока в переваривании белков. Механизмы образования соляной кислоты в желудке.

6. Всасывание аминокислот, транспорт аминокислот в клетки.

7. Процессы гниения белков в кишечнике. Обезвреживание продуктов гниения и ксенообиотиков.

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ

Основная

1. *Биологическая химия* / В. К. Кухта [и др.]. Москва : Бином, Минск : Асар, 2008. С. 261–277.

2. *Биологическая химия* / А. Д. Таганович, [и др.]. Минск : Выш. шк., 2013. С. 218–225.

3. Конспект лекций.

Дополнительная

1. *Ленинджер, А. Основы биохимии* / А. Ленинджер. Москва : Мир, 1985. С. 747–750.

2. *Биохимия человека* / Р. Мари [и др.]. Москва : Мир, 1993. С. 286–298.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Задание 1.

1.1. Запомните основные этапы переваривания белков:

а) в желудке; б) в просвете тонкого кишечника; в) «пристеночное» переваривание.

1.2. Запомните ферменты, участвующие на каждом этапе переваривания белков, и знайте специфичность их действия, рН-оптимум, механизм активации.

1.3. Запомните: конечным результатом переваривания белков является образование аминокислот, легко проникающих в клетки слизистой посредством активного транспорта.

1.4. Научитесь объяснять причины появления в кровотоке фенола, индола, скатола, пурпуресцина, кадаверина после переваривания белковой пищи в желудочно-кишечном тракте.

1.5. Биологическое значение переваривания белков заключается в том, что благодаря этому процессу происходит:

А. Образование набора аминокислот, необходимых для синтеза собственных белков организма и биологически активных соединений.

Б. Отщепление небелковой части сложных белков (липо-, нуклеопротеинов), что облегчает расщепление белковой части молекулы.

В. Образование продуктов, лишенных антигенной специфичности.

Г. Образование продуктов, которые могут легко проникать в клетки слизистой оболочки кишечника.

Задание 2. Что является начальной причиной образования активных протеолитических ферментов из проферментов?

- А. Сближение аминокислот, входящих в активный центр.
- Б. Изменение вторичной структуры фермента.
- В. Образование новых связей в молекуле фермента.
- Г. Изменение первичной структуры.
- Д. Изменение третичной структуры.

Задание 3. Что предохраняет секреторные клетки от действия протеаз?

- А. Наличие слизи, содержащей гетерополисахариды.
- Б. Активация фермента только в полости (желудка, кишечника).
- В. Наличие гликопротеинов на наружной поверхности мембран.
- Г. Отсутствие субстратов.

Правильность решений проверьте, сопоставив их с ответами.

ПРОВЕРЬТЕ ВАШИ ЗНАНИЯ (САМОКОНТРОЛЬ УСВОЕНИЯ ТЕМЫ)

Задание 1. При острых панкреатитах происходит преждевременная активация проферментов в клетках панкреатической железы. В результате механического повреждения (сильное сдавливание, травмы) проферменты выходят из клеток и активизируются в самой железе, а не в полости тонкой кишки.

Ответьте на вопросы:

- А. Какие ферменты могут активироваться при острых панкреатитах?
- Б. Какие последствия может вызвать такая активация?
- В. Как можно уменьшить разрушительное действие панкреатических протеаз?

Г. Биохимическим тестом на острый панкреатит в клинической практике служит определение активности α -амилазы в крови больного. Объясните, почему увеличивается активность α -амилазы в крови при остром панкреатите.

Задание 2. При гипоацидном гастрите снижение кислотности желудочного сока вызывает торможение частичного протеолиза молекулы пепсиногена. Изменения какого уровня структурной организации фермента имеют решающее значение при его активации?

- А. Первичной структуры.
- Б. Вторичной структуры.
- В. Третичной структуры.
- Г. Четвертичной структуры.
- Д. Более высокого уровня.

Задание 3. Мужчина направлен в больницу с диагнозом острый панкреатит, при котором вследствие внутриклеточной активации панкреатических ферментов происходит разрушение тканей. Пациенту был назначен препарат контрикал — конкурентный ингибитор панкреатических ферментов. Выберите характерные особенности ингибиции:

- А. Ингибитор является структурным аналогом субстрата.
- Б. Степень ингибиции зависит от концентрации ингибитора.
- В. Структура ингибитора не похожа на структуру субстрата.
- Г. Степень ингибиции зависит от времени действия ингибитора.
- Д. Образование неактивного комплекса ингибитор-субстрат.

Ответы к решению заданий

Для самопроверки исходного уровня знаний:

1 — Г. 2 — А. 3 — Г.

Для самостоятельной работы:

1.5 — А, Б, В. Г. 2 — Г. 3 — А, Б, В.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА (60 минут)

Работа 1. Количественное определение кислотности желудочного сока

Принцип метода. Общую кислотность желудочного сока измеряют в миллилитрах 0,1 н раствора NaOH, затраченного на нейтрализацию 1000 мл желудочного сока в присутствии индикатора фенолфталеина (зона перехода pH 8,3–10,0; ниже 8,2 — бесцветный, выше 10 — красный). В норме общая кислотность для взрослого человека составляет 40–60 ммоль/л, у новорожденных — 2,8 ммоль/л, у детей от 1 месяца до 1 года — 4–20 ммоль/л.

Содержание свободной соляной кислоты в желудочном соке измеряют в миллилитрах 0,1 н раствора NaOH, затраченного на нейтрализацию 1000 мл желудочного сока в присутствии индикатора диметиламиноазобензола (зона перехода pH 2,9–4,0; ниже 2,9 — розово-красный; выше 4,0 — желтый). Свободная соляная кислота почти вся оттитровывается при pH 3,0; при этом окраска диметиламиноазобензола изменяется от розово-красной до оранжевой. Содержание свободной соляной кислоты в норме составляет 20–40 ммоль/л (у новорожденных — 0,5 ммоль/л).

Определение общей кислотности, свободной соляной кислоты и связанной соляной кислоты проводится в одной порции желудочного сока. Титрование проводят с двумя индикаторами: диметиламиноазобензолом и фенолфталеином.

Ход работы. Отмеривают пипеткой в колбочку 10 мл желудочного сока, добавляют 1 каплю диметиламиноазобензола и 2 капли фенолфталеина. При наличии в желудочном соке свободной соляной кислоты он окрашивается в красный цвет с розовым оттенком, при ее отсутствии сразу появляется оранжевая окраска.

Титруют 0,1 н NaOH из микробюретки до появления оранжевого окрашивания и результат записывают (1-я отметка, используется для расчета содержания *свободной HCl*). Не добавляя щелочи в бюретку, продолжают титрование до появления лимонно-желтого цвета и результат записывают (2-я отметка от 0). Разницу между 2-й и 1-й отметками используют для расчета содержания *связанной HCl*). Продолжают титрование до появления розового окрашивания (3-я отметка от 0, используется для расчета *общей кислотности*).

Расчет. Содержание свободной HCl (1-я отметка), связанной HCl (2-я отметка – 1-я отметка) и общую кислотность (3-я отметка) рассчитывают по формуле:

$$X \text{ (ммоль/л)} = A \times 1000 \times 0,1 / 10,$$

где А — количество 0,1 н раствора NaOH, мл; 10 — количество желудочного сока, взятого для титрования, мл; 0,1 — количество мг/экв. щелочи в 1 мл 0,1 н раствора, ммоль; 1000 — пересчет на 1 литр.

Результаты:

	Свободная HCl	Связанная HCl	Общая кислотность
Желудочный сок № 1	A ₁ = X (ммоль/л) =	A ₂ = A ₂ – A ₁ = X (ммоль/л) =	A ₃ = X (ммоль/л) =
Желудочный сок № 2	A ₁ = X (ммоль/л) =	A ₂ = A ₂ – A ₁ = X (ммоль/л) =	A ₃ = X (ммоль/л) =
Желудочный сок № 3	A ₁ = X (ммоль/л) =	A ₂ = A ₂ – A ₁ = X (ммоль/л) =	A ₃ = X (ммоль/л) =

Клинико-диагностическое значение. При заболеваниях желудка кислотность может быть нулевой, пониженной и повышенной. При язвенной болезни желудка или гиперацидном гастрите происходит увеличение содержания свободной соляной кислоты и общей кислотности (гиперхлоргидрия). При гипоацидном гастрите или раке желудка наблюдается уменьшение количества свободной соляной кислоты и общей кислотности (гипохлоргидрия).

При раке желудка, хроническом гастрите иногда отмечается полное отсутствие соляной кислоты (ахлоргидрия). При злокачественном малокровии, при раке желудка часто наблюдается полное отсутствие соляной кислоты и пепсина (ахилия).

Вывод:

Работа 2. Обнаружение молочной кислоты реакцией Уффельмана

Молочная кислота относится к патологическим составным частям желудочного сока и обнаруживается при ахлоргидрии вследствие усиления процессов брожения в желудке.

Принцип метода. При добавлении к реактиву Уффельмана, имеющему фиолетовую окраску, патологического желудочного сока появляется желто-зеленое окрашивание вследствие образования лактата железа (положительная реакция Уффельмана).

Ход работы. Готовят в пробирке реактив Уффельмана (20 капель 1 % раствора фенола и 2 капли 1 % раствора хлорного железа). Добавляют в пробирку 5 капель желудочного сока. При наличии молочной кислоты появляется желто-зеленая окраска.

Результат:

Вывод:

Работа 3. Количественное определение активности пепсина желудочного сока

Принцип метода. В основе метода лежит способность пепсина в желудочном соке створаживать белок молока — казеиноген. Створаживание молочно-ацетатной смеси при pH 4,9 и температуре 25 °C пепсином происходит строго параллельно его способности переваривать белки. За единицу активности пепсина принимают такое его количество, которое при указанных условиях створаживает 5 мл молочно-ацетатной смеси за 60 с (эта условная единица соответствует 0,010 мг кристаллического пепсина). Желудочный сок человека в норме содержит в 1 мл 40–60 ед. пепсина. Таким же методом можно определить активность уропепсина в моче. С мочой здорового человека за сутки обычно выделяется от 150 до 300 ед. (1,5–3 мг) уропепсина.

Ход работы. На дно пробирки с помощью микропипетки наливают 0,1 мл раствора пепсина, а в другую пробирку наливают 5 мл молочно-ацетатной смеси. Помещают обе пробирки в термостат на 10 мин. Быстро переливают молочно-ацетатную смесь в пробирку с пепсином, содержимое пробирки встряхивают. Момент прилиивания смеси отмечают по секундомеру. Пробирку со смесью встряхивают, наклоняют ее и наблюдают за появлением на ее стенках первых хлопьев казеина. Записывают время створаживания смеси в секундах.

Расчет. Для расчета активности пепсина в 1 мл желудочного сока делят 60 секунд на время створаживания смеси и таким путем находят количество единиц пепсина в 0,1 мл желудочного сока, а умножая на 10 — в 1 мл.

Клинико-диагностическое значение. При ахилии уропепсин в моче и пепсин в желудочном соке могут полностью отсутствовать, а при язвенной болезни желудка количество пепсина резко увеличено.

Результат: Тсек =

Расчет:

Вывод:

Подпись преподавателя:

ЗАНЯТИЕ 18

ВНУТРИКЛЕТОЧНЫЙ ОБМЕН АМИНОКИСЛОТ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ АКТИВНОСТИ АМИНОТРАНСФЕРАЗ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ

Актуальность темы. Поступившие в клетки аминокислоты образуют фонд аминокислот, который пополняется за счет распада пищевых и тканевых белков и аминокислот, образующихся из других веществ. Аминокислоты фонда клетки используются для синтеза белков и других соединений, а также подвергаются индивидуальным превращениям и общим реакциям обмена — дезаминированию, трансаминированию, декарбоксилированию и активации при биосинтезе белков. Реакции дезаминирования приводят к образованию аммиака. Важнейшую роль в обмене аминокислот играет глутаматдегидрогеназная реакция. В ходе реакций переаминирования происходит распад одних аминокислот и синтез новых аминокислот, обеспечивается взаимосвязь реакций углеводного и белкового обмена. При декарбоксилировании аминокислот образуются биогенные амины — триптиamin, серотонин, гистамин, ГАМК, играющие важную роль в организме.

Цель занятия: усвоить общие пути обмена аминокислот; получить представление о путях обмена безазотистого остатка аминокислот, о роли аминокислот в образовании важных биологически активных соединений; на примере определения активности аминотрансфераз в сыворотке крови показать значение использования индикаторных ферментов в диагностике, прогнозе течения и оценке эффективности лечения заболеваний.

Требования к исходному уровню знаний. Для полного усвоения темы необходимо повторить из:

- биохимию;
- строение аминокислот;
- структурная организация белковой молекулы;
- ферменты.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ ИСХОДНОГО УРОВНЯ ЗНАНИЙ

Задание 1. Данные врачебного осмотра пожилой женщины, проживающей в доме для престарелых, соответствовали периферической нейропатии. Лабораторные анализы подтвердили недостаточность тиамина. Активность каких процессов снижена при данном гиповитаминозе?

- А. Трансаминирование аминокислот.
- Б. Декарбоксилирование аминокислот.
- В. Окислительное декарбоксилирование α -кетокислот.
- Г. Окислительное дезаминирование аминокислот.

Задание 2. Вспомните классификацию ферментов. Ферменты каких классов участвуют в катализе реакций дезаминирования, переаминирования, декарбоксилирования аминокислот?

Правильность решений проверьте, сопоставив их с ответами.

Вопросы для обсуждения:

1. Аминокислотный фонд клетки, источники пополнения и пути использования.
2. Трансаминирование, аминотрансферазы, коферментная функция витамина В₆. Клинико-диагностическое значение определения активности аминотрансфераз сыворотки крови.
3. Пути дезаминирования аминокислот. Окислительное дезаминирование (ферменты, коферменты). Прямое окислительное дезаминирование глутаминовой кислоты (химизм), значение глутаматдегидрогеназной реакции. Непрямое дезаминирование.
4. Пути использования безазотистого остатка аминокислот. Гликогенные и кетогенные аминокислоты. Способы синтеза новых аминокислот.

5. Декарбоксилирование аминокислот, ферменты, кофермент. Биогенные амины (триптамин, серотонин, гистамин, γ -аминомасляная кислота), катехоламины (дофамин, норадреналин, адреналин). Реакции образования, биологическая роль, пути обезвреживания.

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ

Основная

1. *Биологическая химия* / В. К. Кухта [и др.]. Москва : Бином, Минск : Асап, 2008. С. 277–281, 286–287, 296–301.
2. *Биологическая химия* / А. Д. Таганович [и др.]. Минск : Выш. шк., 2013. С. 224–231.
3. Конспект лекций.

Дополнительная

1. *Ленинджен, А.* Основы биохимии / А. Ленинджен. Москва : Мир, 1985. С. 571–576.
2. *Биохимия человека* / Р. Мари [и др.]. Москва : Мир, 1993. С. 306–309.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Задание 1. У мужчины, в течение длительного времени злоупотреблявшего алкоголем, значительно повышен уровень аланинаминотрансферазы крови. Какие биохимические реакции катализирует данный фермент?

- А. Переаминирование.
- Б. Окислительное дезаминирование.
- В. Синтез глутамата.
- Г. Декарбоксилирование.
- Д. Трансметилирование.

Задание 2. У больного с инфекционным гепатитом установлено резкое увеличение активности глутаматдегидрогеназы в крови. Укажите витамин, который является коферментом данного энзима:

- А. Никотинамид.
- Б. Тиамин.
- В. Фолиевая кислота.
- Г. Пиридоксин.
- Д. Аскорбиновая кислота.

Задание 3. У больного после перенесенного инфаркта миокарда в течение 2-х суток значительно повышалась активность аспартатаминотрансферазы в крови. Укажите кофермент данного фермента:

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| А. НАД ⁺ . | Г. Пиридоксальфосфат. |
| Б. ФАД. | Д. Тиаминпирофосфат. |
| В. НАДФ ⁺ . | |

Задание 4. После приступа судорог педиатром был осмотрен грудной ребенок, получающий искусственную пищу. У ребенка обнаружен также дерматит. При лабораторном обследовании установлено снижение аланин- и аспартатаминотрансферазной активности в крови. Недостатком какого кофермента обусловлено снижение скорости трансаминирования аминокислот?

- | | |
|------------------------|------------------------|
| А. НАД ⁺ . | Г. Пиридоксальфосфата. |
| Б. НАДФ ⁺ . | Д. Тиаминпирофосфата. |
| В. ФАД. | |

Правильность решений проверьте, сопоставив их с ответами.

ПРОВЕРЬТЕ ВАШИ ЗНАНИЯ (САМОКОНТРОЛЬ УСВОЕНИЯ ТЕМЫ)

Задание 1. Центральная роль глутаминовой кислоты в промежуточном обмене аминокислот определяется тем, что глутаминовая кислота:

А. Участвует в трансаминировании как универсальный донор NH₂-группы.

Б. Легко образуется из α-кетоглутаровой кислоты — универсального акцептора амино-групп.

В. Дезаминируется НАД⁺-зависимой глутаматдегидрогеназой.

Г. Является заменимой аминокислотой.

Задание 2. При декарбоксилировании каких аминокислот или их производных образуются следующие биогенные амины?

А. Триптиamin. Г. ГАМК.

Б. Серотонин. Д. Дофамин.

В. Гистамин.

Ответы к решению заданий

Для самопроверки исходного уровня знаний:

1 — В.

Для самостоятельной работы:

1 — А, В. 2 — А. 3 — Г. 4 — Г.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА (60 минут)

Определение активности аланиновой аминотрансферазы (АлАТ).

Аминотрансферазы (трансаминазы) — ферменты, которые используют в качестве кофермента фосфорицилодоксаль и катализируют обратимый перенос аминогруппы с аминокислот на кетокислоты. Определение концентрации образующихся α-кетокислот лежит в основе методов определения активности трансаминаз.

Принцип метода. В результате переаминирования аланин превращается в пировиноградную кислоту. Добавление кислого 2,4-динитрофенилгидразина останавливает ферментативный процесс. Образовавшийся гидразон пировиноградной кислоты в щелочной среде дает коричнево-красное окрашивание, интенсивность которого пропорциональна количеству образовавшегося пищевого альдегида.


Активность аминотрансфераз выражают в микромолях пировиноградной кислоты, образованной за 1 час инкубации при температуре 37 °C в расчете на 1 мл сыворотки крови. В норме активность аминотрансфераз в крови невелика и составляет для АсАТ от 0,1 до 0,45 мкмоль/ч·мл, а для АлАТ — 0,1–0,68 мкмоль/ч·мл.

Ход работы. В пробирку вносят 0,5 мл субстратной смеси, затем добавляют 0,1 мл исследуемой сыворотки и инкубируют в термостате 30 мин при 37 °C. Затем приливают 0,5 мл раствора динитрофенилгидразина и пробы выдерживают 20 мин при комнатной температуре. После этого добавляют 5 мл 0,4 н NaOH, тщательно перемешивают и оставляют на 10 минут при комнатной температуре для развития окраски. Оптическую плотность измеряют на калориметре с зеленым светофильтром (530 нм) в кювете 10 мм против контрольной пробы на реактивы. Контрольная пробы содержит все ингредиенты опытной пробы за исключением сыворотки крови, вместо которой берут 0,1 мл дистиллированной воды.

Расчет производят по готовому калибровочному графику зависимости оптической плотности окрашенного раствора (E) от количества ПВК. Пересчет активности фермента в микромоли пировиноградной кислоты производят по следующей формуле:

$$\text{АлАТ (мкмоль/ч·мл)} = A \cdot 10 \cdot 2 / 88,$$

где A — количество пировиноградной кислоты в 0,1 мл сыворотки, найденное по калибровочному графику в мкг; 88 — масса 1 мкмоль пировиноградной кислоты в мкг; 2 — коэффициент перерасчета на 1 час инкубации; 10 — коэффициент перерасчета на 1 мл сыворотки.



Результат: $E =$

$A =$

Расчет:

Клинико-диагностическое значение. Аминотрансферазы относятся к индикаторным ферментам, и определение их активности широко применяется в диагностике заболеваний сердца и печени. При инфаркте миокарда через 4–6 часов наблюдается повышение уровня AcAT, максимальна ее активность через 24–36 часов. Активность обеих аминотрансфераз, в особенности АлАТ, повышается при инфекционном гепатите. Особенno важна диагностическая ценность определения АлАТ при безжелтушных формах болезни Боткина и в инкубационном периоде.

Вывод:

Подпись преподавателя:

ЗАНЯТИЕ 19

ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ АММИАКА. КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСТАТОЧНОГО АЗОТА КРОВИ И МОЧЕВИНЫ В МОЧЕ. НАРУШЕНИЯ АМИНОКИСЛОТНОГО ОБМЕНА

Актуальность темы. Образующийся в процессе метаболизма аммиак является токсичным соединением, в первую очередь для центральной нервной системы. Нарушение процессов его связывания и обезвреживания ведет к гипераммониемии, развитию коматозного состояния и смерти больного. Знание процессов обезвреживания аммиака необходимо для понимания механизма возникновения гипераммониемии, способов борьбы с нею, а также для своевременной диагностики и лечения врожденных нарушений орнитинового цикла реакций синтеза мочевины. Знакомство с наследственными нарушениями обмена аминокислот необходимо для своевременного выявления этих заболеваний и их лечения.

Важнейшим показателем азотистого обмена является остаточный азот крови. В клинической лабораторной практике определение остаточного азота и его фракций, а также мочевины в моче помогает оценить выделительную функцию почек, степень почечной и печенистой недостаточности.

Цель занятия: изучить процессы обезвреживания аммиака в организме и возможные механизмы развития гипераммониемии; Закрепить представление о молекулярных механизмах наследственных патологий обмена фенилаланина и тирозина, некоторых других нарушениях обмена белков и аминокислот; Приобрести навыки количественного определения остаточного азота крови и мочевины в моче и усвоить диагностическую ценность этих показателей.

Требования к исходному уровню знаний. Для полного усвоения темы необходимо повторить из:

- общей химии:
- аммиак и соли аммония;
- биоорганической химии:
- мочевина — конечный продукт азотистого обмена в организме человека; структура и свойства мочевины;
- формулы циклических аминокислот;
- биологической химии:
- ферменты классов трансфераз и оксидоредуктаз; структура коферментов оксидоредуктаз (NAD^+ , NADF^+ , ФМН, ФАД).

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ ИСХОДНОГО УРОВНЯ ЗНАНИЙ

Задание 1. Аммиак в клетке образуется в результате:

- А. Реакций дезаминирования аминокислот.
- Б. Реакций переаминирования.
- В. Реакций распада биогенных аминов.
- Г. Реакций декарбоксилирования аминокислот.
- Д. Непрямого дезаминирования.

Задание 2. Укажите ферменты, катализирующие в организме человека реакции окислительного дезаминирования аминокислот:

- А. Оксидаза D-аминокислот.
- Б. Оксидаза L-аминокислот.
- В. Моноаминооксидаза (МАО).
- Г. Глутаматдекарбоксилаза.
- Д. Глутаматдегидрогеназа.
- Е. Аланинаминотрансфераза.

Задание 3. Дополните схему реакции окислительного дезаминирования глутамата недостающими компонентами:



- А. Глутаматдекарбоксилаза.
Б. Глутаматдегидрогеназа.
В. Аспартатаминонтррансфераза.
Г. НАД⁺. Д. ФАД. Е. ФМН. Ж. Н₂О. З. NH₃. И. CO₂. К. NO₂.

Правильность решений проверьте, сопоставив их с ответами.

Вопросы для обсуждения:

1. Пути связывания аммиака в клетках (восстановительное аминирование α -кетоглутарата, синтез глутамина и аспарагина, образование карбамоилфосфата). Транспортные формы аммиака.
2. Образование солей аммония в почках (источник аммиака, роль глутаминазы и глутаматдегидрогеназы, значение активирования глутаминазы почек при ацидозе).
3. Роль клеток печени в обезвреживании аммиака. Орнитиновый цикл мочевинообразования (схема цикла, субстраты, ферменты, энергетическое обеспечение, связь с лимоннокислым циклом, регуляция). Судьба мочевины. Гипераммониемия, причины.
4. Остаточный азот крови (основные компоненты и их относительное содержание). Принцип определения и клинико-диагностическое значение.
5. Обмен фенилаланина и тирозина. Нарушения обмена при фенилкетонурии, тирозинемии, алkapтонурии, альбинизме.

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ

Основная

1. *Биологическая химия* / В. К. Кухта [и др.]. Москва : Бином, Минск : Acap, 2008. С. 281–286, 293–296.
2. *Биологическая химия* / А. Д. Таганович [и др.]. Минск : Выш. шк., 2013. С. 231–240.
3. Конспект лекций.

Дополнительная

1. *Лениндженер, А. Основы биохимии* / А. Лениндженер. Москва : Мир, 1985. С. 578–597.
2. *Мак-Мюррей, У. Обмен веществ у человека* / У. Мак-Мюррей. Москва : Мир, 1980. С. 280–300.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Для закрепления материала необходимо обратить особое внимание на химизм реакций локального обезвреживания аммиака в тканях; на последовательность реакций орнитинового цикла мочевинообразования; на связь орнитинового цикла с лимоннокислым циклом Кребса; на клинико-диагностическое значение определения остаточного азота крови и мочевины в моче.

Задание 1. Укажите ферменты, катализирующие следующие реакции:

- А. Образование амида глутаминовой кислоты.
Б. Восстановительное аминирование α -кетоглутарата.
В. Гидролиз амида глутаминовой кислоты.
Г. Образование амида аспарагиновой кислоты.
Д. Образование карбамоилфосфата.

Задание 2. Подберите соответствующие пары:

- | | |
|--|--|
| 1. Фермент орнитинкарбамоилтрансфераза | А. Участвует в синтезе аргининоянтарной кислоты. |
| 2. Фермент аргиназа. | Б. Участвует в синтезе цитруллина. |
| 3. Фермент аргининосукцинатсинтетаза. | В. Участвует в распаде аргининоянтарной кислоты. |
| 4. Фермент аргининосукцинатлиаза. | Г. Участвует в реакции гидролиза аргинина. |

Правильность решений проверьте, сопоставив их с ответами.

ПРОВЕРЬТЕ ВАШИ ЗНАНИЯ (САМОКОНТРОЛЬ УСВОЕНИЯ ТЕМЫ)

Задание 1. В клинику поступил больной с повторной рвотой, судорожными приступами, потерей сознания, вызванными отравлением аммиаком. Почему при высокой концентрации NH₃ в крови наступает потеря сознания и смерть? Выберите причину:

- А. Снижение концентрации глюкозы в крови.
- Б. Повышение содержания мочевины в крови.
- В. Повышение содержания ацетил-КоА в печени.
- Г. Снижение концентрации АТФ в клетках мозга.
- Д. Повышение содержания глюкозы в крови.

Задание 2. Подберите к каждой пронумерованной реакции обмена фенилаланина и тирозина соответствующий фермент:

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1. Фен → Тир. | A. Декарбоксилаза диоксифенилаланина. |
| 2. ДОФА → дофамин. | Б. Оксидаза гомогентизиновой кислоты. |
| 3. Гомогентизиновая кислота → фумарилацетат. | В. Фенилаланингидроксилаза. |
| 4. Фен → фенилпируват. | Г. Фенилаланинрансаминаза. |

Задание 3. Сколько молей АТФ требуется для синтеза 1 моля мочевины? Напишите реакции (схема), идущие с затратой АТФ, укажите ферменты.

Задание 4. Больная страдает наследственным заболеванием — алкаптонурией. Жалуется на сильные боли в суставах, по ходу позвоночника. Проявление артрита в данном случае может быть вызвано накоплением определенного метаболита. Назовите этот метаболит:

- | | |
|-----------------|----------------------------------|
| А. Фенилаланин. | Г. Гомогентизиновая кислота. |
| Б. Ацетоацетат. | Д. Фенилпировиноградная кислота. |
| В. Тирозин. | |

Задание 5. Оцените функциональное состояние печени и почек у больных С. и А. с учетом биохимических показателей крови и мочи:

5.1. У больного С. содержание мочевины в крови 1,8 ммоль/л. С мочой выводится 12 г мочевины в сутки. Потребление белка с пищей — достаточное.

5.2. Больной А. потребляет в сутки 105 г полноценного белка. Содержание мочевины в крови 14 ммоль/л, с мочой выводится 8,5 г мочевины в сутки.

Ответы к решению заданий

Для самопроверки исходного уровня знаний:

1 — А, В, Д. 2 — А, Б, Д.



Для самостоятельной работы:

1. А. Глутаминсинтетаза.
Б. Глутамат ДГ (НАДФН · H⁺).
В. Глутаминаза.
Г. Аспарагинсинтетаза.
Д. Карбамоилфосфатсинтетаза I
2. (1 — Б, 2 — Г, 3 — А, 4 — В).

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА (60 минут)

Работа 1. Определение содержания мочевины в моче.

С мочой здорового человека выделяется за сутки 20–35 г или 333–583 ммоль мочевины.

Принцип метода. Метод основан на способности мочевины, содержащей аминогруппы, образовывать с *n*-диметиламинобензальдегидом в кислой среде комплексное соединение, окрашенное в желтый цвет. Интенсивность окраски прямо пропорциональна концентрации мочевины в исследуемой моче и определяется фотометрически.

Ход работы

Важно: пипетки и пробирки должны быть обязательно сухими.

В три пробирки наливают по 0,2 мл соответственно мочи (опытная проба), стандартного раствора мочевины (25 мг/мл) и воды (контроль на реактивы), добавляют в каждую по 1,2 мл 2% раствора парадиметиламинобензальдегида и тщательно перемешивают. Через 15 мин опытную и стандартную пробы фотометрируют в сухих кюветах 3 мм с синим светофильтром (длина волны 400 нм) против контрольной пробы.

Расчет. Содержание мочевины в опытной пробе рассчитывают по стандартному раствору мочевины по формуле:

$$C_{\text{оп}} = C_{\text{ст}} \cdot E_{\text{оп}} / E_{\text{ст}},$$

где $C_{\text{оп}}$ — концентрация мочевины в моче в пробе мг/мл; $C_{\text{ст}}$ — концентрация мочевины в стандартной пробе, 25 мг/мл; $E_{\text{оп}}$ — оптическая плотность пробы; $E_{\text{ст}}$ — оптическая плотность стандартного раствора мочевины.

Полученную величину умножают на диурез (1200–1500 мл) и получают суточное содержание мочевины в моче. Коэффициент пересчета в единицы СИ (ммоль/сут) — 0,0167.

Результат: $E_{\text{оп}} =$

$E_{\text{ст}} =$

Расчет:

Клинико-диагностическое значение. Пониженное содержание мочевины в моче отмечается при нефrite, ацидозе, паренхиматозной желтухе, циррозе печени, уремии, повышенное — при голодании, злокачественной анемии, лихорадке, интенсивном распаде белков в организме, после приема салицилатов, при отравлении фосфором, высокобелковой диете.

Вывод:

Работа 2. Количественное определение остаточного азота.

Азотсодержащие небелковые вещества составляют фракцию остаточного азота крови (промежуточные или конечные продукты обмена простых и сложных белков). Это мочевина, мочевая кислота, креатин, креатинин, амиак, индикан, билирубин, полипептиды, аминокислоты и др. Азот этих веществ называют остаточным, поскольку он остается в фильтрате после осаждения белков плазмы крови.

Основной частью остаточного азота крови является азот мочевины — 50 %, затем следует азот аминокислот — 25 % и азот других азотсодержащих компонентов. В норме остаточный азот крови составляет 14,3–25,0 ммоль/л (20–40 мг%); у новорожденных — 42,84–71,40 ммоль/л (60–100 мг%); на 10–12-й день снижается до уровня, определяемого у взрослых.

Принцип метода. Остаточный азот крови определяют в безбелковом фильтрате после осаждения белков крови различными осадителями (трихлоруксусной кислотой или вольфраматом) с последующей минерализацией безбелкового фильтрата концентрированной серной

кислотой. Азот всех исследуемых фракций в виде аммиака связывается с серной кислотой, образуя сульфат аммония, который взаимодействует с реагентом Несслера (щелочной раствор комплексной соли ртути $K_2(HgI_4)$) с образованием соединения желто-оранжевого цвета. Интенсивность окрашивания пропорциональна концентрации аммиака, а, следовательно, и азота.

Ход работы. Готовят три обычные пробирки. В 1-ю наливают 1 мл готового минерализата и 9 мл воды (опытная проба), во 2-ю вносят 1 мл стандартного раствора сульфата аммония и 9 мл воды (стандартная проба), а в 3-ю наливают 10 мл воды (контроль). Затем во все пробирки вносят по 0,5 мл реагента Несслера. Фотометрируют опытную (минерализат) и стандартную пробы против контроля при синем светофильтре (длина волны 400 нм) в кювете 5 мм.

Расчет. Содержание остаточного азота в опытной пробе рассчитывают по формуле:

$$C_{\text{оп}} = (C_{\text{ст}} \cdot E_{\text{оп}} / E_{\text{ст}}) \cdot 71,4,$$

где $C_{\text{оп}}$ — концентрация остаточного азота в крови, ммоль/л; $C_{\text{ст}}$ — концентрация азота в стандартной пробе (0,1 мг в 1 мл); $E_{\text{оп}}$ — оптическая плотность опытной пробы (минерализат); $E_{\text{ст}}$ — оптическая плотность стандарта (сульфат аммония). 71,4 — коэффициент перевода в единицы СИ (ммоль/л).

Результат: $E_{\text{ст}} =$

$E_{\text{оп}} =$

Расчет:

Клинико-диагностическое значение. Определение остаточного азота и его фракций используется для диагностики нарушения выделительной функции почек и мочевинообразовательной функции печени. Повышение остаточного азота в крови называется **азотемией**. Азотемия может быть двух видов: *абсолютной* (накопление в крови компонентов остаточного азота) и *относительной* (дегидратация организма при рвоте или поносе).

Причины абсолютной азотемии могут быть две: ретенционная (почечная) и продукционная (внепочечная). *Ретенционная* азотемия вызывается задержкой азотистых шлаков при их нормальном образовании и наблюдается при нарушении выделительной способности почек, например при острых и хронических нефритах за счет повышения уровня мочевины в крови. При хронических нефритах стойкая азотемия указывает на развивающуюся недостаточность почек. *Продукционная* азотемия наблюдается при усиленном распаде белков и преобладании аминокислот, например, при злокачественных новообразованиях. Повышение остаточного азота отмечается при кахексии ракового происхождения, вызванной туберкулезом, диабетом и циррозом печени, при сердечной недостаточности, инфекционных заболеваниях (скарлатине, дифтерии). У недоношенных детей азотемия может быть связана с почечной недостаточностью и усиленным распадом тканевых белков.

Понижение содержания остаточного азота наблюдается при недостаточном питании и иногда при беременности.

Вывод:

Подпись преподавателя:

ОБМЕН НУКЛЕОПРОТЕИНОВ. МЕТОДЫ МОЛЕКУЛЯРНОЙ БИОЛОГИИ

ЗАНЯТИЕ 20

ХИМИЯ И ОБМЕН НУКЛЕОПРОТЕИНОВ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ МОЧЕВОЙ КИСЛОТЫ И ОБЩЕГО АЗОТА В МОЧЕ

Актуальность темы. У взрослого здорового человека наблюдается азотистое равновесие. Поступающий с пищей азот в организме не задерживается и выделяется, главным образом, почками в составе многих продуктов (мочевины, аминокислот, мочевой кислоты и др.). Для изучения состояния азотистого обмена в организме пользуются определением общего азота мочи. В диагностике ряда заболеваний применяют методы определения содержания в моче отдельных азотсодержащих соединений. Например, при врожденных нарушениях обмена аминокислот исследуют содержание отдельных аминокислот или продуктов их метаболизма. Количество мочевой кислоты в моче и крови зависит от поступления нуклеопротеинов с пищей и от интенсивности их клеточного метabolизма. Этот показатель — важный критерий в диагностике и контроле лечения подагры.

Знание механизмов распада и синтеза пуриновых и пиримидиновых нуклеотидов, регуляции этих процессов позволило разработать и применить лекарственные препараты, влияющие на процессы деления клеток (например, антифолаты в химиотерапии опухолей), и способствует пониманию механизмов действия препаратов, используемых в коррекции гипоэнергетических состояний организма (ИМФ (рибоксин), оротат калия и др.).

Цель занятия: получить представление о катаболизме нуклеопротеинов в тканях и желудочно-кишечном тракте, механизмах биосинтеза и распада нуклеотидов и регуляции этих процессов; познакомиться с примерами использования этих знаний в диагностике и лечении болезней; для закрепления теоретического материала провести лабораторную работу по количественному определению мочевой кислоты и общего азота в моче.

Требования к исходному уровню знаний. Для полного усвоения темы необходимо повторить из:

- *общей химии:*
- титрометрические методы анализа;
- *биологии:*
- строение генетического аппарата клетки;
- *биоорганической химии:*
- формулы и свойства гетероциклических соединений (пурины, пиримидины);
- химические свойства и формулы гипоксантина, ксантина, мочевой кислоты;
- свойства солей мочевой кислоты (уратов);
- формулы азотистых оснований, нуклеозидов, нуклеотидов.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ ИСХОДНОГО УРОВНЯ ЗНАНИЙ

Задание 1. Подберите соответствующие пары вопрос – ответ:

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Аденозин. | A. Пиримидиновый нуклеозид. |
| 2. Гуанин. | B. Азотистое основание пуринового ряда. |
| 3. Цитозин. | C. Пиримидиновый нуклеотид. |
| 4. Уридинтрифосфат. | D. Пуриновый нуклеозид. |
| 5. Тимидин. | E. Пуриновый нуклеотид. |
| 6. Гуанозиндифосфат. | |

Задание 2. Назовите нуклеотиды, структура которых схематически изображена ниже:

- 1) аденин – дезоксирибоза – фосфат – фосфат;
- 2) цитозин – рибоза – фосфат;
- 3) гуанин – дезоксирибоза – фосфат – фосфат – фосфат;
- 4) урацил – рибоза – фосфат – фосфат.

Задание 3. Подберите соответствующие пары вопрос – ответ:

- | | |
|--|--|
| 1. Первичная структура ДНК. | A. Модель «двойная спираль». |
| 2. Вторичная структура ДНК. | Б. 3',5'-Фосфодиэфирные связи. |
| 3. Для первичной структуры РНК характерны связи. | В. Последовательность нуклеотидов в полинуклеотидной цепи. |
| 4. Для вторичной структуры ДНК характерны связи. | Г. Водородные связи между азотистыми основаниями. |
| | Д. Силы гидрофобного взаимодействия между выше- и нижележащими азотистыми основаниями. |

Правильность решений проверьте, сопоставив их с ответами.

Вопросы для обсуждения:

1. Мононуклеотиды, строение, номенклатура, биологическая роль.
2. Первичная, вторичная и третичная структуры нуклеиновых кислот (особенности структуры, разновидности, типы стабилизирующих связей).
3. Обмен нуклеопротеинов. Переваривание нуклеопротеинов в желудочно-кишечном тракте (этапы, ферменты). Распад нуклеиновых кислот в тканях, роль лизосомных ферментов.
4. Распад пуриновых нуклеотидов (химизм, мочевая кислота как конечный продукт катаболизма). Представление о нарушениях пуринового обмена (гиперурикемия и подагра, почечно-каменная болезнь).
5. Биосинтез пуриновых нуклеотидов de novo. Источники азота и углерода пуринового кольца, участие фолиевой кислоты, основные промежуточные продукты, ключевой фермент, регуляция синтеза. Представление о синтезе нуклеотидов из свободных азотистых оснований и нуклеозидов.
6. Распад пиримидиновых нуклеотидов.
7. Биосинтез пиримидиновых нуклеотидов. Субстраты, схема процесса, ключевой фермент, регуляция синтеза, роль витаминов. Представление о нарушениях пиримидинового обмена (оротацидурия).
8. Синтез дезоксирибонуклеозидфосфатов, нуклеозиддифосфатов и нуклеозидтрифосфатов.
9. Общий азот мочи (количество, компоненты и их происхождение).

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ

1. *Биологическая химия* / В. К. Кухта [и др.]. Москва : Бином, Минск : Асап, 2008. С. 307–338.
2. *Биологическая химия* / А. Д. Таганович [и др.]. Минск : Выш. шк., 2013. С. 241–262.
3. Конспект лекций.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Задание 1. Выберите положения, правильно характеризующие свойства ксантиноксидазы:

- А. Ее коферментом является производное витамина PP.
- Б. Одним из продуктов реакции является перекись водорода.
- В. Фермент катализирует две последовательные необратимые реакции образования мочевой кислоты.

Г. Субстрат фермента — гипоксантин — имеет меньшую растворимость, чем мочевая кислота.

Д. Фермент обладает абсолютной специфичностью к субстрату.

Задание 2. При обследовании больного ревматизмом после интенсивной терапии кортикостероидами установлена гиперурикемия. В результате активации какого метаболического процесса развиваются данные нарушения?

А. Интенсивного распада белков.

Б. Активации глуконеогенеза.

В. Интенсивного распада пуриновых нуклеотидов.

Г. Мобилизации липидов.

Д. Интенсивного распада пиримидиновых нуклеотидов.

Задание 3. Дополните недостающими компонентами реакции синтеза пуриновых рибонуклеотидов:

1. ФРПФ + ? → 5-фосфорибозиламин.

А. ГЛН.

2. ИМФ + ГТФ + Асп → ?

Б. АМФ.

3. Рибозо-5-фосфат + АТФ → ? + АМФ.

В. Глу.

4. ИМФ + АТФ + ? → ГМФ.

Г. ФРПФ.

Д. АТФ.

Задание 4. Дополните недостающими компонентами реакции синтеза пиримидиновых нуклеотидов:

1. Карбамоилфосфат + ? → карбамоиласпартат.

А. ФРПФ.

2. Оротат + ? → ОМФ + Н₄P₂O₇.

Б. Асп.

3. ОМФ → CO₂ + ?

В. АТФ.

4. УМФ + ? → УДФ + ?

Г. АДФ.

5. УДФ + ? → УТФ + ?

Д. УМФ.

Правильность решений проверьте, сопоставив их с ответами.

ПРОВЕРЬТЕ ВАШИ ЗНАНИЯ (САМОКОНТРОЛЬ УСВОЕНИЯ ТЕМЫ)

Задание 1. При терапии некоторых форм рака применяются ингибиторы дигидрофолатредуктазы. Торможение каких реакций определяет цитостатическое действие препарата?

А. Синтез пиримидиновых нуклеотидов.

Б. Синтез пуринового ядра нуклеотидов.

В Синтез дезоксицитидиловых нуклеотидов.

Г. Синтез цитидиловых нуклеотидов.

Д. Синтез дУМФ.

Задание 2. У ребенка с синдромом Леша–Нихана — корковый паралич и гиперурикемия. Количество экскретируемых пуринов увеличено. Дефект какого фермента вызывает данную патологию?

А. Ксантиноксидазы.

Б. Аденозиндезаминазы.

В. Гипоксантин-гуанин-фосфорибозилтрансферазы.

Г. Карбамоилфосфатсинтетазы.

Д. Тимидилатсинтазы.

Задание 3. Женщине с лимфолейкозом назначен противоопухолевый препарат — ингибитор тиоредоксинредуктазы. На чем основано цитостатическое действие препарата?

А. Ингибируется синтез ИМФ.

Б. Ингибируется синтез оротовой кислоты.

В. Ингибитируется синтез ЦМФ.

Г. Ингибитируется синтез дГДФ.

Д. Ингибитируется синтез УМФ.

Ответы к решению заданий

Для самопроверки исходного уровня знаний:

1 (1 – Д, 2 – Б, 3 – Г, 4 – В, 5 – А, 6 – Е).

2 (1 — дезоксиаденозинтрифосфат; 2 — цитидинмонофосфат; 3 — дезоксигуанозинтрифосфат; 4 — уридиндифосфат).

3 (1 – В, 2 – А, 3 – Б, 4 – Г, Д).

Для самостоятельной работы:

1 — Б, В. 2 — В. 3 (1 – А; 2 – Б; 3 – Г; 4 – А). 4 (1 – Б; 2 – А; 3 – Д; 4 – В, Г; 5 – В, Г).

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА (60 минут)

Работа 1. Определение содержания общего азота мочи колориметрическим методом.

Исследование общего азота мочи может быть использовано для исследования состояния азотистого баланса. Количество общего азота, выделяемого за сутки с мочой, у взрослого человека составляет 6–17 г (428–1214 ммоль/сут).

Принцип метода. После сжигания (минерализации) органических веществ мочи с концентрированной серной кислотой азот всех исследуемых фракций в виде аммиака связывается с серной кислотой, образуя сульфат аммония. Колориметрическое определение общего азота основано на том, что сульфат аммония образует с реагентом Несслера соединение желто-оранжевого цвета, интенсивность которого прямо пропорциональна концентрации аммиака, а следовательно, и азота в моче.

Ход работы. Готовят три обычные сухие пробирки. В две из них отмеривают соответственно 0,5 мл минерализата (опыт) и 0,5 мл стандартного раствора сульфата аммония (стандарт, содержащий 0,2 мг азота в 1 мл). Прибавляют в каждую пробирку по 6,5 мл воды и тщательно перемешивают. В третью пробирку отмеривают 7 мл воды (контроль) и во все пробирки добавляют по 0,5 мл реагента Несслера. Содержимое пробирок тщательно перемешивают. **Необходимо строго соблюдать порядок приливания реагентов и тщательно перемешивать жидкость.** Фотометрируют опытную и стандартную пробы против контроля при синем светофильтре (длина волны 400 нм) в кювете 5 мм.

Расчет. Содержание азота в опытной пробе рассчитывают по стандартному раствору сульфата аммония по формуле:

$$C_{\text{оп}} = C_{\text{ст}} \cdot E_{\text{оп}} / E_{\text{ст}},$$

где $C_{\text{оп}}$ — концентрация азота мочи в исследуемой пробе, мг/мл; $C_{\text{ст}}$ — концентрация $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ в стандартной пробе (0,2 мг в 1 мл); $E_{\text{оп}}$ — оптическая плотность опытной пробы; $E_{\text{ст}}$ — оптическая плотность стандарта сульфата аммония.

Содержание общего азота в моче (г/сут) рассчитывают по формуле:

$$C_{\text{оп}} \cdot 100 \cdot \text{суточный диурез} / 0,5 \cdot 1000,$$

где $C_{\text{оп}}$ — концентрация азота, найденная по стандартному раствору; 100 — разведение мочи при приготовлении минерализата; 0,5 — количество минерализата, взятого для анализа; 1000 — коэффициент перевода миллиграммов в граммы.

Суточное выделение мочи составляет в среднем 1500 мл для мужчин и 1200 мл для женщин. Коэффициент пересчета в единицы СИ (ммоль/сут) равен 71,39.

Результат: $E_{\text{оп}} =$ $E_{\text{ст}} =$

Расчет:

Клинико-диагностическое значение. Определение общего азота мочи позволяет судить о белковом обмене в организме, о количестве распавшегося белка. Для этого полученную величину общего азота умножают на 6,25, исходя из того, что в белке в среднем содержится 16 % азота ($100 : 16 = 6,25$).

При заболевании почек, вследствие нарушения их выделительной функции содержание общего азота в моче уменьшается. Задержка азота в организме наблюдается при заболеваниях печени и сердечно-сосудистой системы в связи с возникновением отеков, при наличии экссудатов и транссудатов.

Увеличение содержания общего азота в моче отмечается при усиленном распаде белков (отрицательный азотистый баланс), диабете, при рассасывании экссудатов и транссудатов, хроническом отравлении фосфором.

Вывод:

Работа 2. Определение содержания мочевой кислоты в моче.

Мочевая кислота у человека является конечным продуктом обмена пуриновых оснований, входящих в состав сложных белков — нуклеопротеинов.

В норме у человека с мочой выделяется мочевой кислоты 1,6–3,54 ммоль/сут (270–600 мг/сут).

Принцип метода. Метод основан на способности мочевой кислоты восстанавливать фосфорно-вольфрамовый реактив в фосфорно-вольфрамовую синь, интенсивность окраски которой пропорциональна содержанию мочевой кислоты. Количество фосфорно-вольфрамовой сини определяется путем титрования красной кровяной солью $K_3[Fe(CN)_6]$. Последняя окисляет фосфорно-вольфрамовую синь, и синее окрашивание исчезает.

Ход работы. К 1,5 мл мочи прибавляют 1 мл 20 % раствора карбоната натрия и 1 мл фосфорно-вольфрамового реактива Фолина, перемешивают и титруют 0,01н раствором $K_3[Fe(CN)_6]$ до исчезновения синего окрашивания.

Расчет. Содержание мочевой кислоты (в мг) в суточной моче вычисляют по формуле:

$$\text{Мочевая кислота, мг/сут} = 0,8 \cdot a \cdot v / 1,5,$$

где 0,8 мг мочевой кислоты соответствует 1 мл $K_3[Fe(CN)_6]$; a — количество $K_3[Fe(CN)_6]$, пошедшее на титрование, мл; v — суточный диурез, мл; 1,5 — объем пробы, мл.

Коэффициент пересчета в единицы СИ (ммоль/сут) — 0,0059.

Результат: $a =$

Расчет:

Клинико-диагностическое значение. Гипоурикурия (уменьшение выделения мочевой кислоты с мочой) отмечается при подагре, нефрите, почечной недостаточности; гиперурикурия (увеличение выделения мочевой кислоты с мочой) — при лейкемии, усиленном распаде нуклеопротеинов. У детей выделяется относительно больше мочевой кислоты, чем у взрослых. Выделение мочевой кислоты зависит от содержания пуринов в пище и интенсивности обмена нуклеопротеинов.

При подагре соли мочевой кислоты (ураты) откладывают в хрящах, мышцах и слизистой сумке суставов. Содержание мочевой кислоты в крови может быть повышенено, а в моче понижено.

Вывод:

Подпись преподавателя:

ЗАНЯТИЕ 21

МАТРИЧНЫЕ БИОСИНТЕЗЫ (СИНТЕЗ ДНК, РНК, БЕЛКОВ). СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ МОЛЕКУЛЯРНОЙ БИОЛОГИИ

Актуальность темы. Знание строения нуклеиновых кислот позволяет понять механизмы передачи и реализации генетической информации в клетке, овладеть основами понимания причин наследственных заболеваний и разработать методы их лечения. Нуклеотиды выполняют ряд специфических функций. Некоторые из них используются в качестве лекарственных препаратов.

Цель занятия: усвоить молекулярные механизмы репликации, репарации, транскрипции, трансляции и механизмы их регуляции; систематизировать эти знания и обсудить возможные механизмы нарушений реализации генетической информации для понимания последствий и подходов к лечению этих нарушений.

Требования к исходному уровню знаний. Для полного усвоения темы необходимо повторить из:

- курса биологии:
 - строение клетки;
 - механизмы митоза и мейоза;
 - биологическая роль нуклеиновых кислот;
- биоорганической химии:
 - строение мононуклеотидов;
 - общие принципы пространственной организации нуклеиновых кислот.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ ИСХОДНОГО УРОВНЯ ЗНАНИЙ

Задание 1. Подберите пары и напишите формулу:

Название	Составные части
1. Гуанозин	А. Рибоза, фосфат, аденин
2. Адениловая кислота	Б. Дезоксирибоза, тимин
3. Уридин	В. Гуанин, рибоза
4. ДезоксиЦМФ	Г. Урацил, рибоза
5. Тимидин	Д. Фосфат, дезоксирибоза, цитозин

Задание 2. Выберите, что относится только к ДНК, только к РНК, к ДНК и РНК:


- | | |
|---|---|
| А. Хранение генетической информации. | Е. Реализация генетической информации. |
| Б. А, Г, Т, Ц. | Ж. Рибоза. |
| В. Цитоплазма. | З. Ядро. |
| Г. 3',5'-фосфодиэфирная связь между мононуклеотидами. | И. А, Г, У, Ц. |
| Д. Дезоксирибоза. | К. Стабильность структуры поддерживается Н-связями. |

ДНК —

РНК —

ДНК и РНК —

Задание 3. Пользуясь рисунком (используйте цифру), подберите пары:



- А. Рибосомы.
- Б. Гладкая эндоплазматическая сеть.
- В. Шероховатая эндоплазматическая сеть.
- Г. Аппарат Гольджи.
- Д. Лизосомы.
- Е. Плазматическая мембрана.
- Ж. Цитоскелет.
- З. Ядро.
- И. Ядрышко.
- К. Митохондрия.
- Л. Пероксисома

Правильность решений проверьте, сопоставив их с ответами.

Вопросы для обсуждения:

1. Репликация, биологическая роль, субстраты, ферменты, молекулярный механизм.
2. Репарация ДНК, молекулярный механизм, биологическая роль.
3. Транскрипция, биологическая роль, молекулярный механизм, механизмы регуляции активности генов (схема Львова–Жакоба–Моно, схема Георгиева), процессинг РНК. Обратная транскрипция.
4. Генетический код и его свойства.
5. Рекогниция и трансляция как этапы реализации генетической информации в клетке. Компоненты белоксинтезирующей системы. Рекогниция (субклеточная локализация, схема, субстратная специфичность АРСаз). Роль тРНК в синтезе белка.
6. Современное представление о биосинтезе белка. Регуляция биосинтеза белка в клетке на генетическом уровне (роль гистонов, гормонов и жирорастворимых витаминов). Посттрансляционная модификация молекул белка (гидроксилирование, гликозилирование, ограниченный протеолиз, фосфорилирование, карбоксилирование).
7. Современные методы молекулярной биологии (ПЦР, blot-анализ ДНК и РНК (Саузерн-блот и Нозерн-блот), метод «отпечатков пальцев ДНК», клонирование). Принципы проведения, применение в медицине.
8. Метод определения последовательности нуклеотидов в ДНК (метод Сэнджера).

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ

Основная

1. Биологическая химия / В. К. Кухта [и др.]. Москва : Бином, Минск : Асап, 2008. С. 338–418.
2. Биологическая химия / А. Д. Таганович [и др.]. Минск : Выш. шк., 2013. С. 262–277.
3. Конспект лекций.

Дополнительная


1. Биохимия человека / Р. Марри [и др.]. Москва : Мир, 1993.
2. Нуклеопротеины : учеб. пособие / А. Д. Таганович [и др.]. Минск, 2000.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Задание 1. Вспомните, что основная «догма» молекулярной биологии указывает на два основных направления потока генетической информации в клетке:

- Хранение и передача информации (репликация и репарация);
- Реализация генетической информации — экспрессия генов (реконструкция, транскрипция и трансляция).

На рисунке показаны основные участники механизма репликации у эукариот:



Задание 2. Вспомните, что в процессе синтеза и во время хранения молекулы ДНК подвергаются многочисленным физическим, химическим и другого рода воздействиям, которые вызывают нарушения структуры молекул ДНК. Существует многоуровневая система репарации повреждений:

– мутации, которые возникают в процессе репликации. Репарируются (если это возможно) путем повторного считывания последовательности, удаления неправильно вставленного нуклеотида ДНК-полимеразами, обладающими экзонуклеазной активностью;

– мутации, которые не исправлены путем повторного считывания. Репарируются при помощи специальной пострепликативной репарации. Молекула родительской ДНК метилирована по отдельным азотистым основаниям, и вновь синтезируемая цепь также метилируется. Во время метилирования идет проверка правильности расположения мононуклеотидов, и в случае обнаружения мутаций включается механизм эксцизионной репарации с последующим метилированием цепи;

– мутации, возникающие спонтанно, в любое время репарируются механизмом эксцизионной репарации.

2.1. На рисунке справа изображена последовательность событий эксцизионной репарации в случае образования димера тимина в структуре ДНК.

Расставьте в последовательности, обозначенной на рисунке, следующие ферменты:

А. ДНК-лигаза.


Б. Эксцизионная нуклеаза.

В. ДНК-β-полимераза.



Задание 3. Вспомните, что среди механизмов узнавания белками (ферментами, факторами регуляции и т. д.) отдельных участков нуклеотидных последовательностей определенную роль играют палиндромные последовательности нуклеотидов (в частности, при узнавании ДНК-рестриктазами), которые могут формировать крестообразные структуры в молекуле ДНК.


3.1. Изобразите крестообразную структуру из палиндромной последовательности, показанной на рисунке ниже:



Задание 4. Механизмы реализации генетической информации в клетке многоэтапны. На рисунке изображены основные этапы экспрессии генов. Подберите пары (буква – таблица, цифра – рисунок):

A. Терминация	
Б. Рекогниция	
В. Инициация	
Г. Секреция	
Д. Формирование пространственной структуры	
Е. Элонгация	

Правильность решений проверьте, сопоставив их с ответами.




ПРОВЕРЬТЕ ВАШИ ЗНАНИЯ (САМОКОНТРОЛЬ УСВОЕНИЯ ТЕМЫ)

Задание 1. Напишите реакцию, катализируемую АРСазой.

Задание 2. На рисунке ниже показано строение рибосом у эукариот и прокариот.

2.1. Почему $60S + 40S = 80S$, а $50S + 30S = 70S$?

1. Скорость седиментации зависит от массы частиц.
2. Скорость седиментации зависит от формы частиц.
3. От того и другого.



Задание 3. На рисунке ниже показана схема структуры lac-оперона:



CAP (катализитически активируемый белок). Этот белок — рецeптор цАМФ, уровень которого в клетке определяется уровнем глюкозы (снижение количества глюкозы в питательной среде приводит к повышению уровня цАМФ в клетке). CAP, связанный с цАМФ, присоединяется к ДНК и стимулирует РНК-полимеразу, при этом ее активность увеличивается в 20–50 раз.

Репрессор связан с опероном в отсутствии лактозы.

А. Дополните строку:


промотор — место связывания _____

оператор — место связывания _____

Б. Изобразите схематически, используя предлагаемые выше формы для участников, их расположение на опероне при следующих 4 состояниях. В каком из них будут синтезированы белки, кодируемые опероном?

Компонент среды	1	2	3	4
Лактоза	+	-	-	+
Глюкоза	+	+	-	-


Задание 4. На рисунке ниже приводятся результаты электрофореза фрагментов участка молекулы ДНК (метод Сэнджера). Попытайтесь выяснить на основании этих результатов нуклеотидную последовательность анализируемого участка ДНК. Какая аминокислотная последовательность закодирована в этом участке? Буквы в скобках обозначают соответствующие дидезоксинуклеотиды, вносимые в реакционную среду ДНК-полимеразной реакции. Таблицу генетического кода смотрите в учебнике.



Для ответа на вопросы заданий 5–6 рассмотрите электрофореграммы, представленные на рисунке ниже.

Задание 5. На электрофореграмме А (слева) «отпечатки пальцев» ДНК матери (М), ребенка (С) и двух предполагаемых отцов (F1, F2). Указатели на левой стороне указывают полосы ДНК, общие между ребенком и матерью. Указатели на правой стороне указывают полосы ДНК, общие между ребенком и предполагаемыми отцами. Ваше мнение о предполагаемом отце.

Задание 6. Электрофореграмма Б (справа) показывает результаты исследования полиморфизма длины фрагментов рестрикции 4 пар близнецов. Ваше мнение об идентичности близнецов.



Ответы к решению заданий

Для самопроверки исходного уровня знаний:

- 1 (1 – В; 2 – А; 3 – Г; 4 – Д; 5 – Б).
- 2 — ДНК – А, Б, Д; РНК – В, Е, Ж, И; ДНК и РНК – Г, К, З.
- 3 (А – 7; Б – 3; В – 10; Г – 4; Д – 9; Е – 6; Ж – 11, З – 2; И – 1; К – 5).

Для самостоятельной работы:

- 2 (1 – Б; 2 – В; 3 – А). 4 (А – 4; Б – 1; В – 2; Г – 6; Д – 5; Е – 3).

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА (30 минут)

Анализ продуктов гидролиза нуклеопротеинов дрожжей.

Для изучения химического состава нуклеопротеинов проводят кислотный гидролиз дрожжей, поскольку они очень богаты нуклеопротеинами. Специфическими реакциями для каждого вещества открывают продукты гидролиза — полипептиды, пуриновые основания, углевод и фосфорную кислоту.

Принцип метода. Пекарские дрожжи гидролизуют под действием разбавленной серной кислоты. Полученный гидролизат используют для дальнейшей работы.

Работа 1. Биуретовая реакция на полипептиды. К 5 каплям гидролизата приливают 10 капель 10 % раствора NaOH, затем 2 капли 1 % раствора сульфата меди. Отмечают появление розово-фиолетовой окраски.

Работа 2. Серебряная проба на пуриновые основания. К 10 каплям гидролизата дрожжей добавляют 10 капель концентрированного раствора аммиака, затем добавляют 10 капель 2 % аммиачного раствора нитрата серебра. При стоянии через 3–5 мин образуется светло-коричневый осадок серебряных солей пуриновых оснований (содержимое пробирки перемешивать при стоянии не надо).

Работа 3. Качественная реакция на пентозу (Молиша). К 10 каплям гидролизата дрожжей добавляют 3 капли 1 % спиртового раствора тимола, перемешивают и по стенке пробирки осторожно приливают 20–30 капель концентрированной серной кислоты. При встряхивании на дне пробирки образуется продукт конденсации красного цвета.

Работа 4. Молибденовая проба на фосфорную кислоту. К 10 каплям гидролизата дрожжей добавляют 20 капель молибденового реактива и кипятят. При этом жидкость окрашивается в лимонно-желтый цвет (не осадок). Пробирку сразу охлаждают в струе холодной воды. На дне пробирки появляется кристаллический лимонно-желтый осадок фосфоромолибденовой кислоты.

Вывод:

Подпись преподавателя:

ЗАНЯТИЕ 22
КОЛЛОКВИУМ ПО ТЕМАМ «ОБМЕН ПРОСТЫХ БЕЛКОВ
И НУКЛЕОПРОТЕИНОВ», «БИОСИНТЕЗ ДНК, РНК И БЕЛКА»

Вопросы для подготовки к коллоквиуму:

1. Азотистый баланс, его состояние в норме и при патологии. Что характеризует коэффициент изнашивания?
2. Биологическая ценность белков. Нормы белка в питании.
3. Гидролиз белков (протеолиз). Классификация и свойства протеаз.
4. Переваривание белков. Характеристика протеаз желудочно-кишечного тракта (оптимум рН, механизмы активации, субстратная специфичность, эндо- и экзопептидазы). Роль HCl в переваривании белков. Кислотность желудочного сока — принцип определения, содержание в норме.
5. Гниение белков. Умейте схематически изобразить происхождение фенола, крезола, скатола, индола, кадаверина, путресцина. Механизмы обезвреживания продуктов гниения белков и других ксенобиотиков.
6. Аминокислотный фонд клетки, его пополнение и использование.
7. Переаминирование. Роль витамина В₆. Умейте писать реакции переаминирования с участием аланиновой и аспарагиновой трансаминац. Знайте их диагностическое значение.
8. Виды дезаминирования. Глутаматдегидрогеназная реакция — химизм, коферменты, значение. Непрямое дезаминирование.
9. Пути использования безазотистого остатка аминокислот. Гликогенные и кетогенные аминокислоты.
10. Пути обезвреживания аммиака. Умейте написать реакции синтеза и распада аспарагина, глутамина, восстановительного аминирования α-кетоглутарата, схему синтеза мочевины. Остаточный азот. Значение определения мочевины и остаточного азота в клинике.
11. Реакции декарбоксилирования аминокислот, биогенные амины. Умейте писать реакции синтеза триптиamina, серотонина, гистамина, γ-аминомасляной кислоты, знайте их роль в организме.
12. Синтез катехоламинов. Функции дофамина, норадреналина и адреналина в организме. Наследственные нарушения обмена фенилаланина и тирозина. Роль дофамина при болезни Паркинсона.
13. Нуклеотиды — их строение и функции. Знайте номенклатуру и умейте писать формулы азотистых оснований, нуклеозидов и нуклеотидов; изображать образование 3'-5'-fosfodiэфирной связи между нуклеотидами.
14. Особенности строения ДНК и РНК на уровне первичной, вторичной и третичной структуры (строение нуклеосом).
15. Переваривание нуклеопротеинов в желудочно-кишечном тракте.
16. Пути реутилизации азотистых оснований и нуклеозидов в клетке.
17. Конечные продукты распада пуриновых и пиридиновых нуклеотидов. Реакции образования мочевой кислоты. Гиперурикемия — ее причины и последствия.
18. Биосинтез пуриновых и пиридиновых нуклеотидов de novo: субстраты, ключевые ферменты, основные промежуточные продукты. Регуляция синтеза. Роль витаминов.
19. Применение в медицине синтетических структурных аналогов нуклеозидов и фолиевой кислоты.
20. Образование дезоксирибонуклеотидов для синтеза ДНК (схема).
21. Репликация. Субстраты, ферменты, механизм. Механизмы reparации ДНК, роль этого процесса.
22. Транскрипция. Ферменты, субстраты, механизм, регуляция. Обратная транскрипция.
23. Генетический код и его характеристика.

24. Рекогниция и собственно трансляция как этапы биосинтеза белка в клетке (роль т-РНК, АРСазы, строение рибосом и общие принципы механизма трансляции, источники энергии для биосинтеза белка, регуляция).

25. Виды посттрансляционной модификации белков.


26. Современные методы молекулярной биологии (ПЦР, блот-анализ ДНК (Саузерн-блот), метод «отпечатков пальцев ДНК», клонирование). Принципы постановки, применение в медицине.

27. Метод определения последовательности нуклеотидов в ДНК (метод Сэнджера).

Пример задачи и вопросов на метод Сэнджера

На рисунке приводятся результаты исследования нуклеотидной последовательности участка молекулы ДНК (метод Сэнджера).

I A T II



1. На чем основан этот метод?

2. Что нужно сделать, чтобы получить такую картину (поэтапно)?

3. В чем проводили электрофорез, по какому принципу произошло разделение фрагментов?

4. Что обозначают буквы в скобках и черточки на рисунке?

5. Какую роль выполняют дидезоксинуклеотиды в этом методе?

6. В каком направлении следует «читать» полученную электрофорограмму и почему?

7. Установите, в какой последовательности ДНК-полимераза включала нуклеотиды в синтезируемую цепь.

8. Что нужно сделать, чтобы расшифровать полученную картину и узнать последовательность нуклеотидов в анализируемом участке ДНК?

9. Какая аминокислотная последовательность закодирована в этом участке? (Таблица генетического кода будет в вашем распоряжении).

Вопросы для подготовки к коллоквиуму для студентов МФИУ:

1. Азотистный баланс. Виды азотистого баланса в норме и при патологии.

2. Потребность в белках. Биологическая ценность белков.

3. Протеолиз, виды, биологическая роль.

4. Переваривание белков. Общая характеристика протеаз, их субстратная специфичность.

5. Роль соляной кислоты в переваривании белков. Анализ желудочного сока.

6. Аминокислотный фонд клетки, его источники и пути использования.

7. Трансаминирование, аминотрансферазы, коферментная функция витамина В₆. Клиническое значение определения активности аминотрансфераз сыворотки крови.

8. Пути дезаминирования аминокислот. Окислительное дезаминирование глутаминовой кислоты (химизм), значение глутаматдегидрогеназной реакции. Непрямое дезаминирование.

9. Пути использования безазотистого остатка аминокислот. Гликогенные и кетогенные аминокислоты. Способы синтеза новых аминокислот.

10. Декарбоксилирование аминокислот, ферменты, кофермент. Биогенные амины (триптамин, серотонин, гистамин, γ-аминомасляная кислота), катехоламины (дофамин, норадреналин, адреналин). Реакции образования, биологическая роль, пути обезвреживания.

11. Пути связывания амиака в клетках (восстановительное аминирование α -кетоглутарата, синтез глутамина и аспарагина, образование карбамоилфосфата). Транспортные формы амиака.
12. Образование солей аммония в почках (источник амиака, роль глутаминазы и глутаматдегидрогеназы, значение активирования глутаминазы почек при ацидозе).
13. Орнитиновый цикл мочевинообразования (схема цикла, субстраты, ферменты, энергетическое обеспечение, связь с лимоннокислым циклом, регуляция). Судьба мочевины.
14. Остаточный азот крови (основные компоненты и их относительное содержание). Принцип определения и клинико-диагностическое значение.
15. Мононуклеотиды, строение, номенклатура, биологическая роль.
16. Первичная, вторичная и третичная структуры нуклеиновых кислот (особенности структуры, разновидности, типы стабилизирующих связей).
17. Обмен нуклеопротеинов. Переваривание нуклеопротеинов в желудочно-кишечном тракте (этапы, ферменты).
18. Распад пуриновых нуклеотидов (химизм, мочевая кислота как конечный продукт катаболизма). Представление о нарушениях пуринового обмена (гиперурикемия и подагра, почечно-каменная болезнь).
19. Биосинтез пуриновых нуклеотидов *de novo* (источники азота и углерода пуринового кольца, участие фолиевой кислоты, основные промежуточные продукты, ключевой фермент, регуляция синтеза). Представление о синтезе нуклеотидов из свободных азотистых оснований и нуклеозидов.
20. Распад пиридиновых нуклеотидов. Биосинтез пиридиновых нуклеотидов. Субстраты, схема процесса, ключевой фермент, регуляция синтеза, роль витаминов. Представление о нарушениях пиридинового обмена (оротацидурия).
21. Синтез дезоксирибонуклеотидов.
22. Репликация, биологическая роль, субстраты, ферменты, молекулярный механизм.
23. Транскрипция, биологическая роль, субстраты, ферменты, процессинг РНК.
24. Генетический код и его свойства.
25. Рекогниция и трансляция как этапы реализации генетической информации в клетке. Компоненты белоксинтезирующей системы. Рекогниция (субклеточная локализация, схема, субстратная специфичность АРСаз). Роль тРНК в синтезе белка.
26. Современное представление о биосинтезе белка. Регуляция биосинтеза белка в клетке на генетическом уровне.
27. Посттрансляционная модификация молекул белка, виды, биологическая роль.

БИОХИМИЯ ГОРМОНОВ

ЗАНЯТИЕ 23

ГОРМОНЫ. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ ГОРМОНОВ. КАЧЕСТВЕННЫЕ РЕАКЦИИ НА ГОРМОНЫ

Актуальность темы. Гормоны — класс биологически активных регуляторных химических соединений, синтезируемых железами внутренней секреции и/или специальными клетками. Значение гормональной продукции заключается в том, что секретируемые гормоны осуществляют регуляцию метаболизма отдельных органов и тканей, определяют состояние физиологических процессов и жизнедеятельности организма в целом. Нарушение синтеза, секреции, транспорта и рецепции гормонов клетками лежит в основе многообразных эндокринных расстройств. В связи с этим понимание механизма эндокринных нарушений чрезвычайно важно для диагностики и целенаправленной терапии эндокринных заболеваний.

Цель занятия: научиться применять знание классификации гормонов, типов гормональных рецепторов, G-белков и последующего каскада внутриклеточных участников передачи гормонального сигнала для понимания особенностей механизма действия гормонов на клетки; уметь применять знания о механизме действия индивидуальных гормонов для объяснения расстройств метаболизма при нарушении образования или гиперпродукции гормонов в организме.

Рекомендуемые темы для реферативных докладов:

1. Механизм действия стероидных гормонов: внутриклеточная рецепция, взаимодействие с геном клетки, активация синтеза ферментов.
2. Типы гормональных рецепторов. Механизм связывания гормонов 1-TMS и 7-TMS рецепторами. Проявления наследственного дефекта рецепторов.
3. Молекулярный механизм действия инсулина и сахарный диабет.
4. Молекулярный механизм действия тиреоидных гормонов. Зоб, микседема и базедова болезнь.
5. Применение анаболических гормонов в спортивной медицине.
6. Эндокринная функция эпифиза.
7. Оксид азота: происхождение, регуляторное действие в организме, использование в лекарственной терапии.
8. Факторы роста, их рецепторы, механизм действия. Значение в межклеточном взаимодействии.

Требования к исходному уровню знаний. Для полного усвоения темы необходимо повторить из:

- *анатомии человека:*
- анатомию желез внутренней секреции;
- *гистологии:*
- гистологическое строение желез внутренней секреции и гормоны, синтезируемые ими;
- АПУД-систему;
- типы гормональной секреции: эндокринную, нейроэндокринную, паро- и аутокринную;
- *биоорганической химии:*
- строение и свойства пептидов и белков;
- холестерол и стероиды — строение и свойства.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ ИСХОДНОГО УРОВНЯ ЗНАНИЙ

Задание 1. Подберите соответствующие пары гормон – источник гормона:

- | | |
|------------------------------------|------------------------|
| 1. α-Клетки островков Лангерганса. | А. Глюкагон. |
| 2. β-Клетки островков Лангерганса. | Б. Минералокортикоиды. |

- | | |
|--|----------------------|
| 3. С-Клетки щитовидной железы. | В. Глюкокортикоиды. |
| 4. Фолликулярные клетки щитовидной железы. | Г. Инсулин. |
| 5. Сетчатая зона коры надпочечников. | Д. Половые гормоны. |
| 6. Пучковая зона коры надпочечников. | Е. Тиреокальцитонин. |
| 7. Клубочковая зона коры надпочечников. | Ж. Тироксин. |

Задание 2. Выберите правильный ответ: эндокринная секреция — это:

А. Гормон, синтезируемый клеткой, выделяется в окружающую среду и действует на рядом расположенные клетки.

Б. Гормон, синтезируемый клеткой, выделяется в окружающую среду и действует на клетку, в которой он был синтезирован.

В. Нейромедиатор, синтезируемый нервными клетками.

Г. Гормон, синтезируемый клеткой, выделяется в кровь и действует на отдаленные от места синтеза клетки.

Задание 3. Какие гормоны секретируются эпифизом?

- | | |
|---------------|------------------------------------|
| А. Окситоцин. | Г. Серотонин. |
| Б. Либерины. | Д. Мелатонин. |
| В. Статины. | Е. Меланоцитостимулирующий гормон. |

Правильность решений проверьте, сопоставив их с ответами.

Вопросы для обсуждения:

1. Классификация гормонов по месту синтеза, химической природе.
2. Особенности синтеза гормонов белково-пептидной природы, стероидной природы, производных липидов.
3. Особенности биологического действия гормонов. Транспорт кровью.
4. Понятие «рецептор гормона». Классификация рецепторов: внутриклеточные рецепторы (ядерные и цитозольные), рецепторы цитоплазматической мембранны (лиганд-зависимые и потенциал-зависимые каналообразующие рецепторы, строение 1-TMS и 7-TMS-рецепторов).
5. Механизм действия гормонов: стероидной, аминокислотной и белково-пептидной природы.
6. Классификация G-белков и механизм их функционирования. Патология этих белков.
7. Понятие о вторичных посредниках действия гормонов (циклические нуклеотиды, ИТФ, Ca^{2+} , диацилглицерол).
8. Растворимая и мембраносвязанная гуанилатциклазы. Оксид азота.
9. Аденилатциклаза и фосфолипаза С. Их роль в клетке.
10. Роль протеинкиназ в клетке.

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ

Основная

1. *Биологическая химия* / В. К. Кухта [и др.]. Москва : Бином, Минск : Асар, 2008. С. 427–454.
2. *Биологическая химия* / А. Д. Таганович [и др.]. Минск : Выш. шк., 2013. С. 278–294.
3. Конспект лекций.

Дополнительная

1. *Строев, Е. А. Биологическая химия* / Е. А. Строев. Москва : Высшая школа, 1986. С. 370–412.
2. *Маршалл, В. Клиническая биохимия* / В. Маршалл. Санкт-Петербург, 2002. 380 с.
3. *Руководство по клинической эндокринологии* / под ред. Н. Т. Старковой. Санкт-Петербург, 1996. С. 7–10, 201–279, 296–376.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Задание 1. Вспомните, какие гормоны связываются с внутриклеточными рецепторами, а какие — с рецепторами плазматической мембранны. Обратите внимание, что при патологии

рецепторов ткани-мишени теряется чувствительность к гормону (гормон не вызовет соответствующего метаболического ответа).

1.1. В клинику поступил больной в состоянии гипергликемической комы. Введение инсулина не нормализовало концентрацию глюкозы крови. Какую причину гипергликемии можно предположить у больного?

- А. Аномалия клеточных рецепторов.
- Б. Гиперфункция гормонов коры надпочечников.
- В. Истинная гипоинсулинемия.
- Г. Опухоль базофильных клеток гипофиза.
- Д. Опухоль мозгового слоя надпочечников

1.2. У лабораторных животных, подвергшихся действию мутагенного вещества, обнаружили в тканях измененную аденилатцилазу. К какому гормону будут нечувствительны органы-мишени у этих животных?

- А. Эстрadiолу.
- Б. Тироксину.
- В. Глюкагону.
- Г. Прогестерону.
- Д. Альдостерону.

Задание 2. Вспомните химическую природу гормонов.

2.1. Студенту предложили смоделировать биосинтез адреналина, используя в качестве источника ферментов гомогенат мозгового слоя надпочечников, а в качестве субстрата — одно из нижеперечисленных веществ. Студент не справился с заданием, так как использовал для синтеза:

- А. Диоксифенилаланин.
- Б. Фенилаланин.
- В. Тирозин.
- Г. Лизин.
- Д. Дофамин.

2.2. У больных с опухолью клубочковой зоны надпочечника в три раза увеличивается биосинтез кортизола и кортикостерона и в 70 раз возрастает биосинтез альдостерона. Укажите метаболит, использование которого резко увеличивается:

- А. Сукцинил-КоА.
- Б. Эргостерол.
- В. Холин.
- Г. Метионин.
- Д. Холестерол.

2.3. Какой из нижеперечисленных гормонов не является гликопротеином?

- А. Соматотропин.
- Б. Тиреотропин.
- В. Лютеинизирующий гормон.
- Г. Фолликулостимулирующий гормон.

Задание 3. Вторичными посредниками действия гормонов на клетку являются циклические нуклеотиды, ИТФ, Ca^{2+} , диацилглицерол. Запомните, что цАМФ по некоторым своим эффектам на метаболизм клетки является антагонистом цГМФ.

3.1. Больному в течение недели вводили препарат теофиллин — ингибитор фосфодиэстеразы цАМФ. Активность какого гормона может усиливаться на фоне такого лечения?

- А. Адреналин.
- Б. Дезоксикортикостерон.
- В. Альдостерон.
- Г. Кортизол.
- Д. Эстрadiол.

3.2. У больного диагностирована опухоль мозгового слоя надпочечников — феохромоцитома. Какой посредник гормонального сигнала активно участвует в действии на ферменты при этом заболевании?

- А. цАМФ.
- Б. Простагландины.
- В. цТМФ.
- Г. Са-кальмодулин.
- Д. цГМФ.

3.3. Больной поступил в клинику с гипергликемией в результате развития опухоли, продуцирующей адреналин. С помощью введения каких веществ можно уменьшить интенсивность действия адреналина на органы-мишени?

- А. Активаторы фосфодиэстеразы. Г. цГМФ.
Б. цАМФ. Д. Ингибиторы кальциевых каналов.
В. Простагландины.

3.4. Какое из названных соединений не является вторичным посредником в действии гормонов?

- А. Диацилглицерол. Б. цАМФ. В. цГМФ. Г. Ca^{2+} . Д. ГМФ.

Правильность решений проверьте, сопоставив их с ответами.

ПРОВЕРЬТЕ СВОИ ЗНАНИЯ (САМОКОНТРОЛЬ УСВОЕНИЯ ТЕМЫ)

Задание 1. Внутриядерные рецепторы обнаружены для:

- А. Адреналина. Г. Гормона роста.
Б. Трийодтиронина. Д. Серотонина.
В. Глюкагона.

Задание 2. При обследовании представителей африканского племени пигмеев обнаружили нарушение синтеза в печени IGF-1. В реализации биологического действия какого гормона участвует этот белок?

- А. Соматотропина. Г. Соматостатина.
Б. Пролактина. Д. Лютропина.
В. Соматолиберина.

Задание 3. Фосфолипаза, расщепляющая фосфатидилинозитол на диацилглицерол и ИТФ, это:

- А. Фосфолипаза А₁. В. Фосфолипаза С.
Б. Фосфолипаза А₂. Г. Фосфолипаза Д.

Задание 4. Какой из нижеперечисленных гормонов **НЕ** является стероидом?

- А. Кортизол. Г. Лактогенный гормон.
Б. Альдостерон. Д. Дигидроксихолекальциферол.
В. Прогестерон.

Задание 5. Какой из нижеперечисленных гормонов **НЕ** является пептидом?

- А. Окситоцин. Г. Вазопрессин.
Б. Трийодтиронин. Д. Тиреолиберин.
В. Глюкагон.

Задание 6. G_s-белки стимулируют активность аденилатциклазы. Однако с течением времени этот эффект исчезает. Это обусловлено:

- А. АТФ-азной активностью α-субъединицы.
Б. АТФ-азной активностью γ-субъединицы.
В. Фосфодиэстеразной активностью G_s-белка.
Г. Фосфолипазной активностью G_s-белка.
Д. ГТФ-азной активностью α-субъединицы.

Задание 7. Фосфорилироваться в рецепторах гормонов могут аминокислоты, содержащие OH-группы. Назовите киназу, которой не существует:

- А. Тирозинкиназа. Г. Тир/сер/тре-киназа.
Б. Рецептор инсулина. Д. Рецептор соматотропина.
В. Серин-треонинкиназа. Е. Тир/вал-киназа.

Задание 8. Выберите вторичные посредники действия окситоцина:

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| А. Са ²⁺ . | Г. Диацилглицерол. |
| Б. цАМФ. | Д. Оксид азота. |
| В. цГМФ. | Е. ИТФ. |

Ответы к решению заданий

Для самопроверки исходного уровня знаний:

1 (1 – А; 2 – Г; 3 – Е; 4 – Ж; 5 – Д; 6 – В; 7 – Б). 2 — Г. 3 — Г, Д.

Для самостоятельной работы:

1.1 — А; 1.2 — В. 2.1 — Г; 2.2 — Д; 2.3 — А. 3.1 — А; 3.2 — А; 3.3 — А, Г; 3.4 — Д.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА (60 минут)

Качественные реакции на гормоны.

Гормоны щитовидной железы. Щитовидная железа синтезирует и секretирует высокоактивные йодсодержащие тиреоидные гормоны: тироксин (T₄) и 3,5,3'-трийодтиронин (T₃), а также нейодированный гормон (полипептид) тиреокальцитонин, функция которого связана с регуляцией уровня кальция и фосфора в крови.

Работа 1. Качественная реакция на тироксин.

Принцип метода. При разрушении тиреоидина образуется йодид калия, из которого йод легко вытесняется йодатом калия. Вытеснение йода из соли йодистоводородной кислоты является окислительно-восстановительной реакцией, где йодид калия служит восстановителем, а йодат калия (остаток йодноватой кислоты) — окислителем. Выделившийся йод обнаруживают с помощью крахмала (синее окрашивание) в кислой среде.

Ход работы. В пробирку наливают 2–4 капли гидролизата тиреоидина, прибавляют 3 капли 1 % раствора крахмала, 1 каплю фенолфталеина, а затем 4 капли йодата калия и приблизительно 10–15 капель 10 % раствора серной кислоты до обесцвечивания и появления синего окрашивания.

Результат:

Гормоны поджелудочной железы. В поджелудочной железе вырабатывается ряд гормонов: инсулин, глюкагон и липокайн. Инсулин вырабатывается в β-клетках островков Лангерганса (от лат. insula — остров), откуда и получил свое название. Инсулин — белок, состоящий из двух полипептидных цепей, соединенных друг с другом дисульфидными связями.

Первичная структура инсулина полностью расшифрована и осуществлен химический синтез инсулина. Органы мишени для инсулина: мышечная ткань, жировая ткань, кардиомиоциты. Действие инсулина многообразно. Инсулин играет важную роль в метаболизме углеводов. Он снижает содержание глюкозы в крови, увеличивает биосинтез гликогена в печени и мышцах, усиливает липогенез, т. е. образование жиров из углеводов, стимулирует синтез белков. Инсулин является антагонистом адреналина в регуляции синтеза и мобилизации гликогена.

Работа 2. Цветные реакции на инсулин.

Принцип метода. Инсулин дает характерные реакции на белок: биуретовую, Фоля, Миллона и др.

Ход работы

Биуретовая реакция. К 5 каплям 1 % раствора инсулина прибавляют 5 капель 10 % раствора NaOH, 2 капли 1 % раствора сульфата меди и все перемешивают; содержимое пробирки приобретает фиолетовое окрашивание.

Нингидриновая реакция. К 5 каплям 1 % раствора инсулина добавляют 5 капель 0,5 % водного раствора нингидрина и кипятят 1–2 мин. В пробирке появляется розово-фиолетовое окрашивание, а с течением времени раствор синеет.

Ксантопротеиновая реакция (Мульдера). В пробирку наливают 5 капель 1 % раствора инсулина, затем добавляют 3 капли концентрированной азотной кислоты и осторожно кипятят. В пробирке появляется осадок желтого цвета.

Реакция на тирозин (Миллона). В пробирку наливают 5 капель 1 % раствора инсулина, добавляют 3 капли реактива Миллона и осторожно нагревают. В пробирке появляется осадок темно-красного цвета.

Реакция на аминокислоты, содержащие слабосвязанную серу (Фоля). В пробирку наливают 5 капель 1 % раствора инсулина и добавляют 5 капель реактива Фоля, интенсивно кипятят и дают постоять 1–2 мин. При этом появляется черный или бурый осадок сульфида свинца.

Результат:

Гормоны мозгового слоя надпочечников. В мозговом слое надпочечников из аминокислоты тирозина синтезируются катехоламины, имеющие пирокатехиновое ядро и аминогруппу.

Работа 3. Качественные реакции на адреналин.

Принцип метода. Адреналин обладает слабощелочной реакцией, легко окисляется на воздухе с образованием адренохрома, вследствие чего раствор окрашивается в красный цвет. При взаимодействии с нитритом наблюдается желто-оранжевое окрашивание, с диазореактивом — красное и с хлорным железом — зеленое. Реакция с хлорным железом характерна для пирокатехинового кольца, входящего в молекулу адреналина и норадреналина. В красный цвет жидкость окрашивается вследствие образования сложного соединения типа азокрасителя.

Ход работы

Реакция с хлорным железом. В пробирку наливают 10 капель раствора адреналина и добавляют 1 каплю хлорного железа. Появляется зеленое окрашивание вследствие присутствия пирокатехина в молекуле адреналина. Добавляют 3 капли 10 % раствора NaOH и наблюдают изменение окрашивания (на вишнево-красное).

Диазореакция. К 6 каплям 0,5 % раствора сульфаниловой кислоты прибавляют 6 капель 0,5 % раствора нитрита натрия (смесь диазореактива), 10 капель раствора адреналина и 3 капли 10 % раствора NaOH. Жидкость окрашивается в красный цвет.

Результат:

Работа 4. Флюoresценция продуктов окисления адреналина.

Принцип метода. Адреналин, окисляясь кислородом воздуха, при добавлении щелочи дает флюoresцирующие продукты.

Ход работы. К 10 каплям воды приливают 6 капель 10 % раствора NaOH и 6 капель раствора адреналина. Поместив пробирку перед включенным флюорескопом, наблюдают зеленую флюoresценцию продуктов окисления адреналина.

Результат:

Гормоны половых желез. Половые гормоны синтезируются в семенниках, яичниках, плаценте и надпочечниках.

Женские половые гормоны — эстрогены — можно рассматривать как производные эстрана (углеводорода с 18 атомами углерода). Основными природными эстрогенами являются эстрадиол, эстрон и гормон желтого тела — прогестерон.

Мужские половые гормоны — андрогены — можно рассматривать как производные андростана (углеводорода с 19 атомами углерода). К мужским половым гормонам относятся тестостерон и андростерон.

Работа 5. Качественная реакция на фолликулин.

Принцип метода. Качественная реакция на фолликулин (эстрон) проводится с концентрированной серной кислотой и обусловлена образованием эфирного соединения соломенно-желтого цвета с зеленой флюoresценцией.

Ход работы. С масляным раствором фолликулина реакцию проводят при комнатной температуре. К 2 каплям масляного раствора фолликулина приливают 30 капель концентрированной серной кислоты. Постепенно развивается соломенно-желтое окрашивание.

Результат:

Выводы:

Подпись преподавателя:

ЗАНЯТИЕ 24

БИОХИМИЯ ГОРМОНОВ. ТЕСТ НА ТОЛЕРАНТНОСТЬ К ГЛЮКОЗЕ

Актуальность темы. Механизм действия индивидуальных гормонов необходимо знать не только эндокринологу, но и врачу любой специализации. Гормоны нашли широкое применение в медицине. Диагностика эндокринной патологии на основании изменения биохимических показателей метаболизма, в частности, диагностика сахарного диабета с помощью метода нагрузки глюкозой широко применяется в медицинской практике.

Цель занятия: закрепить знания о химическом строении и механизмах действия индивидуальных гормонов; особое внимание уделить эндокринной патологии поджелудочной железы; научиться строить и интерпретировать результаты построения различных типов гликемических кривых.

Требования к исходному уровню знаний. Требования те же, что и к предыдущему занятию. Дополнительно нужно вспомнить из курса биоорганической химии о том, что глюкоза (благодаря наличию в ее формуле альдегидной группы) обладает редуцирующими свойствами. На этом основаны методы ее определения в биологических жидкостях.

ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ ИСХОДНОГО УРОВНЯ ЗНАНИЙ

Задание 1. Какой из этих углеводов даст реакцию Троммера?

- | | |
|--------------|--------------|
| А. Сахароза. | Г. Глюкоза. |
| Б. Лактоза. | Д. Гликоген. |
| В. Фруктоза. | |

Правильность решения проверьте, сопоставив его с ответами.

Вопросы для обсуждения:

1. Гормоны гипоталамуса: химическое строение, тип рецептора в клетках-мишениях, каскадный механизм усиления гормонального сигнала, ответ клеток гипофиза на действие либеринов и статинов гипоталамуса.
2. Гормоны adenогипофиза: химическое строение, типы рецепторов в тканях-мишениях, каскадный механизм усиления гормонального сигнала, реализация эффекта гормонов на уровне тканей-мишенией. Роль избыточной и недостаточной секреции гормонов.
3. Гормоны нейрогипофиза: химическое строение, тип рецептора в ткани-мишени, каскадный механизм усиления гормонального сигнала, реализация эффекта окситоцина и вазопрессина на уровне тканей-мишенией. Несахарный диабет.
4. Тироксин и трийодтиронин: химическое строение, предшественник синтеза, тиреоглобулин, тип рецептора в ткани-мишени, реализация эффекта тиреоидных гормонов на уровне клетки. Роль пероксидазы и дейодазы в метаболизме гормонов. Проявление гипо- и гипер-тиреоидизма.
5. Гормоны коры надпочечников: химическое строение, предшественник синтеза, тип рецептора в ткани-мишени, реализация эффекта глюкокортикоидов и минералокортикоидов на уровне клетки. Синдром Кушинга. «Бронзовая болезнь».
6. Половые гормоны: химическое строение, предшественник синтеза, реализация эффекта эстрогенов, прогестерона и мужских половых гормонов на уровне клетки. Избыточная и недостаточная секреция половых гормонов.
7. Инсулин и глюкагон: химическое строение, синтез инсулина, типы рецепторов в тканях-мишениях для глюкагона и инсулина, реализация эффекта гормонов поджелудочной железы на уровне клеток. Нарушения метаболизма при диабете. Диагностическое значение гликемических кривых.

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ

Основная

1. *Биологическая химия* / В. К. Кухта [и др.]. Москва : Бином, Минск : Асар, 2008. С. 454–514.
2. *Биологическая химия* / А. Д. Таганович [и др.]. Минск : Выш. шк., 2013. С. 294–320.
3. Конспект лекций.

Дополнительная

1. *Строев, Е. А. Биологическая химия* / Е. А. Строев. Москва : Высшая школа, 1986. С. 370–412.
2. *Маршалл, В. Клиническая биохимия* / В. Маршалл. Санкт-Петербург, 2002. 380 с.
3. *Руководство по клинической эндокринологии* / под ред. Н. Т. Старковой. Санкт-Петербург, 1996. С. 15–486.
4. *Brook, Ch. G. D. Essential Endocrinology* / Ch. G. D. Brook, N. J. Marshall. Blackwell Science (Oxford). 2001. Р. 1–164.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Задание 1. Обратите внимание на то, что полиурия отмечается не только при сахарном диабете (*Diabetes mellitus*), но и при несахарном диабете (*Diabetes insipidus*), а также при почечном диабете (при поражении почек). Различить причину полиурии помогает определение удельного веса мочи и данные определения уровня гликемии. Не забывайте, что часто диабет носит скрытый характер и выявить заболевание можно на основании результатов нагрузки глюкозой.

1.1. При обследовании больного на толерантность к глюкозе определен натощак уровень глюкозы в крови 7,0 ммоль/л, через 2 часа после нагрузки глюкозой — 10 ммоль/л. Для какого нарушения регуляции углеводного обмена характерны эти показатели?

- | | |
|-------------------------------------|----------------------|
| А. Сахарный диабет. | Г. Болезнь Адиссона. |
| Б. Скрытая форма сахарного диабета. | Д. Микседема. |
| В. Гиперинсулинизм. | |

1.2. В клинику поступил ребенок с жалобами на усиленную жажду, частое мочеиспускание. Клинический анализ крови и общий анализ мочи патологических компонентов не обнаружили. Что можно применить для лечения ребенка?

- | | |
|-----------------|-------------------|
| А. Вазопрессин. | Г. Тиреоидин. |
| Б. Окситоцин. | Д. Кортикостерон. |
| В. Альдостерон. | |

1.3. В эндокринологическое отделение поступила больная с жалобами на жажду, частое мочеиспускание, выраженную сухость кожных покровов. При анализе мочи качественной патологии не выявлено, плотность мочи 1,009. Для какого нарушения гормональной регуляции это характерно?

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| А. Несахарный диабет. | Г. Тиреотоксикоз. |
| Б. Стероидный диабет. | Д. Микседема. |
| В. Инсулярный диабет. | |

1.4. При лабораторном анализе у больного выявлен гипергликемический тип гликемической кривой. При каком заболевании, помимо сахарного диабета, это может быть?

- | | |
|----------------------|------------------------|
| А. Тиреотоксикоз. | Г. Несахарном диабете. |
| Б. Болезни Адиссона. | Д. Гипотиреозе. |
| В. Инсулиноме. | |

1.5. В клинической лаборатории при анализе мочи в одной из проб определили низкий удельный вес. Какие изменения должны сопутствовать этому показателю?

- | | |
|-----------------|-----------------|
| А. Креатинурия. | Г. Протеинурия. |
| Б. Глюкозурия. | Д. Полиурия. |
| В. Кетонурия. | |

1.6. У больного при анализе мочи определили низкий удельный вес. Уровень какого гормона в крови нужно определить у больного для уточнения нарушения?

- А. Инсулина. Г. Альдостерона.
Б. Вазопрессина. Д. Тиреокальцитонина.
В. Кортизола.

1.7. При профосмотре у женщины выявлена скрытая форма диабета. Лабораторные анализы позволили врачу назначить диетотерапию со сниженным количеством углеводов и увеличение липотропных веществ. Какой основной метаболический эффект достигается такой диетой?

- А. Повышение использования глюкозы на синтез жира в жировой ткани.
Б. Снижение окисления жирных кислот в печени.
В. Повышение использования глюкозы на синтез жира в печени.
Г. Увеличение синтеза фосфолипидов и уменьшение отложения нейтрального жира в печени.
Д. Снижение синтеза фосфолипидов.

Задание 2. Инсулин и глюкагон — антагонисты. Вспомните механизм действия этих гормонов на углеводный и липидный обмены.

2.1. Пациент при лечении голоданием потерял 10 кг веса. Активация какого гормона привела к увеличению скорости катаболизма жиров при голодании?

- А. Инсулина. Г. Альдостерона.
Б. Соматостатина. Д. Окситоцина.
В. Глюкагона.

2.2. Больному сахарным диабетом с отрицательным азотистым балансом назначили инъекции инсулина. На какой процесс подействует инсулин для восстановления азотистого равновесия?

- А. Ингибирование глюконеогенеза.
Б. Ингибирование гликолиза.
В. Увеличение проницаемости клеток для Ca^{2+} .
Г. Активацию гликогенфосфорилазы.
Д. Активацию протеинфосфатаз

2.3. В клинику поступил больной без сознания. В выдыхаемом воздухе был запах ацетона, упругость тканей снижена (обезвоживание). Какой биохимический анализ будет вписываться в клиническую картину заболевания?

- А. Гипергаммаглобулинемия.
Б. Снижение содержания $\text{NH}_2 - \text{CO} - \text{NH}_2$ в крови.
В. Наличие в моче $\text{CH}_3 - \text{CH}(\text{OH}) - \text{CH}_2 - \text{COOH}$.
Г. Снижение удельного веса мочи.
Д. Снижение содержания аминокислот в крови.

2.4. Вполне благополучный новорожденный, оставленный без кормления на длительный период, умер. Анализ взятого биопсией тканевого материала выявил отсутствие в печени фосфоенолпируваткарбоксикиназы. Какой гормон индуцирует синтез этого фермента?

- А. Глюкагон. Б. Тироксин. В. Инсулин. Г. Кортизол. Д. Альдостерон.

2.5. Подростку, длительно страдающему гипогликемией, ввели глюкагон и не получили ответной реакции на гормон. Исследование ткани печени, взятой при биопсии, выявило дефект фермента. Назовите этот фермент:

- А. Глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа. Г. Фосфоглюкомутаза.
Б. Гексокиназа. Д. Глюкозо-6-фосфатаза.
В. Фосфогексоизомераза.

2.6. У ребенка 2-го года жизни, страдающего мышечной слабостью, обнаружили увеличенную печень и низкий уровень глюкозы в крови натощак. После введения глюкагона гипергликемия не возникает. Исследование ткани печени, взятой при биопсии, выявило дефект фермента. Назовите этот фермент:

- | | |
|-------------------------|------------------|
| А. а-Амилаза. | Г. Гексокиназа. |
| Б. Лактатдегидрогеназа. | Д. Фруктокиназа. |
| В. Гликогенфосфорилаза. | |

Задание 3. Вспомните механизм действия гормонов коры надпочечников.

3.1. Девушка обратилась к врачу с жалобами на резкую мышечную слабость, головокружение, усиление пигментации кожи, потерю веса, сухость кожи, повышенный диурез. При обследовании установили сниженное артериальное давление, концентрация глюкозы крови 3,0 ммоль/л, повышенное выделение натрия с мочой. Назначение какого препарата может улучшить состояние больной?

- | | |
|---------------|--|
| А. Инсулина. | Г. Альдостерона. |
| Б. Глюкагона. | Д. Питуитрина (вытяжка из задней доли гипофиза). |
| В. Тироксина. | |

3.2. Больной обратился с жалобами на общую утомляемость, головную боль, боль в спине и конечностях, исхудание конечностей и увеличение жировых отложений в области спины и шеи, постоянную жажду. При осмотре врач заподозрил синдром Иценко–Кушинга. Изменение уровня какого гормона в крови подтверждает предположение врача?

- | | |
|---------------|------------------|
| А. Тироксина. | В. Альдостерона. |
| Б. Кортизола. | Г. Прогестерона. |

Задание 4. При заболевании сахарным диабетом нарушается усвоение глюкозы тканями и усиливается распад липидов. В результате дефицита ЩУК нарушается функционирование ЦТК и избыток молекул ацетил-КоА используется на синтез кетоновых тел.

В клинику доставлена больная с сахарным диабетом в прекоматозном состоянии кетоацидотического типа. Увеличение содержания какого метаболита к этому привело?

- | | |
|---------------------|------------------|
| А. Малоната. | Г. Ацетоацетата. |
| Б. Оксалоацетата. | Д. Аспартата. |
| В. а-Кетоглутарата. | |

Правильность решений проверьте, сопоставив их с ответами.

ПРОВЕРЬТЕ СВОИ ЗНАНИЯ (САМОКОНТРОЛЬ УСВОЕНИЯ ТЕМЫ)

Задание 1. Молодой пациент, страдающий инсулинзависимым диабетом, соблюдал рекомендации врача. Больной хорошо себя чувствовал. Однако при определении уровня глюкозы в крови у него была обнаружена выраженная гипергликемия (15 ммоль/л). Содержание гликозилированного гемоглобина HbA_{1c} составило 5,0 %. Насколько компенсировано заболевание?

Комментарий. Несмотря на высокий уровень глюкозы содержание HbA_{1c} у больного было нормальным, т. е. за прошедшие несколько недель лечение диабета было эффективным. Наличие гипергликемии, как удалось выяснить при более подробном анамнезе, объяснялось обильным застольем накануне.

Задание 2. При анализе мочи у больного обнаружена выраженная глюкозурия. Вспомните, чему равен почечный порог для глюкозы. Укажите уровень гликемии, при котором глюкоза будет экскретироваться в мочу:

- | | |
|----------------|----------------|
| А. 6 ммоль/л. | В. 15 ммоль/л. |
| Б. 10 ммоль/л. | Г. 40 ммоль/л. |

Задание 3. Выберите причину, по которой глюкозурия может отмечаться у больного с нормогликемией:

- А. Стресс.
Б. Голод.
В. Заболевания почек.
Г. Тиреотоксикоз.

Ответы к решению заданий

Для самопроверки исходного уровня знаний:

1 — Б, Г.

Для самостоятельной работы:

1.1 — А; 1.2 — А; 1.3 — А; 1.4 — А; 1.5 — Д; 1.6 — Б; 1.7 — Г.

2.1 — В; 2.2 — А; 2.3 — В; 2.4 — Г; 2.5 — Д; 2.6 — В.

3.1 — Г; 3.2 — Б. 4.1 — Г.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА (60 минут)

Изучение углеводного обмена методом нагрузки глюкозой.

Для диагностики сахарного диабета и некоторых патологических состояний (недостаточность функции печени и почек, некоторые эндокринные заболевания, новообразования мозга, поджелудочной железы и надпочечников, гиповитаминоз В₁, некоторые наследственные аферментозы) важно иметь представление о состоянии углеводного обмена у больных, одним из показателей которого является уровень глюкозы в крови. В норме концентрация глюкозы в крови взрослого человека составляет **3,9–6,1 ммоль/л**.

Пероральный тест на толерантность к глюкозе (нагрузка глюкозой) позволяет выявить патологию в тех случаях, когда исследование содержания глюкозы в крови натощак не позволяет выявить нарушения обмена веществ.

Показания для проведения теста на толерантность к глюкозе:

– Неоднозначные результаты однократных анализов крови натощак.

– Глюкозурия: панкреатическая и внепанкреатическая (первая связана с недостатком секреции или недостаточностью самого инсулина; внепанкреатическая глюкозурия развивается при поражении других органов внутренней секреции, ЦНС, при эмоциональном стрессе, заболеваниях почек, печени, избытке углеводов в диете, при беременности).

– Клинические признаки сахарного диабета или его осложнений при нормальной концентрации глюкозы крови натощак (скрытые формы диабета).


Проведение нагрузки. Утром натощак у больного берут кровь из пальца для определения содержания глюкозы, после чего ему дают выпить 200 мл раствора глюкозы (из расчета 1 г глюкозы на 1 кг массы тела) в течение 5 мин. Затем через каждые 30 мин у больного снова берут кровь из пальца (в пределах 2,5–3 ч), и результаты определения содержания глюкозы в этих пробах используют для построения гликемических кривых, откладывая на вертикальной оси значение концентрации глюкозы в каждой пробе, а на горизонтальной — время (минуты или часы).

Ход работы. В пробах для анализа № 1–6 определите содержание глюкозы (см. Инструкцию к практическому занятию № 10 «Определение глюкозы в крови ферментативным методом»). В 1-й пробирке — сыворотка крови, взятой натощак, во 2–6-й пробирках — взятой через каждые 30 минут после нагрузки глюкозой. На основании полученных данных постройте кривую. Проанализируйте гликемическую кривую, запишите выводы.

В норме после нагрузки концентрация глюкозы в крови возрастает в течение первого часа на 50–80 %, через 2 часа ее уровень снижается (часто ниже исходного), а через 2,5–3 часа он возвращается к исходному. В случаях нарушения толерантности к глюкозе (НТГ) значительное (до 10,0 ммоль/л) повышение концентрации глюкозы после нагрузки сохраняется более 3 ч.

Гликемические кривые у детей имеют такой же характер, что и у взрослых, с тем лишь отличием, что повышение концентрации сахара в крови у детей меньшее.

На рисунке — гликемические кривые при однократной нагрузке глюкозой в норме и при некоторых патологических состояниях.



Клинико-диагностическое значение оценки гликемических кривых. У больных с разными формами диабета нарастание гликемической кривой происходит медленнее, достигая через 60–150 мин значительной величины (более чем в 1,8 раза превышая исходное значение), в большинстве случаев отмечается глюкозурия. Чем тяжелее заболевание, тем позже достигается максимум гликемии и тем он выше. Понижение кривой происходит очень медленно, чаще оно растягивается на 3–4 ч.

Заболеваниям щитовидной железы, связанным с ее гиперфункцией, свойственны гликемические кривые с более быстрым, чем в норме, подъемом, что, возможно, вызвано более интенсивным обменом веществ и возбуждением симпатического отдела вегетативной нервной системы.


Для больных с аденомой островков Лангерганса, гипотиреозом (микседемой), болезнью Аддисона характерен низкий исходный уровень кривой, низкая ее вершина и высокий постгликемический коэффициент. При некоторых тяжелых заболеваниях (энцефалит и др.) глюкоза может появляться в моче в результате ренальной глюкозурии.

Критерии ВОЗ для постановки диагноза «сахарный диабет» и НТГ

Диагноз	Время взятия крови	Венозная цельная кровь, ммоль/л
Сахарный диабет	Натощак	>6,7
	2 ч после нагрузки глюкозой	>10,0
НТГ	Натощак	<6,7
	2 ч после нагрузки глюкозой	6,7–10,0

Результаты: Е_{станд.} =

		0 мин	30 мин	60 мин	90 мин	120 мин	150 мин
Пациент 1	Е _{оп.}						
	С глюкозы (ммоль/л)						
Пациент 2	Е _{оп.}						
	С глюкозы (ммоль/л)						



Вывод:

Подпись преподавателя:

БИОХИМИЯ ПЕЧЕНИ

ЗАНЯТИЕ 25 БИОХИМИЯ ПЕЧЕНИ. ИНТЕГРАЦИЯ МЕТАБОЛИЗМА

Актуальность темы. Печень играет центральную роль в промежуточном обмене веществ. Особенности ферментативного аппарата печени и ее анатомических связей с другими органами дают возможность печени участвовать в регуляции практически всех видов обмена веществ и поддерживать постоянство концентрации в крови многих жизненно важных соединений.

Печень — большая «промежуточная станция» между портальным и общим кругами кровообращения организма. Как правило, все вещества, всасывающиеся из кишечника, проходят через печень. Функции печени обусловливают ее своеобразный «биохимический альтруизм»: многие происходящие в ней процессы обеспечивают синтез различных веществ для других органов, а также на защиту этих органов от образующихся в них (или поступающих извне) токсических соединений.

В состав органа входят клетки Купфера, принимающие участие в фагоцитозе. Печень выделяет желчь, необходимую для переваривания жира. Значительную роль играет печень в процессах свертывания крови, т. к. синтезирует белки-компоненты свертывающей и антисвертывающей систем крови.

В печени депонируются железо, медь и витамин В₁₂, необходимые для эритропоэза. Продолжительность жизни эритроцитов составляет 110–120 дней. После этого они разрушаются с освобождением гемоглобина. В печени, селезенке, костном мозге гемоглобин распадается с образованием билирубина. Дальнейшая судьба желчных пигментов (билирубина) связана с их метаболизмом в печени и в кишечнике. Определение в клинике содержания общего билирубина, его фракций и продуктов их деградации имеет важное значение в дифференциальной диагностике желтух различной этиологии.

Следует отметить значительную вариабельность химического состава печени, который зависит от характера питания, состояния обмена веществ. Особенно существенные изменения в соотношении отдельных компонентов наблюдаются при голодании и патологических процессах, например, жировой инфильтрации печени, гликогенозах и др.

В связи с вышеизложенным понятна необходимость правильной оценки функционального состояния печени с использованием различных биохимических тестов, позволяющих установить факт заболевания и отслеживать его течение.

Способность организма животных к поддержанию постоянства состава внутренней среды организма осуществляется за счет интеграции метаболических путей и является одним из наиболее существенных достижений эволюции. Изменение интегративных связей нарушает сбалансированную продукцию энергии, пластического материала и служит основой развития заболеваний.

Цель занятия: научиться применять знания о гомеостатической и интегрирующей роли печени в обмене углеводов, липидов и аминокислот для объяснения механизмов нарушений обмена веществ при болезнях печени и желчных путей; уметь использовать знания о путях превращения в печени ксенобиотиков для понимания биохимических аспектов фармакологии и токсикологии; понять принципы и механизмы взаимодействия различных метаболических путей для обеспечения жизнедеятельности и адаптации.

Требования к исходному уровню знаний. Для полного усвоения темы необходимо повторить из:

- анатомии, гистологии, физиологии;
- особенности строения и микроструктуры печени;
- функции печени;

- анатомо-физиологические взаимоотношения между печенью, желудочно-кишечным трактом и воротной веной;
- *биоорганической химии*:
- основные реакции введения функциональных групп в молекулы химических веществ с целью повышения их гидрофильных свойств;
- *биологической химии*:
- метаболические пути обмена углеводов, липидов и белков.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ ИСХОДНОГО УРОВНЯ ЗНАНИЙ

Задание 1. При изучении микропрепарата печени студентам дано задание зарисовать структурную морфологическую единицу печени — ацинус.

1.1. Укажите функцию, которую выполняют элементы этой морфологической единицы — клетки Купфера:

- А. Синтетическая. Б. Выделительная. В. Обезвреживающая.

1.2. Какую роль играет пространство Дисе?

А. Участвует в транспорте веществ между кровью синусоидов и паренхиматозными клетками.

Б. Является депо желчи.

В. Участвует в транспорте веществ между артериолами, венулами и центральной веной.

Задание 2. Методом «меченых атомов» была зафиксирована энтерогепатическая циркуляция желчных кислот. По каким кровеносным сосудам происходит возврат желчных кислот из кишечника к гепатоцитам в процессе этой циркуляции?

А. По центральной вене печени.

Б. По воротной вене печени.

В. По нижней полой вене печени.

Г. По печеночной артерии.

Задание 3. На лабораторном практикуме студенты получили задание сравнить растворимость различных веществ в воде. Сравнив результаты исследования, студенты убедились, что введение некоторых функциональных групп повышает гидрофильность молекул органических соединений.

3.1. Какие функциональные группы могут обеспечить гидрофильные свойства этих молекул?

- | | |
|-------------------|-------------------|
| А. Изопропильные. | В. Гидроксильные. |
| Б. Дисульфидные. | Г. Карбоксильные. |

3.2. Назовите химические реакции, в результате которых в молекулы органических соединений могут быть введены указанные выше функциональные группы:

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| А. Гидроксилирование. | В. Дезаминирование. |
| Б. Карбоксилирование. | Г. Нитрование. |

Задание 4. Назовите метаболит гликолиза, используемый для синтеза глицерола:

- А. Фосфодиоксиацетон.
 Б. Ацетил-КоА.
 В. Пировиноградная кислота.
 Г. Щавелевоуксусная кислота.
 Д. β -Гидроксимасляная кислота.

Задание 5. Для образования глюкозы во время голодания клетки печени используют:

- | | |
|--------------------|------------------------------|
| А. Жирные кислоты. | Г. β -Гидроксибутират. |
| Б. Аминокислоты. | Д. Ацетил-КоА. |
| В. Ацетоацетат. | |

Задание 6. Молекулой, непосредственно связанной с инициацией развития атеросклеротической бляшки, является:

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| А. Фактор некроза опухолей. | Г. Тромбоцитарный фактор роста. |
| Б. Тромбоксан А ₂ . | Д. Окисленный холестерол. |
| В. Простациклин. | |

Правильность решений проверьте, сопоставив их с ответами.

Вопросы для обсуждения:

1. Основные функции и химический состав печени.
2. Роль печени в обмене углеводов, липидов, белков.
3. Обезвреживающая функция печени, механизмы: (защитные синтезы, ацилирование, микросомное окисление, конъюгация).
4. Роль печени в пигментном обмене. Синтез и распад гемоглобина (схемы). Обмен билирубина в норме и патологии. Порфирии, желтухи (гемолитическая, обтурационная, паренхиматозная) и их дифференциальная диагностика.
5. Биохимические методы диагностики нарушений функций печени.
6. Необходимость интеграции метаболизма, ее принципиальные составляющие. Механизмы регуляции метаболизма.
7. Особенности метаболизма в печени, жировой и мышечной тканях в состоянии после приема пищи и натощак.
8. Межорганный метаболизм в динамике голодания.
9. Основные метаболические пути обмена углеводов, белков, липидов (схемы реакций, ключевые ферменты, регуляция).

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ

Основная

1. *Биологическая химия* / В. К. Кухта [и др.]. Москва : Бином, Минск : Асар, 2008. С. 301–306, 607–612, 661–676.
2. *Биологическая химия* / А. Д. Таганович [и др.]. Минск : Выш. шк., 2013. С. 321–331, 403–429.
3. Конспект лекций.

Дополнительная

1. *Маршалл, В.Дж. Клиническая биохимия* / В. Дж. Маршалл. Москва : Бином, Санкт-Петербург : Невский Диалект, 1999. 368 с.
2. *Биохимия человека* / Р. Мари [и др.]. Москва : Мир, 1993. 384 с.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Задание 1. Систематизируйте знания об интеграции путей метаболизма в печени. Рассмотрите рисунок «Пути превращения углеводов и липидов в печени».


1.1. Обратите внимание на то, что большая часть потребленной свободной глюкозы в печени фосфорилируется с образованием глюкозо-6-фосфата. Метabolизм этого соединения может осуществляться по пяти основным направлениям, выбор которых зависит от соотношения между потребностями организма и количеством поступивших с пищей углеводов.

1.2. Печень поддерживает постоянный уровень глюкозы в крови при голодании за счет активации гликогенолиза и глюконеогенеза, а при избыточном ее поступлении из кишечника глюкоза депонируется в виде гликогена и липидов.

1.3. Запомните, что обратимость превращения лактата в пируват (направление реакции) зависит от соотношения НАДН·Н⁺/НАД⁺.

1.4. Запомните, что жирные кислоты — основной субстрат энергетического метаболизма в печени и предшественники в биосинтезе холестерола, кетоновых тел, липидной части липопротеинов плазмы крови.

Пути превращения углеводов и липидов в печени



1.5. Этанол окисляется, главным образом, в печени, где при участии НАД-зависимых дегидрогеназ, последовательно превращаясь в уксусный альдегид и уксусную кислоту, приводит к увеличению отношения НАДН·Н⁺/НАД⁺. Объясните, почему при алкогольном токсикозе наблюдается гиперлактатемия и гипогликемия. Напишите реакции, подтверждающие указанные явления:


1.6. Объясните:

- почему уже через три часа после удаления печени у животных развивается гипогликемия и наступает смерть, если ежечасно не вводить глюкозу;
- почему введение галактозы, лактата или пирувата в этих условиях не эффективно.

1.7. Укажите продукты липидного обмена, синтезирующиеся преимущественно в печени:

- | | |
|--------------------|-------------------------|
| A. Холестерол. | D. Хиломикроны. |
| B. ТАГ. | E. ЛПВП. |
| V. Фосфолипиды. | J. Свободный билирубин. |
| G. Кетоновые тела. | Z. ЛПОНП. |

Задание 2. Рассмотрите схему, приведенную ниже. Запомните, что аминокислоты, всосавшиеся в кишечнике и поступившие затем в печень, имеют несколько основных путей метаболизма.



2.1. У больного с алкогольным циррозом печени наблюдается сильная отечность. С нарушением синтеза каких веществ в печени связано это состояние?

- A. Мочевины.
- Б. Альбуминов.
- В. Холестерола.
- Г. Гаптоглобина.
- Д. Фибриногена.

2.2. В организме здорового человека железо депонируется в печени, селезенке, костном мозге. В составе какого белка происходит его депонирование?

- A. Ферритина.
- Б. Трансферрина.
- В. Апоферритина.
- Г. Плазмина.
- Д. Церулоплазмина.

Задание 3. Усвойте механизмы обезвреживания веществ в печени.

3.1. Имейте представление об основах функционирования микросомной системы окисления как пути метаболизма эндогенных и чужеродных соединений:



Таким способом гидроксилируются стероиды в процессе образования гормонов коры надпочечников, ряд лекарственных препаратов и других ксенобиотиков.

В результате гидроксилирования уменьшается токсичность и повышается растворимость ксенобиотиков, что способствует выведению их из организма. Многие лекарственные вещества, например, фенобарбитал, способны индуцировать синтез микросомных ферментов и цитохрома P₄₅₀.

3.2. Запомните, что конъюгационная фаза необходима для образования малотоксичных и легковыводимых продуктов метаболизма лекарств и может протекать как самостоятельный этап обезвреживания.

3.3. Для исследования обезвреживающей функции печени пациенту назначена проба Квика. После приема бензоата натрия уровень гиппуровой кислоты в моче обследуемого повысился, что свидетельствует о нормальной детоксикационной функции печени. Какое вещество принимает участие в обезвреживании этой соли?

- А. ФАФС.
- Б. Церулоплазмин.
- В. УДФ-глюкуроновая кислота.
- Г. Таурин.
- Д. Глицин.

3.4. У больного инфекционным гепатитом произошло обесцвечивание кала. С отсутствием в кишечнике какого продукта распада билирубина это связано?

- А. Копропорфирина.
- Б. Стеркобилина.
- В. Биливердина.
- Г. Вердоглобина.

Для усвоения материала необходимо обратить внимание на то, что:

- благодаря интеграции метаболизма (а не отдельным метаболическим путям) организм снабжается энергией и пластическим материалом за счет постоянного обновления его участников на уровне ключевых метаболитов, коферментов;
- важной составляющей взаимодействия метаболических путей является наличие сходных механизмов регуляции. Через эти механизмы реализуют свое действие гормоны и другие биологически активные соединения;
- центральным органом в интеграции метаболизма является печень, благодаря которой в крови поддерживается необходимый уровень веществ для использования их мозгом, мышцами и другими тканями.

Задание 4. Выберите правильный ответ: в мышцах после приема пищи:

- А. Глюкоза используется для синтеза гликогена.
- Б. Основной источник энергии — жирные кислоты.
- В. α -Кетокислоты, образующиеся из аминокислот с разветвленной цепью, окисляются в цикле Кребса.
- Г. Гликоген подвергается фосфорилизации.
- Д. Образуются кетоновые тела.

Задание 5. Выберите правильный ответ: в печени натощак:

- А. Активируется глюконеогенез.
- Б. Усиленно окисляются жирные кислоты.
- В. Активно синтезируется гликоген.
- Г. Образуются кетоновые тела.
- Д. Глюкоза высвобождается в кровь.

Задание 6. Какое из нижеследующих выражений относительно синтеза и использования гликогена правильное?

- А. Действие адреналина и глюкагона направлено на увеличение активности гликогенфосфорилазы.
- Б. В состоянии натощак интенсивность расщепления гликогена соизмерима с интенсивностью его синтеза.
- В. Дефосфорилирование гликогенсингтазы под влиянием инсулина ведет к увеличению активности этого фермента.
- Г. цАМФ — вторичный посредник, который образуется в ответ на действие адреналина и глюкагона в печени.
- Д. Фосфорилирование гликогенфосфорилазы под влиянием глюкагона приводит к увеличению активности этого фермента.

Правильность решений проверьте, сопоставив их с ответами.

ПРОВЕРЬТЕ ВАШИ ЗНАНИЯ (САМОКОНТРОЛЬ УСВОЕНИЯ ТЕМЫ)

Задание 1. Для предотвращения развития гипербилирубинемии у новорожденного вследствие несовпадения у матери и ребенка резус-фактора беременной перед родами рекомендован фенобарбитал. Выберите ответ, объясняющий, с какой целью в данном случае был назначен этот препарат:

- А. В качестве снотворного средства.
- Б. Для инактивации компонентов микросомного окисления.
- В. Для снижения растворимости билирубина.
- Г. Как индуктора печеночных ферментов детоксикации.
- Д. В качестве липотропного средства.

Задание 2. При лабораторном обследовании больного желтухой получены следующие данные: общее содержание в сыворотке крови билирубина — 60 мкмоль/л, прямого билиру-

бина — 43 мкмоль/л, в моче определяется прямой билирубин и отсутствуют уробилин и стеркобилин. Какой вид желтухи у данного больного?

- А. Паренхиматозная. Б. Гемолитическая. В. Обтурационная.

Задание 3. Для оценки функционального состояния печени у больного исследована экскреция животного индикана. Индикан образуется в результате обезвреживания в печени индоксила — продукта гниения аминокислоты триптофана в толстом кишечнике. Какое вещество участвует в обезвреживании этого токсического соединения?

- А. ФАФС. Г. Церулоплазмин.
Б. УДФ-глюкуроновая кислота. Д. Таурин.
В. Глицин.

Задание 4. Методом дифференциального центрифугирования клеток печени была получена микросомная фракция. Микросомное окисление — это способ обезвреживания токсических веществ в печени. Выберите компонент этой цепи окисления:

- А. Цитохром аз. Г. Цитохром р450.
Б. Цитохром с. Д. Цитохром с1.
В. Цитохром б.

Задание 5. В моче больного обнаружены в большом количестве аминолевулиновая кислота, порфобилиноген и порфирины. Моча при длительном освещении приобрела темно-красный винный цвет. Какую патологию можно предположить в данном случае?

- А. Печеночная желтуха. Г. Печеночная порфирия.
Б. Обтурационная желтуха. Д. Талассемия.
В. Гемолитическая желтуха.

Задание 6. Больному с жировой инфильтрацией печени назначена растительно-молочная диета. Дефицит каких липотропных веществ восполняют рекомендованные продукты?

- А. Ненасыщенных жирных кислот. Г. Метионина.
Б. Насыщенных жирных кислот. Д. Серотонина.
В. Креатина. Е. Кальцитонина.

Задание 7. Укажите верные выражения:

- А. При максимальном мышечном напряжении пируват восстанавливается в лактат.
Б. В норме в мышцах некоторое количество глюкозы подвергается анаэробному гликолизу, поэтому всегда имеется некоторое количество лактата, используемого для глюконеогенеза.
В. Для глюконеогенеза из лактата требуется больше АТФ, чем образуется во время анаэробного гликолиза.

Задание 8. Каковы последствия увеличения количества свободных жирных кислот в печени?

- А. Увеличится интенсивность β -окисления.
Б. Увеличится интенсивность гликолиза.
В. Снизится активность пируватдегидрогеназы.
Г. Снизится интенсивность синтеза жирных кислот.
Д. Увеличится интенсивность образования кетоновых тел.

Задание 9. Укажите правильное выражение:

- А. β -Гидроксибутират является важным метаболическим источником энергии для эритроцитов в состоянии натощак.

Б. Ацетоацетат является важным метаболическим источником энергии для клеток мозга в состоянии натощак.

В. Кетоновые тела являются важным источником энергии для скелетных мышц в состоянии натощак.

Г. Кетоновые тела являются основным источником энергии для печени в состоянии натощак.

Д. Кетоновые тела являются важным субстратом для глюконеогенеза в состоянии натощак.

Задание 10. Подберите соответствующие пары:

10.1. Через 12 часов голодания:

- | | |
|-----------|--|
| 1 Печень. | A. Использует глюкозу в качестве источника энергии. |
| 2. Мышцы. | B. Использует кетоновые тела в качестве источника энергии. |
| 3. Мозг. | C. Использует жирные кислоты в качестве источника энергии. |
| 4. Почки. | D. Активирует ферменты глюконеогенеза. |

10.2. Через трое суток голодания:

- | | |
|-----------|--|
| 1 Печень. | A. Использует глюкозу в качестве источника энергии. |
| 2. Мышцы. | B. Использует кетоновые тела в качестве источника энергии. |
| 3. Мозг. | C. Использует жирные кислоты в качестве источника энергии. |
| 4. Почки. | D. Активирует ферменты глюконеогенеза. |

10.3. Через две недели голодания:

- | | |
|-----------|--|
| 1 Печень. | A. Использует глюкозу в качестве источника энергии. |
| 2. Мышцы. | B. Использует кетоновые тела в качестве источника энергии. |
| 3. Мозг. | C. Использует жирные кислоты в качестве источника энергии. |
| 4. Почки. | D. Активирует ферменты глюконеогенеза. |

Ответы к решению заданий

Для самопроверки исходного уровня знаний:

1.1 — В; 1.2 — А. 2 — Б. 3. 3.1 — В, Г; 3.2 — А, Б. 4 — А. 5 — Б. 6 — Д.

Для самостоятельной работы:

1.5 — пируват + НАДН⁻ ↔ лактат + НАД⁺. При приеме алкоголя отмечается гипоглюкоземия, потому что в этих условиях в клетках печени снижается концентрация пирувата, что приводит к снижению скорости глюконеогенеза, являющегося важным источником глюкозы крови.

1.7 — А, Б, В, Г, Е, З. 2.1 — Б; 2.2 — А. 3.3 — Д; 3.4 — Б. 4 — А, Б, В.
5 — А, Б, Г, Д. 6 — А, В, Г, Д.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА (60 минут)

Работа 1. Исследование коллоидустойчивости белков сыворотки крови.


Проба Вельтмана в модификации Тейля.

Принцип метода. Реакция основана на том, что белки сыворотки крови при добавлении раствора хлористого кальция определенной концентрации и последующем нагревании выпадают в виде хлопьев в осадок (происходит нарушение коллоидной устойчивости).

Ход работы. К 4,9 мл воды прибавляют 0,1 мл сыворотки крови, содержимое пробирки перемешивают путем ее опрокидывания (при этом пробирку можно закрывать большим пальцем) и затем приливают 0,1 мл 0,5 % раствора хлористого кальция (из пипетки на 1,0 мл или капельницы, если объем каждой капли соответствует 0,05 мл). Содержимое пробирки встряхивают и нагревают над пламенем спиртовки до однократного вскипания смеси. Затем пробирку охлаждают и смотрят через нее на свет. Если хлопья в пробирке не обнаруживаются, то в нее добавляют еще 0,1 мл СaCl₂ и раствор вновь нагревают до кипения. Процедуру повторяют до выпадения хлопьевидного осадка. Записывают общий объем СaCl₂ (в мл), добавленный в пробирку.

Примечание. Сыворотка для исследования должна быть свежей (хранящейся не более 24 часов от момента взятия), без следов гемолиза.

Клинико-диагностическое значение. Реакция коагуляции с хлористым кальцием (по Вельтману) может изменяться в двух направлениях: в сторону укорочения коагуляционной ленты или ее удлинения (см. схему).



Главные причины, которые ведут к удлинению полосы (коагуляция, наступающая при добавлении менее 0,4 мл CaCl₂), — это фиброзные и пролиферативные процессы, повреждения паренхимы печени и гемолитические состояния. Сдвиг вправо отмечается при болезни Боткина, циррозах, острой желтой атрофии печени, малярии, после переливания крови, аутогемотерапии и при многих воспалительных заболеваниях. Считают, что удлинение коагуляционной полосы обусловлено повышением содержания γ-глобулинов, снижающих стабильность сыворотки.

Укорочение коагуляционной полосы (коагуляция, наступающая при добавлении более 0,6 мл CaCl₂) обнаруживается при острых воспалительных и эксудативных процессах. В этих случаях увеличивается количество α- и β-глобулинов и за счет этого повышается стабильность сыворотки (эксудативная фаза ревматизма, активный процесс туберкулеза легких, нефрозы, макроглобулинемия Вальденштрема, α₂-, β-плазмоцитомы, злокачественные опухоли, эксудативный перитонит, некрозы, большие потери жидкости, острые инфекционные заболевания). Крайнее укорочение коагуляционной ленты (отрицательная проба) наблюдается при остром ревматизме.

Результат: V_{CaCl₂} =

Вывод:

Работа 2. Определение содержания общего билирубина в сыворотке крови.

Принцип метода. Диазореактив образует с растворимым билирубином азобилирубин, окрашенный в розовый цвет. Интенсивность окраски раствора азобилирубина пропорциональна концентрации билирубина и может быть определена колориметрически. Конъюгированный (прямой) билирубин дает прямую реакцию с диазореактивом. Неконъюгированный (непрямой) билирубин можно перевести в растворимое состояние добавлением к сыворотке крови этилового спирта.

Ход работы. В центрифужную пробирку отмеривают 1 мл сыворотки крови, 2 мл этилового спирта, тщательно перемешивают содержимое стеклянной палочкой и центрифугируют 15 мин при скорости 3000 об/мин. Затем сливают надсадочную жидкость в другую пробирку и добавляют к ней 0,25 мл диазореактива. При этом появляется красно-розовое окрашивание, интенсивность которого определяют через 10 минут, измеряя оптическую плотность пробы против воды в кювете шириной 5 мм при зеленом светофильтре (длина волны 500–560 нм). Параллельно колориметрируют стандартный раствор азобилирубина, соответствующий концентрации билирубина 6,84 мкмоль/л (C_{ст}).

Расчет производят по формуле:

$$C_{оп} (\text{мкмоль/л}) = E_{оп} \cdot C_{ст} / E_{ст}.$$

В норме концентрация общего билирубина в плазме (сыворотке) крови составляет 8,55–20,52 мкмоль/л. 75 % его количества приходится на долю непрямого билирубина.

Результат: Еоп =

Ест =

Расчет:

Клинико-диагностическое значение. Один из важных признаков нарушения пигментного обмена — появление желтухи, которое отмечается обычно при уровне билирубина в крови 27–34 мкмоль/л и более. Кровь новорожденных, особенно недоношенных детей, отличается более высоким содержанием билирубина (физиологическая желтуха). Наблюдаемое со 2–3-го до 7–10-го дня жизни увеличение концентрации билирубина, в основном за счет непрямого, связано с функциональной недостаточностью печени, в частности, малой активностью фермента УДФ-глюкуронилтрансферазы, необходимого для образования прямого билирубина.

Гемолитическая желтуха (надпеченочная) — усиление гемолиза эритроцитов, что приводит к усиленному образованию неконъюгированного билирубина, так как печень не успевает его связывать.

Паренхиматозная желтуха (печеночная) — нарушение функции печеночных клеток. Может быть вызвана также наследственно обусловленными дефектами в процессах транспорта билирубина и образования диглюкуронида билирубина.

Механическая желтуха (обтурационная, подпеченочная) — задержка оттока желчи. Возникает при переполнении желчных путей вследствие закупорки, разрыва их и последующего перехода желчи в кровь.

Тяжесть желтухи обычно соответствует уровню билирубинемии. Принято считать, что желтуха протекает в легкой форме, если содержание билирубина в плазме (сыворотке) не превышает 85 мкмоль/л; уровень его 86–169 мкмоль/л свидетельствует о среднетяжелой, а выше 170 мкмоль/л — о тяжелой форме желтухи.

Вывод:

Подпись преподавателя:

ЗАНЯТИЕ 26
КОЛЛОКВИУМ ПО ТЕМАМ «ГОРМОНЫ, БИОХИМИЯ ПЕЧЕНИ»,
«ИНТЕГРАЦИЯ МЕТАБОЛИЗМА»

Вопросы для подготовки к коллоквиуму:

1. Свойства гормонов. Особенности биологического действия. При ответе на вопрос необходимо приводить примеры гормонов, реализующих свое действие через различные рецепторы.
2. Рецепторы к гормонам, классификация, строение рецепторов.
3. G-белки, их виды и роль в механизме действия гормонов, связывающихся с мембранными рецепторами. Патологическое функционирование G-белков.
4. Перечислить эффекторные системы и вторичные посредники проведения гормонального сигнала в клетку. Механизмы образования вторичных посредников.
5. Роль кальция в механизме передачи гормонального сигнала.
6. Растворимая и мембраносвязанная гуанилатциклазы, механизм активации, реализация эффекта.
7. Механизмы усиления гормонального сигнала в клетке.
8. Гормоны — белки: простые и сложные. Место образования, пример молекулярного действия.
9. Гормоны — производные аминокислот. Место образования, механизмы передачи гормонального сигнала в клетке.
10. Общие принципы синтеза гормонов белково-пептидной природы.
11. Общие принципы синтеза гормонов стероидной природы.
12. Вазопрессин, химическая природа, механизмы передачи гормонального сигнала в клетке, эффекты. Несахарный диабет.
13. Гормон роста, receptor somatotropina, механизм передачи гормонального сигнала в клетке, органы-мишени, влияние на метаболизм. Избыток и недостаточность гормона.
14. Йодсодержащие гормоны щитовидной железы. Химическая природа, особенности синтеза, механизм передачи гормонального сигнала в клетке, влияние на метаболизм. Гипотиреоз и гипертиреоз.
15. Глюкагон. Химическая природа, место синтеза, механизм передачи гормонального сигнала в клетке, влияние на метаболизм.
16. Гормоны мозгового вещества надпочечников. Химическая природа, схема синтеза, механизм передачи гормонального сигнала в клетке, влияние на метаболизм. Феохромоцитома.
17. Гормоны коры надпочечников: глюко- и минералокортикоиды. Химическая природа, особенности строения рецепторов, механизм передачи гормонального сигнала в клетке, влияние на метаболизм. Синдромы Кушинга, Конн, болезнь Аддисона («бронзовая болезнь»).
18. Инсулин. Химическая природа, особенности синтеза, строение инсулинового рецептора, механизмы передачи гормонального сигнала. Влияние на метаболизм углеводов, липидов, белков.
19. Половые гормоны, химическая природа, особенности строения рецепторов, механизм передачи сигнала, влияние на метаболизм.
20. Сахарный диабет. Виды, причины. Нарушения обмена углеводов, липидов, белков. Биохимическая диагностика сахарного диабета. Построение сахарных кривых.
21. Сахарный диабет: механизм кетонемии и нарушение реакций гликазилирования. Метabolizm глюкозы в инсулиннезависимых тканях. Восстановительный путь обмена глюкозы, его роль в норме и при сахарном диабете.
22. Печень как главный орган гомеостаза. Функции печени.

23. Роль печени в обмене углеводов. Необходимо знать схемы основных путей обмена углеводов, ключевые ферменты этих процессов и их регуляторы, а также уметь объяснить значение пентозофосфатного и глюкуронового путей метаболизма глюкозы. Механизм развития гиперлактатемии и гипогликемии при алкогольной интоксикации.

24. Роль печени в обмене белков. Необходимо знать реакции превращения аминокислот по аминогруппе, пути образования заменимых аминокислот, способы обезвреживания продуктов гниения белков и амиака. Уметь привести примеры схем включения углеродного скелета аминокислот в цикл Кребса.

25. Роль печени в обмене липидов. Необходимо знать схемы основных путей обмена липидов. Механизмы развития жировой инфильтрации печени (в том числе при алкоголизме). Липотропные факторы.

26. Уметь объяснить центральную роль ацетил-КоА в обмене липидов. Необходимо знать схему образования кетоновых тел и реакции, с которых начинаются синтез жирных кислот и синтез холестерола.

27. Антитоксическая функция печени. Обезвреживание в печени токсичных веществ, нормальных метаболитов, лекарственных препаратов. Уметь привести примеры реакций окисления, конъюгации, синтеза. Необходимо знать схему процесса окисления веществ в системе цитохрома P₄₅₀ и реакции окисления этанола и ацетальдегида в клетках печени.

28. Роль печени в пигментном обмене. Биосинтез гемопротеинов, регуляция. Вспомните белки, содержащие в качестве простетической группы гем, и их функции в организме. Порфирии.

29. Распад гемоглобина в клетках РЭС. Метаболизм желчных пигментов.

30. Желтухи. Причины возникновения, механизмы развития патологических изменений. Лабораторная диагностика.

31. Биохимические методы диагностики заболеваний печени. Какие ферменты являются специфичными для гепатоцитов? Какие из них позволяют судить о глубине поражения органа?

32. Метаболические процессы использования углеводов, жиров и белков в качестве источников энергии (гликолиз, дихотомическое расщепление глюкозы и последующее окисление ПВК, мобилизация жира из депо и β-окисление жирных кислот).

33. Метаболические процессы депонирования углеводов и липидов пищи. Необходимо знать схему синтеза гликогена, схемы ресинтеза и синтеза триацилглицеролов, фосфолипидов. Знать отличие синтеза триацилглицеролов в печени и жировой ткани.

34. Необходимость интеграции метаболизма, ее принципиальные составляющие. Механизмы регуляции метаболизма.

35. Регуляция и направленность метаболических процессов в печени, жировой и мышечной тканях после приема пищи и натощак.

36. Межорганный метаболизм в различные периоды голодаия. Механизм гиперпродукции кетоновых тел.

Вопросы для подготовки к коллоквиуму для студентов МФИУ:

37. Свойства гормонов. Особенности биологического действия. Классификация гормонов. Примеры гормонов, реализующих свое действие через различные рецепторы.

38. Рецепторы к гормонам, классификация, строение рецепторов.

39. G-белки, их виды и роль в механизме действия гормонов, связывающихся с мембранными рецепторами.

40. Эффекторные системы и вторичные посредники проведения гормонального сигнала в клетку. Механизмы образования вторичных посредников. Роль кальция в механизме передачи гормонального сигнала.

41. Растворимая и мембранные гуанилаткиназы, механизм активации, реализация эффекта.
42. Гормоны — белки: простые и сложные. Место образования, пример молекулярного действия.
43. Гормоны — производные аминокислот. Место образования, механизмы передачи гормонального сигнала в клетке.
44. Общие принципы синтеза гормонов белково-пептидной природы.
45. Общие принципы синтеза гормонов стероидной природы.
46. Вазопрессин, химическая природа, механизмы передачи гормонального сигнала в клетке, эффекты. Несахарный диабет.
47. Гормон роста, рецептор соматотропина, механизм передачи гормонального сигнала в клетке, органы-мишени, влияние на метabolизм. Избыток и недостаточность гормона.
48. Йодсодержащие гормоны щитовидной железы. Химическая природа, особенности синтеза, механизм передачи гормонального сигнала в клетке, влияние на метabolизм. Гипотиреоз и гипертиреоз.
49. Глюкагон. Химическая природа, место синтеза, механизм передачи гормонального сигнала в клетке, влияние на метabolизм.
50. Гормоны мозгового вещества надпочечников. Химическая природа, схема синтеза, механизм передачи гормонального сигнала в клетке, влияние на метabolизм. Феохромоцитома.
51. Гормоны коры надпочечников: глюко- и минералокортикоиды. Химическая природа, особенности строения рецепторов, механизм передачи гормонального сигнала в клетке, влияние на метabolизм. Синдромы Кушинга, Конна, болезнь Адисона («бронзовая болезнь»).
52. Инсулин. Химическая природа, особенности синтеза, строение инсулинового рецептора, механизмы передачи гормонального сигнала. Влияние на метabolизм углеводов, липидов, белков.
53. Сахарный диабет. Виды, причины. Нарушения обмена углеводов, липидов, белков. Биохимическая диагностика сахарного диабета. Построение сахарных кривых.
54. Сахарный диабет: механизм кетонемии и нарушение реакций гликазилирования. Метabolизм глюкозы в инсулиннезависимых тканях. Восстановительный путь обмена глюкозы.
55. Половые гормоны, химическая природа, особенности строения рецепторов, механизм передачи сигнала, влияние на метabolизм.
56. Печень как главный орган гомеостаза. Функции печени.
57. Роль печени в обмене углеводов. Необходимо знать схемы основных путей обмена углеводов, ключевые ферменты этих процессов и их регуляторы, а также уметь объяснить значение пентозофосфатного и глюкуронового путей метabolизма глюкозы.
58. Роль печени в обмене белков. Необходимо знать реакции превращения аминокислот по аминогруппе, пути образования заменимых аминокислот, способы обезвреживания продуктов гниения белков и амиака.
59. Роль печени в обмене липидов. Необходимо знать схемы основных путей обмена липидов. Механизмы развития жировой инфильтрации печени (в том числе при алкоголизме). Липотропные факторы.
60. Центральная роль ацетил-КоА в обмене липидов. Схема образования кетоновых тел и реакций, с которых начинаются синтез жирных кислот и синтез холестерола.
61. Антитоксическая функция печени. Обезвреживание в печени токсичных веществ, нормальных метabolитов, лекарственных препаратов. Микросомальное окисление и окисление этанола и ацетальдегида в печени.
62. Роль печени в пигментном обмене. Биосинтез гемопротеинов, регуляция. Белки, содержащие в качестве простетической группы гем, и их функции в организме. Порфирии.
63. Распад гемоглобина. Метabolизм желчных пигментов.

64. Желтухи. Причины возникновения, механизмы развития патологических изменений. Лабораторная диагностика.
65. Биохимические методы диагностики заболеваний печени. Какие ферменты являются специфичными для гепатоцитов?
66. Метаболические процессы использования углеводов, жиров и белков в качестве источников энергии (гликогенолиз, дихотомическое расщепление глюкозы и последующее окисление ПВК, мобилизация жира из депо и β -окисление жирных кислот).
67. Метаболические процессы депонирования углеводов и липидов пищи. Схема синтеза гликогена, схемы ресинтеза и синтеза триацилглицеролов, фосфолипидов. Знать отличие синтеза триацилглицеролов в печени и жировой ткани.
68. Интеграция метаболизма, ее принципиальные составляющие. Механизмы регуляции метаболизма.
69. Регуляция и направленность метаболических процессов в печени, жировой и мышечной тканях после приема пищи и натощак.
70. Межорганный метаболизм в различные периоды голодаия. Механизм гиперпродукции кетоновых тел.

БИОХИМИЯ КРОВИ

ЗАНЯТИЕ 27

БИОХИМИЯ КРОВИ. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КРОВИ. ГЕМОГЛОБИНОЗЫ

Актуальность темы. Химический состав крови в определенной степени отражает состояние обмена веществ в организме. Различные заболевания сопровождаются изменением содержания в крови тех или иных веществ. Биохимический анализ крови проводится с целью диагностики и дифференциальной диагностики заболеваний, установления прогноза болезни и оценки эффективности проводимого лечения. На занятии студенты рассматривают основные показатели биохимического анализа крови, закрепляя знания о происхождении химических компонентов крови. Аномальные гемоглобины — одна из причин гипоксии.

Цель занятия: изучить физико-химические свойства крови, закрепить знания о происхождении компонентов плазмы крови и их физиологических концентрациях, буферных системах крови, строении и функционировании гемоглобина, транспорте газов кровью и механизмах развития гипоксии, диагностическом значении наиболее важных биохимических компонентов крови.

Требования к исходному уровню знаний. Для полного усвоения темы необходимо повторить из:

- общей химии:
- осмотическое и онкотическое давление, рН крови, буферные системы, титрометрические методы анализа;
- биоорганической химии:
- строение и свойства гемоглобина;
- нормальной физиологии:
- гемоглобин (функции, производные и аномальные формы), общий анализ крови;
- ацидоз и алкалоз;
- биологической химии:
- структурная организация белков, классификация белков;
- особенности метаболизма эритроцитов;
- пути использования O_2 в клетках; пути образования CO_2 в клетках

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ ИСХОДНОГО УРОВНЯ ЗНАНИЙ

Задание 1. Недостаточность каких ферментов эритроцитов сопровождается их гемолизом?

А. Глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы.

Б. Пиruваткиназы.

В. Пиruватдегидрогеназы.

Г. Изоцитратдегидрогеназы.

Д. Аргиназы.

Задание 2. В крови новорожденного с четко выраженной синюшностью носогубного треугольника обнаружен повышенный уровень аномального гемоглобина с валентностью железа 3^+ . Как называется этот аномальный гемоглобин?

А. Метгемоглобин.

Б. Карбоксигемоглобин.

В. Оксигемоглобин.

Г. Карбгемоглобин.

Д. Гемоглобин S.

Задание 3. В схеме метаболизма эритроцитов (см. ниже) укажите:


А. Ферменты, обозначенные цифрами 1, 2 и т. д. (варианты ответов: 6-фосфофруктокиназа, гексокиназа, пируваткиназа, альдолаза А, глутатионпероксидаза, глутатионредуктаза, триозофосфатизомераза, глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа, дифосфоглицератмутаза, 6-фосфоглюконатдегидрогеназа, фосфогексоизомераза, фосфоглицераткиназа, глициральдегидфосфатдегидрогеназа, каталаза, супероксиддисмутаза, лактатдегидрогеназа, метгемоглобинредуктаза).

Б. Коферменты, обозначенные буквами А, Б (варианты ответов: НАД⁺, НАДФ⁺).

В. Реакции, обеспечивающие эритроциты АТФ.

Г. Процесс, обеспечивающий эритроциты НАДФН·Н⁺. Д. Ферменты антиоксидантной защиты.

Е. Аллостерический регулятор, снижающий сродство гемоглобина к кислороду.



Метаболизм эритроцитов.

АК — аскорбиновая кислота, дАК — дегидроаскорбиновая кислота,

А, Б — коферменты; АН₂, BH₂ — восстановленные коферменты.

Правильность решений проверьте, сопоставив их с ответами.

Вопросы для обсуждения:

1. Химический состав плазмы крови (физиологические концентрации наиболее важных компонентов плазмы крови и их происхождение). Биохимический анализ крови и его значение в характеристике состояния здоровья человека.
2. Важнейшие буферные системы крови: бикарбонатная, гемоглобиновая, фосфатная, белковая (компоненты и их соотношение, механизм действия, емкость). Представление о нарушениях кислотно-основного состояния (ацидоз, алкалоз).
3. Белки эритроцитов. Строение гемоглобина, гема, глобина; разновидности (нормальные и аномальные) и производные гемоглобина. Гемоглобинозы.
4. Дыхательная функция крови. Эритроциты как главный участник транспорта газов кровью (роль гемоглобина и карбанидразы). Обратимое связывание кислорода и углекислого газа как способ транспортировки (механизмы связывания CO₂ и O₂ с гемоглобином, кооперативное взаимодействие субъединиц гемоглобина, регуляция насыщения гемоглобина кислородом и диссоциации оксигемоглобина (pH, 2,3-дифосфоглицерат, температура)). Гипоксия, формы, механизмы развития.

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ**Основная**

1. *Биологическая химия* / В. К. Кухта [и др.]. Москва : Бином, Минск : Асар, 2008. С. 549–551, 585–598.
2. *Биологическая химия* / А. Д. Таганович [и др.]. Минск : Выш. шк., 2013. С. 376–395, 521–541.
3. Конспект лекций.

Дополнительная

1. *Биохимия человека* : учеб. В 2 т. / Р. Марри [и др.] ; пер. с англ. Москва : Мир, 1993. Т. 1. С. 52–62.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Задание 1. Повторите и запомните биохимические константы крови (см. таблицу):

Некоторые биохимические константы крови

Плотность крови (цельной)	1,05–1,06	
pH	7,37–7,44	
Оsmотическое давление	7,6–8,1 атм	
Онкотическое давление	0,03–0,04 атм	
Глюкоза плазмы (сыворотки)	3,9–6,1 ммоль/л	
Общие липиды	3,5–6,5 г/л	
Триацилглицеролы	0,85–2,0 ммоль/л	
Холестерол	3,9–6,2 ммоль/л	
Общий белок сыворотки	65–85 г/л	
Альбумин	35–50 г/л	
Глобулины	20–35 г/л	
Фибриноген	2–4 г/л	
Остаточный азот плазмы (сыворотки)	14,3–25 ммоль/л	
Мочевина плазмы (сыворотки)	2,5–8,3 ммоль/л	
Аммиак крови	6–65 мкмоль/л	
Мочевая кислота:	мужчины женщины	0,20–0,42 ммоль/л 0,12–0,34
Гемоглобин крови:	мужчины женщины	130–170 г/л 120–150 г/л
Билирубин плазмы (сыворотки): общий прямой непрямой		8,5–20,5 мкмоль/л 2,2–5,1 мкмоль/л 1,7–17,1 мкмоль/л

Na^+ в плазме	130–150 ммоль/л
K^+ в плазме	3,5–5,6 ммоль/л
Ca^{2+} в плазме (общий)	2,2–2,7 ммоль/л

Поясните происхождение химических компонентов крови и их биологическую роль.

Задание 2. Знайте механизм функционирования буферных систем крови. Умейте объяснить механизм сопряжения бикарбонатной и гемоглобиновой буферных систем крови.

Задание 3.

3.1. Какие из приведенных утверждений характеризуют гемоглобин человека?

А. Гемоглобин взрослого человека представляет собой смесь, состоящую из гемоглобина А (96–98 %), гемоглобина А₂ (2–3 %) и гемоглобина F (0,2–1 %).

Б. Гемоглобин А содержит по две цепи α и β .

В. Гемоглобин А₂ содержит по две α - и две δ -цепи.

Г. Гемоглобин F содержит по две цепи α и γ .

Д. Эмбриональный гемоглобин (гемоглобин Р) включает в себя три фракции: гемоглобин Говер I ($\zeta_2\epsilon_2$), гемоглобин Говер II ($\alpha_2\epsilon_2$) и гемоглобин Портленд ($\zeta_2\gamma_2$).

3.2. Какие из следующих утверждений о структуре гемоглобина верны?

А. Молекула основного гемоглобина взрослого человека состоит из двух идентичных α -субъединиц и двух идентичных β -субъединиц.

Б. Субъединица (протомер) гемоглобина состоит из одной полипептидной цепи (глобина) и гема.

В. Гем — это комплекс протопорфирина со связанным в его центре атомом железа.

Г. Железо гемоглобина остается двухвалентным независимо от присоединения или отдачи кислорода.

Д. В молекуле гемоглобина имеются центры для связывания O_2 , CO_2 , протонов (H^+) и 2,3-дифосфоглицерата.

3.3. Какие из следующих утверждений о взаимодействии кислорода и гемоглобина верны?

А. Кислород связывается с молекулой гемоглобина кооперативно.

Б. Кислород связывается с железом гема гемоглобина.

В. Углекислый газ уменьшает сродство гемоглобина к кислороду.

Г. Сродство гемоглобина к кислороду увеличивается при понижении рН и наоборот.

Д. Окись углерода, цианиды конкурируют с кислородом за место связывания в геме гемоглобина.

3.4. Укажите **ошибочное** утверждение о 2,3-дифосфоглицерате (2,3-ДФГК):

А. Преобладающий органический фосфат в эритроцитах.

Б. Промежуточный продукт гликолитического пути.

В. В эритроцитах находится в концентрациях приблизительно эквивалентных гемоглобину.

Г. Молекула гемоглобина связывает четыре молекулы 2,3-ДФГК.

Д. Стабилизирует дезоксиформу гемоглобина, способствуя переходу кислорода в ткани.

Правильность решений проверьте, сопоставив их с ответами.

ПРОВЕРЬТЕ ВАШИ ЗНАНИЯ (САМОКОНТРОЛЬ УСВОЕНИЯ ТЕМЫ)

Задание 1. Определение компонентов какой буферной системы крови используется для диагностики расстройств кислотно-основного состояния ?

- А. Бикарбонатной (гидрокарбонатной).
- Б. Фосфатной.
- В. Гемоглобиновой.
- Г. Оксигемоглобиновой.
- Д. Белковой.

Задание 2. Развитие метгемоглобинемии может быть обусловлено:

- А. Отравлением окислителями (нитриты, нитраты, нитрозосоединения, бромиды и др.).
- Б. Низким парциальным давлением кислорода.
- В. Наследственным дефектом метгемоглобинредуктазы.
- Г. Аномальной формой гемоглобина (M-гемоглобин и др.).
- Д. Высоким парциальным давлением углекислого газа.

Задание 3. α -Талассемия характеризуется:

- А. Нарушением синтеза α -цепи.
- Б. Нарушением синтеза β -цепи.
- В. Усилиением синтеза β - и γ -цепей.
- Г. Появлением в крови гемоглобина H (β_4).
- Д. Появлением в крови гемоглобина Бартса (γ_4).

Задание 4. β -Талассемия характеризуется:

- А. Нарушением синтеза α -цепи.
- Б. Нарушением синтеза β -цепи.
- В. Появлением в крови гемоглобина Кения (содержит γ - и β -цепи наряду с α -цепями).
- Г. Увеличением содержания в крови гемоглобина F ($\alpha_2\gamma_2$).
- Д. Увеличением содержания в крови гемоглобина A₂ ($\alpha_2\delta_2$).

Ответы к решению заданий

Для самопроверки исходного уровня знаний:

1 — А, Б. 2 — А. 3. Б: А — НАДФ⁺, Б — НАД⁺; В: фосфоглицераткиназная (14) и пируваткиназная (15) реакции; Г: пентозофосфатный путь; Д: супероксиддисмутаза, каталаза, глутатионпероксидаза, глутатионредуктаза; Е: 2,3-дифосфоглицерат.

Для самостоятельной работы:

3.1 — А, Б, В, Г, Д; 3.2 — А, Б, В, Г, Д; 3.3 — А, Б, В, Д; 3.4 — Г.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА (60 минут)

Работа 1. Буферные свойства сыворотки крови.

В сыворотке крови функционируют бикарбонатная, белковая и фосфатная буферные системы.

Принцип метода. Титруют 0,1 н раствором НСl 1 мл сыворотки крови (1-я пробирка) и 1 мл воды (2-я пробирка) по индикатору бромфеноловому синему (по 1 капле в каждую пробирку) до желтой окраски. Сравнивают результаты титрования.

Результат: $V_{\text{сыв.}} =$

$V_{\text{H}_2\text{O}} =$

Вывод:

Работа 2. Титрометрический метод определения щелочного запаса крови.

Количество всех оснований крови, в том числе связанных с гемоглобином, обозначается щелочным запасом цельной крови. Эта величина не соответствует резервной щелочности крови, т. е. количеству химически связанной плазмой углекислоты при 40 мм ее напряжения, а всегда значительно превышает ее.

Принцип метода. К цельной крови добавляют заведомо большее количество HCl, которая нейтрализует все щелочные компоненты. Избыток кислоты оттитровывают щелочью, заканчивая титрование в точке эквивалентности при pH = 5,0. Это значение pH соответствует изоэлектрическим точкам основных белков крови — альбумина, глобулина и глобина. В среде, близкой к изоэлектрической точке, белки неустойчивы и легко выпадают в осадок. Поэтому о конце титрования судят по помутнению раствора и выпадению хлопьев белка. Обычно окончание реакции (помутнение) происходит резко с добавлением одной капли щелочи. Щелочной запас крови выражают в миллиэквивалентах щелочи и соответствует количеству связанными основаниями крови HCl в пересчете на один литр крови. Физиологические пределы колебаний щелочного запаса крови — 100–115 мэкв/л.

Ход работы. К 10 мл 0,01н HCl добавляют 0,2 мл крови и тщательно перемешивают. Прозрачный бурый раствор титруют из микробюretки 0,1н NaOH до резко наступающего помутнения. Отмечают количество щелочи, пошедшее на титрование.

Щелочной запас крови рассчитывают по формуле:

$$X \text{ (мэкв/л)} = (1 - V_T) \cdot 0,1 \cdot 1000 / 0,2,$$

где 1 — количество HCl, взятой для анализа и выраженной в 0,1 н концентрации, мл; V_T — объем щелочи, израсходованный на титрование, мл; 0,1 — количество мэкв в 1 мл щелочи; 0,2 — количество крови, взятое для анализа, мл; 1000 — 1 литр крови.

Результат: V_T (мл) =

Расчет:

Вывод:

Работа 3. Количественное определение хлоридов в крови по Левинсону.

Хлор находится в организме в основном в ионизированной форме. Хлорид-ион — главный внеклеточный анион. Анионы хлора — наиболее важные осмотически активные компоненты крови, лимфы, спинномозговой жидкости. Содержание хлора (хлорид-ионов) в сыворотке крови практически здоровых взрослых людей составляет 95–105 ммоль/л. В плазме и сыворотке крови грудных детей концентрация хлорид-ионов в норме равна 80–140 ммоль/л.

Принцип метода. Аргентометрический осадочный метод основан на способности ионов серебра образовывать с ионами хлора нерастворимые соли. Количество осаждающего вещества (AgNO_3) эквивалентно содержанию хлорид-ионов.

Проводят титрование хлорид-ионов крови азотнокислым серебром в присутствии индикатора K_2CrO_4 . По достижении эквивалентной точки титрования избыток ионов серебра образует с индикатором соединение кирпично-красного цвета (Ag_2CrO_4).

Ход работы.

1. Осаждение белков крови.

В двух пробирках готовят смесь растворов: 5 мл 0,45 % ZnSO_4 + 1 мл 0,1н NaOH. Затем в 1-ю пробирку вносят 0,1 мл сыворотки, во 2-ю (контрольную) — 0,1 мл $\text{H}_2\text{O}_{\text{дист}}$. Пробирки нагревают 3 мин над пламенем спиртовки. После этого содержимое пробирок фильтруют в колбочки через вату. Осадок на ватном фильтре промывают два раза водой (по 3 мл).

2. Осаждение ионов хлора в присутствии K_2CrO_4 . К фильтрату приливают 2 капли 1–2% раствора K_2CrO_4 и титруют раствором $AgNO_3$ до изменения желтого цвета раствора в кирпично-красный.

Расчет. Из объема (мл) $AgNO_3$, пошедшего на титрование опытного раствора ($V_{оп}$ (мл)), вычитают объем (мл) $AgNO_3$, пошедший на титрование контроля ($V_{контр}$ (мл)), и разницу умножают на 0,355, если результат выражают в мг хлора на 0,1 мл крови. Для выражения в мг% полученную величину нужно умножить на 1000. Коэффициент пересчета в единицы СИ (ммоль/л) — 0,282.

$$C \text{ (ммоль/л)} = (V_{оп} - V_{контр}) \cdot 0,355 \cdot 1000 \cdot 0,282;$$

Результат: $V_{оп}$ (мл) =

$V_{контр}$ (мл) =

Расчет:

Вывод:

Подпись преподавателя:

ЗАНЯТИЕ 28

БЕЛКИ ПЛАЗМЫ КРОВИ. СИСТЕМА ГЕМОСТАЗА

Актуальность темы. Наряду с определением общего белка плазмы крови важное диагностическое значение имеет выяснение количественных взаимоотношений между отдельными фракциями белков. На занятии студенты знакомятся с электрофоретическим разделением белков сыворотки крови, проводят количественную оценку протеинограмм. Тема «Гемостаз. Система свертывания крови» — традиционно сложная для студентов. Понимание процессов свертывания крови и фибринолиза — основа для дальнейшего изучения вопросов диагностики, лечения, профилактики тромбозов (тромбоэмболий) и геморрагий.

Цель занятия: ознакомиться с принципами исследования белкового состава крови, понять диагностическое значение определения количественного соотношения белковых фракций и отдельных белков плазмы крови; получить представление о механизмах гемостаза и изучить функционирование системы свертывания крови.

Требования к исходному уровню знаний. Для полного усвоения темы необходимо повторить из:

- *общей химии:*
 - титрометрические методы анализа;
- *биоорганической химии:*
 - «цитратная кровь»;
 - *нормальной физиологии:*
 - гемостаз;
 - *биологической химии:*
 - физико-химические свойства белков, методы разделения белков (высаливание, электрофорез), количественное определение белка плазмы крови;
 - ферменты.

Вопросы для самопроверки исходного уровня знаний:

1. Что понимают под гемостазом? Виды гемостаза.
2. Что такое «цитратная кровь»?

Вопросы для обсуждения:

1. Белки плазмы крови. Основные белковые фракции: альбумин, глобулины, фибронген (содержание, функции); альбумин-глобулиновый коэффициент и его диагностическое значение. Биологическая роль и диагностическое значение некоторых белков плазмы крови (гаптоглобин, трансферрин, церулоплазмин, ингибиторы трипсина, С-реактивный белок, интерферон, криоглобулины).

2. Ферменты плазмы крови (секреторные, индикаторные, экскреторные). Диагностическое значение определения активности ферментов плазмы крови.

3. Представление о гемостазе. Определение, структурно-функциональные компоненты, сосудисто-тромбоцитарный и коагуляционный гемостаз. Система свертывания крови (функциональные звенья и их биологическая роль). Представление о нарушениях функционирования системы свертывания крови.

4. Свертывающая система (компоненты и их происхождение), гемокоагуляция (определение, фазы и их продолжительность, источники тромбопластинов). Внешний и внутренний механизмы свертывания крови.

5. Витамин К. Химическая природа, разновидности, природные источники, роль в гемокоагуляции.

6. Антикоагулянтная система, классификация физиологических антикоагулянтов: первичные и вторичные (представители, механизм действия). Представление об искусственных антикоагулянтах прямого и непрямого действия.

7. Фибринолитическая система, механизмы фибринолиза. Плазминовая система. Компоненты и их происхождение, механизм действия.
8. Представление о коагулограмме (ориентировочные тесты).

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ

Основная

1. *Биологическая химия* / В. К. Кухта [и др.]. Москва : Бином, Минск : Асап, 2008. С. 551–585.
2. *Биологическая химия* / А.Д. Таганович [и др.]. Минск : Выш. шк., 2013. С. 395–402, 521–541.
3. Конспект лекций.

Дополнительная

1. *Иванов, Е. П. Руководство по гемостазиологии* / Е. П. Иванов. Минск : Беларусь, 1991. 304 с.
2. *Василькова, Т. В. Молекулярные механизмы гемостаза : учеб. пособие* / Т. В. Василькова. Минск : МГМИ, 1999. 57 с.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ


Задание 1. Назовите индикаторные ферменты крови и поясните их диагностическое значение.

Задание 2.

2.1. Изобразите схему внутреннего пути свертывания крови.

2.2. Запомните активаторы фактора Хагемана.

2.3. На схеме внешнего механизма свертывания крови замените знак вопроса соответствующими факторами:



Внешний механизм свертывания крови

Задание 3. Назовите витамин К-зависимые факторы системы свертывания крови.

Задание 4. Умейте объяснить механизм действия основных физиологических антикоагулянтов.

4.1. Выберите из приведенных физиологических антикоагулянтов:

- | | |
|---------------|--------------------------------------|
| А. Первичные. | 1. Фибрин. |
| Б. Вторичные. | 2. Антитромбин III. |
| | 3. Гепарин. |
| | 4. Протеины С и S. |
| | 5. α_2 -Макроглобулин. |
| | 6. Ингибитор пути тканевого фактора. |
| | 7. Продукты деградации фибрина. |

4.2. Почему у гомозиготных новорожденных с мутацией гена протеина С наблюдается распространенный тромбоз внутренних органов (врожденная молниеносная пурпурा)?

4.3. Почему при бактериальных инфекциях, вызванных некоторыми стрептококками, наблюдаются диффузные кровотечения?

Задание 5. Назовите ориентировочные тесты коагулограммы, характеризующие:

- А. Общее состояние свертывания крови.
- Б. Состояние отдельных фаз гемокоагуляции.
- В. Посткоагуляционную fazу.
- Г. Антикоагулянтную систему.
- Д. Систему фибринолиза.

Правильность решений проверьте, сопоставив их с ответами.

ПРОВЕРЬТЕ ВАШИ ЗНАНИЯ (САМОКОНТРОЛЬ УСВОЕНИЯ ТЕМЫ)

Задание 1. Альбумины плазмы крови характеризуются:

- А. Хорошей растворимостью в воде.
- Б. Молекулярной массой около 70000 Да.
- В. Содержат много дикарбоновых аминокислот.
- Г. Не являются гликопротеинами.
- Д. Содержание в плазме крови в норме составляет 35–50 г/л.

Задание 2. Укажите **ошибочное** утверждение. Альбумины плазмы крови:

- А. Синтезируются в эритроцитах.
- Б. Сравнительно быстро обновляются.
- В. Играют важную роль в создании онкотического давления.
- Г. Выполняют роль белкового резерва организма.
- Д. Осуществляют транспорт метаболитов (жирных кислот, билирубина, альдостерона, Ca^{2+}) и лекарственных веществ (антибиотиков, сульфаниламидов, салицилатов, барбитуратов, сердечных гликозидов и др.).

Задание 3. Глобулины плазмы крови характеризуются:

- А. Большинство глобулинов — гликопротеины.
- Б. Имеют большую молекулярную массу в сравнении с альбуминами.
- В. Многие глобулины — сравнительно гидрофобные белки.
- Г. Выпадают в осадок только в насыщенном растворе $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$.
- Д. Физиологические концентрации глобулинов в плазме крови — 20–35 г/л.

Задание 4. Укажите **верные** утверждения. Глобулины плазмы крови:

- А. Принимают участие в создании гуморального иммунитета.
- Б. Осуществляют транспорт органических веществ (метаболитов, гормонов, витаминов).

В. Осуществляют транспорт катионов (Cu^{2+} , Fe^{3+} , Mg^{2+} и др.).

Г. Являются ингибиторами протеолитических ферментов.

Д. Играют ведущую роль в создании онкотического давления.

Задание 5. Какие функции выполняют приведенные ниже глобулины крови?

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. Церулоплазмин. | А. Участвует в транспорте железа (Fe^{3+}) по кровеносному руслу. |
| 2. Трансферрин. | Б. Ведущая роль в транспорте меди к тканям. |
| 3. α_2 -Макроглобулин. | В. Обладает оксидазной активностью. |
| 4. Гемоглобин. | Г. Связывает и транспортирует свободный гемоглобин плазмы в клетки ретикулоэндотелия. |
| | Д. Ингибитирует протеолитические ферменты крови (трипсин, химотрипсин, тромбин, плазмин, калликреин). |

Задание 6. Какие из приведенных утверждений характеризуют С-реактивный белок?

А. Даёт преципитат с С-полисахаридом пневмококка.

Б. Состоит из 6 субъединиц с молекулярной массой 23000 Да каждая.

В. Постоянно в малых количествах содержится в крови практически здоровых людей.

Г. Концентрация в плазме крови при воспалении или некрозе тканей может увеличиваться в 20–25 раз.

Д. Является парапротеином.

Задание 7. В процессе тромбообразования различают внешний и внутренний пути свертывания крови. На каком этапе свертывания крови они **не** совпадают?

А. Превращение протромбина в тромбин.

Б. Превращение фибриногена в фибрин.

В. Образование протромбиназы (активного тромбопластина крови).

Г. Ретракция кровяного тромба.

Д. Превращение плазминогена в плазмин.

Задание 8. Какое из приведенных утверждений **не** характерно для фактора Хагемана?

А. Является сериновой протеазой.

Б. Активируется калликреином.

В. Активируется при контакте крови с чужеродной поверхностью (стекло, каолин).

Г. Активируется тромбоцитарным тромбопластином.

Д. Активируется тканевым тромбопластином.

Задание 9. Расположите в правильном порядке события, происходящие при образовании фибринового сгустка:

А. Стабилизация полимера фибрина (образование фибрина I).

Б. Отщепление от фибриногена фибринопептидов А и В.

В. Ретракция сгустка.

Г. Образование фибрина S.

Задание 10. Наблюдаемая при наследственной недостаточности фактора XIII повышенная кровоточивость объясняется невозможностью образования стабильного фибринового сгустка. Какова роль плазменной трансглутаминазы (фибриназы) в образовании гемостатического тромба?

А. Участие в синтезе фибриногена в печени.

Б. Участие в образовании фибрин-мономера.

В. Участие в образовании растворимых фибрин-мономерных комплексов.

Г. Участие в ковалентной сшивке фибриновых молекул.

Д. Участие в ретракции гемостатического тромба.

Задание 11. Гиповитаминоз К сопровождается повышенной кровоточивостью. Какова роль витамина К в гемокоагуляции?

- А. Необходим для активации свертывающей системы после повреждения сосуда.
- Б. Необходим для одновременного активирования свертывающей и противосвертывающей систем.
- В. Участвует в постсинтетическом созревании II, VII, IX и X факторов свертывания крови.
- Г. Участвует в связывании ионов кальция.
- Д. Участвует в синтезе V и VIII факторов свертывания крови.

Задание 12. Выберите правильные утверждения, характеризующие участие ионов кальция (ф. IV) в гемокоагуляции:

- А. Являются вторичными посредниками в действии ряда гормонов.
- Б. Стимулирование процессов перекисного окисления липидов.
- В. Связывание на тромбопластинах кальций-зависимых факторов свертывания крови (ф. IX, ф. X, ф. VII, ф. II).
- Г. Стабилизация структуры тромбопластинов.
- Д. Активирование некоторых факторов свертывания крови.

Задание 13. Дефицит антитромбина III — частая причина тромбозов. Какова антикоагулянтная роль антитромбина III?

- А. Образование необратимого комплекса с гепарином.
- Б. Ингибитирует витамин K-зависимое карбоксилирование остатков глутамата.
- В. Необратимо инактивирует большинство сериновых протеаз свертывающей системы.
- Г. Затрудняет связывание факторов свертывания на тромбопластинах.
- Д. Разрушает V и VIII факторы свертывания крови.

Задание 14. Выберите процессы, определяющие противосвертывающую активность гепарина:

- А. Связывает ионы кальция.
- Б. Активирует антитромбин III.
- В. Образует нестабильные комплексы с некоторыми факторами свертывающей системы, выключая их из процесса гемокоагуляции.
- Г. Осуществляет неферментативный фибринолиз.
- Д. Ингибитирует витамин K-зависимое карбоксилирование остатков глутамата протеинов C и S.

Задание 15. Укажите протеолитические ферменты, при действии которых возможно превращение плазминогена в плазмин:

- А. Тканевый активатор плазминогена.
- Б. Урокиназа.
- В. Протеин C (S).
- Г. α_2 -Антиплазмин.
- Д. α_2 -Макроглобулин.

Задание 16. Расположите в правильном порядке события, происходящие при фибринолизе:

- А. Плазминоген осаждается на фибриновых нитях.
- Б. Тканевый активатор плазминогена активирует плазминоген.
- В. Тканевый активатор плазминогена связывается с фибрином.
- Г. Плазминоген превращается в плазмин.
- Д. Плазмин гидролизует фибрин.

Ответы к решению заданий Для самостоятельной работы:

4.1 А – 2, 3, 4, 5, 6; Б – 1, 7.

5. А — 1) время свертывания крови по Ли-Уайту; 2) время рекальцификации; Б — I фаза: активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ), II фаза: протромбиновый индекс (ПТИ), протромбиновый показатель; III фаза: 1) количество фибриногена; 2) активность фибриназы; В — 1) ретракция тромба; 2) гематокрит тромба; Г — 1) тромбиновое время (ТВ); 2) толерантность плазмы к гепарину; 3) активность антитромбина III; Д — фибринолитическая активность (спонтанный фибринолиз).

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА (80 минут)

Работа 1. Разделение белков сыворотки крови методом электрофореза на ацетилцеллюлозе.

В клинических лабораториях наиболее распространены электрофоретические методы исследования белкового спектра плазмы (сыворотки) крови. Электрофорез белков сыворотки крови — объективный метод при первичной лабораторной диагностике острых и хронических воспалительных заболеваний, злокачественных опухолей, заболеваний печени, белко-дефицитных состояний, моноклональных гаммапатий и дефицита антител.

Разделение белков сыворотки крови на ацетилцеллюлозных плёнках даёт чёткое фракционирование и сокращает время электрофореза до 25–30 минут.


Принцип метода. Метод фракционирования основан на том, что под влиянием постоянного электрического поля белки сыворотки крови, обладающие электрическим зарядом, движутся по смоченной буферным раствором плёнке ацетилцеллюлозы со скоростью, зависящей от величины заряда и молекулярной массы частиц. Вследствие этого белки сыворотки разделяются обычно на 5 основных фракций: альбумин и глобулины α_1 , α_2 , β и γ , содержание которых определяется фотометрически. Относительное содержание белковых фракций в сыворотке крови здорового человека выражается следующими цифрами: альбумин — 53–66 %; глобулины — 29–54 %: α_1 -глобулины — 2–5 %, α_2 -глобулины — 6–12 %, β -глобулины — 8–15 %, γ -глобулины — 11–22 %. Альбумин-глобулиновый коэффициент — отношение количества альбуминов к количеству глобулинов в биологических жидкостях. В крови величина альбумин-глобулинового коэффициента в норме относительно постоянна и равна 1,5–1,7. Снижение альбумин-глобулинового коэффициента, характерное для многих патологических состояний, может быть связано как с увеличением абсолютного количества глобулинов (при острых и хронических воспалительных процессах), так и с уменьшением абсолютного количества альбуминов (при циррозе печени, гепатите и других заболеваниях печени).

1. Электрофоретическое разделение белков сыворотки крови.

Кюветные отделения аппарата для электрофореза заполняют буферным раствором. Полоски ацетилцеллюлозы смачивают буфером и туго натягивают (не должны провисать) в промежутке между кюветными отделениями. Через полоску носителя в течение 5 минут пропускают электрический ток. Отключают электрофоретическую камеру, на поверхность ацетилцеллюлозной плёнки у катода на линию старта наносят сыворотку крови. Прибор включают вновь и проводят электрофоретическое разделение белков.

2. Окраска электрофорограмм.

После отключения прибора плёнки вынимают и сразу помещают их в раствор красителя (амиодчёрный 10 В) на 10–15 минут. Для удаления избытка красителя полоски ацетилцеллюлозы переносят в кювету с 2 % раствором уксусной кислоты. Через 10–15 минут кислоту сливают и полоски заливают чистым раствором уксусной кислоты. В результате такой обработки синие пятна, соответствующие различным фракциям белков, отчетливо видны на прозрачном фоне ацетилцеллюлозной плёнки.




Альбумин α_1 - α_2 - β - γ -глобулины

б



Денситометр



Полоска ацетилцеллюлозы

Электрофореграмма (а) и денситограмма (б) белков сыворотки крови человека на ацетилцеллюлозе


3. Количественная оценка электрофорограмм проводится путем денситометрии или фотометрии соответствующих элюатов.

3.1. Денситометрия электрофорограмм проводится с использованием денситометра. Денситометр — фотометрический прибор, обеспечивающий сканирование электрофорограммы. Целью сканирования является получение денситограммы — графического изображения распределения концентрации красителя вдоль электрофорограммы, представляющую собой серию отдельных пиков, по соотношению площадей которых интегратор и микропроцессорное устройство прибора вычисляют относительное содержание каждой белковой фракции.



Ход работы. Ознакомьтесь с устройством денситометра. Поместите на рабочий стол прибора исследуемую электрофорограмму таким образом, чтобы фракция альбуминов была слева, т. к. прибор производит измерения оптической плотности слева направо.

В программе, управляющей прибором, выберите номер дорожки электрофорограммы. Выберите команду «Сканировать выделенное». Прибор в автоматическом режиме отсканирует выбранную электрофорограмму, определит границы фракций и выдаст их процентное соотношение. В случае необходимости границы фракций можно выставить путем нажатия левой клавишей мышки.



Полученные результаты заносят в таблицу.

Фракция	альбумины	α_1 -глобулины	α_2 -глобулины	β -глобулины	γ -глобулины
Содержание, %					

По соотношению фракций определяют их соответствие норме и производят вычисление альбумин-глобулинового коэффициента по формуле:

$$A/\Gamma = \frac{\text{содержание альбуминов, \%}}{\text{содержание глобулинов (сумма всех глобулиновых фракций), \%}}$$

Расчет: $A/\Gamma =$

Вывод:

3.2. Фотометрия элюатов фракций белка

Ход работы. Полоски ацетилцеллюлозы промокают фильтровальной бумагой, окрашенные белковые фракции вырезают и помещают в соответствующие пронумерованные пробирки с элюирующим раствором (в 5 пробирок наливают из бюретки по 5 мл 0,1 н NaOH). Через 20 минут против воды (контроль) определяют оптическую плотность каждого раствора на фотоэлектрокалориметре (кувета 10 мм, красный светофильтр с $\lambda = 670$ нм). Зная оптические плотности растворов, соответствующие каждой фракции, вычисляют сумму оптических

плотностей всех фракций и рассчитывают относительное содержание белка в каждой фракции, вычисляют альбумин-глобулиновый коэффициент.

$$\text{Относит. содерг. альбумина (\%)} = \frac{\text{Оптич. плотн. элюата альбумина (E)}}{\text{Сумма оптич. плотностей (\Sigma)}} \cdot 100 \, \%$$

Результаты:

	альбумины	α_1 -глобулины	α_2 -глобулины	β -глобулины	γ -глобулины	Σ
E (оптич. плотн.)						
Относит. сод-е, %						

Расчет: A/G =

Вывод:

Работа 2. Определение содержания кальция в плазме крови.

Кальций играет важную роль в осуществлении процессов жизнедеятельности. Он влияет на проницаемость биологических мембран, возбудимость нервов и мышц, участвует в нервно-мышечной проводимости, сокращении и расслаблении мускулатуры (в том числе мышцы сердца), секреторных процессах, формировании кости и хряща; воздействует на обмен веществ в клетках, является важным фактором гемостаза и посредником действия гормонов в клетке.

Количественное определение кальция в плазме крови имеет важное значение для диагностики ряда заболеваний и при наблюдении за ходом лечения.

В норме концентрация общего кальция в плазме крови — 2,2–2,7 ммоль/л.

Принцип метода. Индикатор хромоген черный ЕТ-00 образует с кальцием соединение фиолетового цвета. При титровании трилоном Б (двуухзамещенная натриевая соль этилендиаминотетрауксусной кислоты, образующая прочные комплексы с ионами кальция) такого окрашенного раствора произойдет изменение окраски в синий цвет в эквивалентной точке, соответствующей связыванию трилоном Б всех ионов кальция в растворе.

Ход работы. В колбочку наливают 25 мл H₂O и вносят 1 мл аммиачного буферного раствора. Затем приливают 1 мл исследуемой плазмы крови и 2 капли индикатора хромогена черного. Раствор приобретает фиолетовый цвет. Затем раствор титруют 0,002 М раствором

$$X \text{ (ммоль/л)} = \frac{0,002 \cdot 40,8 \cdot 100 \cdot V_t}{1} * 0,245$$

трилона Б до синей окраски. По объему трилона Б, пошедшего на титрование, рассчитывают содержание кальция в плазме крови.

где 0,002 — молярность раствора трилона Б; 40,8 — молекулярный вес Ca; 100 — коэффициент для пересчета в мг%; 1 — объем сыворотки, взятый для анализа; V_t — объем трилона Б, израсходованный на титрование. 0,245 - коэффициент пересчета в единицы СИ (ммоль/л).

Результат: V_t =

Расчет: X (ммоль/л) =

Вывод:

Подпись преподавателя:

БИОХИМИЯ ПИТАНИЯ

ЗАНЯТИЕ 29

БИОХИМИЯ ПИТАНИЯ. БИОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ БЕЛКОВ, ЖИРОВ, УГЛЕВОДОВ, ВИТАМИНОВ

Актуальность темы. Использование пищи живыми организмами обозначается термином «питание». Различают три важнейших категории или составных компонента пищи:

- 1) питательные вещества — источники энергии и пластического материала (белки, липиды, углеводы);
- 2) микрокомпоненты пищи — витамины и минеральные соединения, необходимые для биохимических процессов;
- 3) волокнистые структуры — неперевариваемые полисахариды, необходимые для нормального функционирования пищеварительной системы.

Осуществление теми или иными компонентами пищи, в том числе незаменимыми факторами питания, своих функций в организме происходит через биохимические превращения. Понимание того, каким образом различные компоненты пищи вовлекаются в них, поможет осмыслить необходимость и суть сбалансированного питания, своевременно распознавать и активно действовать при столе распространенном в клинической практике состоянии недостаточного питания. Дефицит любого витамина ведет к появлению специфических нарушений реакций обмена с характерными клиническими проявлениями. Знание коферментных функций витаминов в организме позволяет понять механизмы развития и профилактики гипо- и авитаминозов и использовать витамины с профилактической и лечебной целью.

Цель занятия: закрепить знания по химической структуре и молекулярным механизмам биологического действия коферментных форм витаминов, вовлечению в метаболизм других незаменимых факторов питания; сформировать представление о биохимических механизмах использования компонентов пищи для поддержания нормальной жизнедеятельности организма, о патологических состояниях недостаточного питания; познакомить студентов с методами обнаружения витаминов и количественного их определения в продуктах питания.

Требования к исходному уровню знаний. Для полного усвоения темы необходимо повторить из:

- *биоорганической химии:*
 - строение и свойства гетероциклических соединений — пиридина, пиримидина, пиррола, тиазола, порфирина, параамиnobензойной кислоты, никотиновой кислоты;
 - биологически активные гетерофункциональные соединения бензольного и гетероциклического рядов, метаболиты и биорегуляторы;
- *биохимии:*
 - коферменты и их роль в процессах метаболизма;
 - коферментные формы водорастворимых витаминов и их участие в метаболизме;
 - пути катаболизма белков, жиров, углеводов в клетках.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ ИСХОДНОГО УРОВНЯ ЗНАНИЙ

Задание 1. Укажите правильное(ые) выражение(я) относительно панкреатических ферментов:

- А. Все они секретируются в виде неактивных проферментов.
- Б. Все они секретируются ацинарными клетками.
- В. Все они секретируются в ответ на холецистокинин.
- Г. Для оптимальной активности им требуется pH около 7.
- Д. Они важны только для переваривания белков.

Задание 2. Укажите правильное(ые) выражение(я):

А. Действие адреналина и глюкагона направлено на увеличение уровня гликогенфосфорилазы.

Б. Интенсивность расщепления гликогена в состоянии натощак равна интенсивности его синтеза.

В. Дефосфорилирование гликогенсинтазы в ответ на действие инсулина приводит к увеличению её активности.

Г. цАМФ — это вторичный посредник, который образуется в ответ на действие адреналина и глюкагона в печени.

Д. Фосфорилирование гликогенфосфорилазы в ответ на действие глюкагона увеличивает её активность.

Задание 3. Какова функция гормон-чувствительной липазы в жировой ткани?

А. Гидролизует гормон, который участвует в расщеплении жира.

Б. Синтезирует новые жировые клетки из простых жирных кислот.

В. Гидролизует триацилглицеролы с образованием жирных кислот для других клеток.

Д. Синтезирует длинноцепочечные жирные кислоты для синтеза липидов в других клетках.

Задание 4. Какую роль играет генетический фактор в перспективе достижения определенного веса тела? Что такое ген Ob и какую роль ему отводят в развитии ожирения у человека? Какие аргументы можно привести в пользу того, что этот ген связан с контролем веса?

Задание 5. Лабораторный анализ после гидролиза вещества выявил в гидролизате аденин, рибозу и фосфорную кислоту. Какова структура исходного вещества?

А. Пептид. Б. Нуклеозид. В. Мононуклеотид. Г. Пентозофосфат. Д. Олигосахарид.

Задание 6. Вспомните, что витамины принимают участие в процессах метаболизма после их активации в клетках, т. е. превращения в коферментную форму.

6.1. Объясните, чем руководствовался врач, заменив больному нейродермитом пиридоксин на пиридоксальфосфат.

6.2. Подберите соответствующие пары витамин – кофермент:

- | | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| 1. НАД ⁺ . | А. Производное пиридоксина. |
| 2. ТПФ. | Б. Производное рибофлавина. |
| 3. HS-КоА. | В. Производное тиамина. |
| 4. ФАД. | Г. Производное никотиновой кислоты. |
| 5. ПФ. | Д. Производное пантотеновой кислоты. |

Правильность решений проверьте, сопоставив их с ответами.

Вопросы для обсуждения:

1. Пищевая ценность белков, жиров, углеводов. Роль волокнистых полисахаридов для работы пищеварительного тракта и обменных процессов в организме. Незаменимые факторы питания.

2. Энергия — потребность, происхождение и расходование в организме.

3. Синдром недостаточного питания — причины развития и характерные проявления квашиоркора и маразма.

4. Химическая природа, коферментные формы, молекулярные механизмы действия и роль в процессах метаболизма водорастворимых витаминов: тиамина (B₁); рибофлавина (B₂); пантотеновой кислоты; ниацина (РР); пиридоксина (B₆); фолиевой кислоты (B₉); кобаламина (B₁₂); биотина (Н); аскорбиновой кислоты (С).

5. Химическая природа, механизмы действия и роль в процессах метаболизма жирорастворимых витаминов А, Е, D, К.

6. Витаминоподобные вещества: биофлавоноиды (вит. Р), холин, липоевая кислота, парааминобензойная кислота, витамин U, карнитин, инозитол, пангамовая кислота.

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ

Основная

1. *Биологическая химия* / В. К. Кухта [и др.]. Москва : Бином, Минск : Асар, 2008. С. 87–131.
2. *Биологическая химия* / А. Д. Таганович [и др.]. Минск : Выш. шк., 2013. С. 332–358.
3. Конспект лекций.

Дополнительная

4. *Биохимия человека* / Р. Мари [и др.]. Москва : Мир, 1993.
5. *Морозкина, Т. С. Витамины : краткое руководство для врачей и студентов медицинских, фармакологических и биологических специальностей* / Т. С. Морозкина, А. Г. Мойсеенок. Минск : Асар, 2002.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Задание 1. Запомните суточную потребность человека в витаминах, существенное снижение которой неизбежно приводит к нарушению биохимических процессов и развитию заболеваний. Назовите признаки гиповитаминозов.

1.1. Как было установлено, синдром Вернике–Корсакова, проявляющийся нарушением тонуса мышц конечностей, снижением умственной способности и дезориентацией, связан с нарушением прочной связи апофермента и кофермента в ферменте транскетолазе. Симптомы этого синдрома могут проявляться у алкоголиков вследствие снижения поступления в организм витамина. Назовите этот витамин и его коферментные формы. С какими ферментами кроме транскетолазы работает этот витамин?

Задание 2. Запомните энергозатраты организма взрослого человека в состоянии покоя и лабильность этого показателя в условиях патологии. Объясните, куда используется АТФ в состоянии покоя. Запомните реальный и желательный вклад в энергопродукцию белков, жиров и углеводов.

2.1. Как поступает организм с образовавшимся избытком аминокислот, когда Вы потребляете с пищей или в виде пищевых добавок большее их количество, чем требуется для синтеза новых белков? Отличаются ли механизмы использования избытка аминокислот от механизмов использования избытка углеводов или липидов? Укажите эти различия.

2.2. Источниками энергии для организма человека в состоянии покоя являются:

- А. Реально — углеводы 60 %.
- Б. Желательно — алкоголь 3 %.
- В. Реально — белок 15 %.
- Г. Желательно — жир 40 %.
- Д. Реально — алкоголь 0 %.

Задание 3. Синдром недостаточного питания проявляется в двух клинических формах: квашиоркоре и маразме. Умейте указать сходство и принципиальные различия между ними.

3.1. У больного после операции резекции тощей кишки, которая была произведена для удаления опухоли, в течение нескольких недель развилась гипоальбуминемия и отечность тканей. При осмотре больной не выглядел истощенным, но была заметна бледность кожных покровов. Какую патологию позволяют заподозрить врачу эти симптомы? Какой подход можно было бы предложить для преодоления этого состояния у пациента?

Задание 4. Запомните: наряду с незаменимыми факторами питания имеются условно незаменимые, которые не ограничиваются только аминокислотами аргинином и гистидином; они могут стать незаменимыми при определенных состояниях организма. Объясните, почему при выборе пищевых источников незаменимых жирных кислот необходимо различать омега-3 и омега-6 кислоты. Обратите внимание на преимущества и недостатки неперевариваемых полисахаридов в составе пищи.

Правильность решений проверьте, сопоставив их с ответами.

ПРОВЕРЬТЕ ВАШИ ЗНАНИЯ (САМОКОНТРОЛЬ УСВОЕНИЯ ТЕМЫ)

Задание 1. Данные врачебного осмотра пожилой женщины соответствовали периферической нейропатии. Лабораторные анализы подтвердили недостаточность тиамина. Активность каких процессов снижена при данном гиповитаминозе?

- А. Трансаминирование аминокислот.
- Б. Декарбоксилирование аминокислот.
- В. Окислительное декарбоксилирование α -кетокислот.
- Г. Трансметилирование аминокислот.
- Д. Окислительное дезаминирование аминокислот.

Задание 2. У больного после перенесенного инфаркта в течение двух суток значительно увеличилась активность аспартатаминотрансферазы в крови. Укажите кофермент данного фермента и тип катализируемой им реакции. Производным какого витамина является этот кофермент?

Задание 3. При недостатке фолиевой кислоты страдает прежде всего кроветворение и деятельность желудочно-кишечного тракта. Какие соединения входят в состав B_9 ? В реакциях какого типа участвует коферментная форма (назовите ее) этого витамина?

Задание 4. Гиповитаминоз пантотеновой кислоты практически не встречается, т. к. она обнаружена повсеместно: в тканях животных, растений, микроорганизмов. Укажите кофермент данного витамина, назовите тип реакций, в которых он участвует. Изобразите схематически строение коферментной формы пантотеновой кислоты:

Задание 5. У мужчины, в течение многих лет злоупотреблявшего алкоголем, появились воспаления слизистой оболочки языка, губ, помутнение хрусталика, общая мышечная слабость. В анализе крови установлено значительное снижение активности глутатион-редуктазы эритроцитов. Активность фермента выросла после добавления в пробу рибофлавина. Какой кофермент входит в состав глутатион-редуктазы эритроцитов?

- А. ТПФ.
- Б. ФАД.
- В. НАД⁺.
- Г. ТГФК.
- Д. ПФ.

Задание 6. Больному сделана операция резекции желудка, после чего вследствие недостаточности витамина B_{12} у него развилась анемия. Назовите коферментные формы этого витамина. В каких реакциях они принимают участие?

Задание 7. К врачу обратился пациент с жалобами на воспалительные процессы кожи (дерматит), сопровождающиеся усиленной деятельностью сальных желез, выпадением волос — типичными признаками недостаточности витамина Н. Объясните, какие реакции обмена нарушаются при этом.

Задание 8. Какие из нижеперечисленных продуктов питания содержат много эйко-пентаеновой и докозагексаеновой кислот?

- А. Креветки.
- Б. Семга.
- В. Грудное молоко человека.
- Г. Соевое масло.

Задание 9. Каким образом растворимые волокна в составе принимаемой пищи помогают снизить уровень холестерола в крови?

- А. Денатурируют холестерол в желудке.
- Б. Гидролизуют холестерол в кишечнике.
- В. Задерживают холестерол в кишечнике и таким образом замедляют его всасывание.
- Г. Усиливают экскрецию желчи, ускоряя обмен холестерола.

Задание 10. Какой источник энергии обеспечивает 90 % глюкозы, необходимой в качестве топлива в течение первых нескольких дней голодания?

- А. Белок.
- Б. Кетоновые тела.
- В. Гликоген.
- Г. Триацилглицеролы.

Ответы к решению заданий

Для самопроверки исходного уровня знаний:

1 — А, В, Г. 2 — В, Г, Д. 3 — В. 5 — В. 6.2. 1 — Г; 2 — В; 3 — Д ; 4 — Б; 5 — А.

Для самостоятельной работы:

1.1 — В₁, его коферментные формы ТМФ, ТДФ (ТПФ), ТТФ.

2.2 — В. 3.1 — Квашиоркор.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА (60 минут)

Работа 1. Качественные реакции на витамины.

Для обнаружения витаминов и определения их количества в различных веществах и биологических жидкостях существуют реакции, основанные на цветных реакциях, характерных для той или иной группировки, входящей в витамин.

1. Качественные реакции на витамин В₁. Витамин В₁ состоит из пиримидинового и тиазольного колец. Витамин В₁ получил название тиамина поскольку содержит серу и азот.

Реакция окисления. В щелочной среде тиамин окисляется феррицианидом калия в тиохром, раствор которого флюoresцирует синим цветом при облучении ультрафиолетовыми лучами.

Ход работы. В пробирку вносят 1 каплю 5 % раствора тиамина, прибавляют 5–10 капель 10 % раствора NaOH, 1–2 капли 5 % раствора феррицианида калия, взбалтывают полученную смесь. Ставят пробирку в штатив предварительно прогретого флюороскопа и наблюдают синюю флюoresценцию.

Диазореакция. В щелочной среде тиамин с диазореактивом образует сложное комплексное соединение оранжевого цвета.

Ход работы. К диазореактиву, содержащему 5 капель 1 % раствора сульфаниловой кислоты и 5 капель 5 % раствора нитрита натрия, добавляют 1–2 капли 5 % раствора тиамина и затем по стенке, наклонив пробирку, осторожно добавляют 5–7 капель 10 % раствора бикарбоната натрия. На границе двух жидкостей появляется кольцо оранжевого цвета.

Результат:

Выводы:

2. Качественная реакция на витамин В₂.

Принцип метода. Окисленная форма витамина В₂ представляет собой желтое флюoresцирующее в ультрафиолетовых лучах вещество. Реакция на витамин В₂ основана на его способности легко восстанавливаться. При этом раствор витамина В₂, обладающий желтой окраской, приобретает сначала розовый цвет за счет образования промежуточных соединений, а затем обесцвечивается, т. к. восстановленная форма витамина В₂ бесцветна.

Ход работы. В пробирку наливают 10 капель раствора витамина В₂, добавляют 5 капель концентрированной соляной кислоты и опускают зернышко металлического цинка. Начинается выделение пузырьков водорода, жидкость постепенно розовеет, затем обесцвечивается. Сравнивают обе формы витамина В₂ (окисленную и восстановленную) по флюoresценции.

Результат:

Вывод:

3. Качественная реакция на витамин PP.

Принцип метода. Витамин PP при нагревании с раствором ацетата меди образует плохо растворимый синий осадок медной соли никотиновой кислоты.

Ход работы. Наливают в пробирку 20 капель 3 % раствора витамина PP (перед определением раствор обязательно следует взболтать) и нагревают до кипения; при этом мутный раствор становится прозрачным. Взболтав 5 % раствор ацетата меди, приливают 20 капель его к нагретому раствору витамина PP. Содержимое пробирки доводят до кипения и сразу охлаждают под струей холодной воды. На дне пробирки выпадает синий осадок медной соли никотиновой кислоты.

Результат:

Вывод:

4. Качественная реакция на витамин B₆.

Принцип метода. Витамин B₆ при взаимодействии с раствором хлорного железа образует комплексную соль типа фенолята железа красного цвета.

Ход работы. К 5 каплям 1 % раствора витамина B₆ приливают равное количество 1 % раствора хлорного железа и перемешивают. Развивается красное окрашивание.

Результат:

Вывод:

5. Качественная реакция на витамин B₁₂. B₁₂ — единственный витамин, содержащий в своей структуре металл (cobальт).

Принцип метода. При взаимодействии ионов кобальта с тиомочевиной при нагревании образуется роданид кобальта зеленого цвета.

Ход работы. На бумажный фильтр наносят 2–3 капли раствора тиомочевины и высушивают над пламенем спиртовки. После этого наносят на фильтр 1–2 капли минерализата (B₁₂) и снова нагревают фильтр над спиртовкой. На фильтре, чаще по краю, появляется зеленое окрашивание, свидетельствующее о наличии кобальта.

Результат:

Вывод:

Работа 2. Количественное определение витамина С

Принцип метода. Метод основан на способности витамина С восстанавливать 2,6-дихлорфенолиндофенол, который в кислой среде имеет красную окраску, а при восстановлении обесцвечивается; в щелочной среде окраска синяя. Для предохранения витамина С от разрушения исследуемый раствор титруют в кислой среде щелочным раствором 2,6-дихлорфенолиндофенолом до появления розового окрашивания.

1. Определение содержания витамина С в картофеле.

Ход работы. Отвешивают 1 г картофеля и растирают его в ступке с 2 мл 10 % раствора соляной кислоты (чтобы картофель не темнел), постепенно приливая 8 мл дистиллированной

воды. Полученный гомогенат фильтруют через марлю в стаканчик, и фильтрат титруют 0,001 н раствором 2,6-дихлорфенолиндофенола до розовой окраски, сохраняющейся в течение 30 с.

Для расчета содержания аскорбиновой кислоты в таких продуктах, как капуста, картофель, хвоя, шиповник и др., используют формулу:

$$X = (0,088 \cdot A \cdot 100) / B,$$

где X — содержание аскорбиновой кислоты в миллиграммах на 100 г продукта; 0,088 — количество аскорбиновой кислоты, мг, соответствующее 1 мл 2,6-дихлорфенолиндофенола; А — результат титрования 0,001н раствором 2,6-дихлорфенолиндофенола, мл; В — количество продукта, взятое для анализа, г; 100 — пересчет на 100 г продукта.

В 100 г картофеля обычно содержится 1–5 мг витамина С.

Результат: А =

Расчет:

Вывод:

2. Определение содержания витамина С в моче.

Определение содержания витамина С в моче дает представление о запасах этого витамина в организме, так как имеется соответствие между концентрацией витамина в крови и количеством этого витамина, выделяемым с мочой. Однако при гиповитаминозе С содержание аскорбиновой кислоты в моче не всегда понижено. Часто оно бывает нормальным, несмотря на большой недостаток этого витамина в тканях и органах.

У здоровых людей введение *per os* 100 мг витамина С быстро приводит к повышению его концентрации в крови и в моче. При гиповитаминозе С ткани, испытывающие недостаток в витамине, задерживают принятый витамин С и его концентрация в моче не повышается. Моча здорового человека содержит 20–30 мг/сутки витамина С или 113,55–170,33 мкмоль/сут. Уровень этого витамина понижается при цинге, а также при острых и хронических инфекционных заболеваниях.

Ход работы. В стаканчик или колбочку отмеривают 10 мл мочи и 10 мл дистиллированной воды, перемешивают, подкисляют 20 каплями 10 % раствора соляной кислоты и титруют 0,001 н раствором 2,6-дихлорфенолиндофенола до розовой окраски. Для расчета содержания аскорбиновой кислоты в моче используют формулу:

$$x = \frac{0,088 \cdot A \cdot B}{B},$$

где x — содержание аскорбиновой кислоты в мг/сут; 0,088 — количество аскорбиновой кислоты (мг) соответствующее 1 мл 2,6-дихлорфенолиндофенола; А — результат титрования 0,001 н раствором 2,6-дихлорфенолиндофенола, мл; Б — объем мочи, взятый для титрования, мл; В — среднее суточное количество мочи (для мужчин 1500 мл, для женщин 1200 мл).

Коэффициент пересчета в единицы СИ (мкмоль/сут) — 5,7.

Результат: А =

Расчет:

Вывод:

Подпись преподавателя:

ЗАНЯТИЕ 30

БИОХИМИЯ ПИТАНИЯ. МИНЕРАЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА. РЕГУЛЯЦИЯ ВОДНО-ЭЛЕКТРОЛИТНОГО БАЛАНСА

Актуальность темы. Изменение состава минеральных веществ, нарушение распределения электролитов и жидкости в организме являются причиной многих серьёзных нарушений, коррекцией которых чаще всего занимаются реаниматологи.

Цель занятия: закрепить знания электролитного состава жидкостей организма, роли микро- и макроэлементов в клетках и внеклеточной жидкости для последующего использования их во врачебной деятельности.

Требования к исходному уровню знаний. Для полного усвоения темы необходимо повторить из:

- *общей химии:*
 - понятия «осмотическое давление», «осмоляльность», «гипотоническое и гипертоническое изменение объёма», «рН», «буферные системы»;
 - *биоорганической химии:*
 - кетоновые тела, альбумины, глобулины;
 - *нормальной физиологии:*
 - распределение воды в организме, аквапорины;
 - состав интерстициальной (межклеточной) и клеточной жидкостей организма;
 - механизм действия Na^+/K^+ -АТФазы;
 - *биологической химии:*
 - ферменты, гормоны, механизмы регуляции активности ферментов.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ ИСХОДНОГО УРОВНЯ ЗНАНИЙ


Задание 1. В обычных условиях неизбежная суточная потеря воды взрослым человеком составляет около 2500 мл. Укажите, сколько воды теряется:

- а) с выдыхаемым воздухом; б) с мочой; в) через кожу в виде пота?

Задание 2. Что произойдет при помещении эритроцитов в гипотоническую среду?

- A. Они не изменятся.
B. Наступит их сморщивание.
V. Произойдёт гемолиз.

Задание 3. Кетоновые тела (АН) являются более сильными кислотами, чем угольная кислота. В какую сторону сместится равновесие реакции?



Задание 4. У больного появились отёки. Каковы возможные причины?

- A. Нарушение белоксинтезирующей функции печени.
B. Сгущение крови.
V. Протеинурия.
G. Недостаток вазопрессина.

Правильность решений проверьте, сопоставив их с ответами.

Вопросы для обсуждения:

1. Нормы потребления воды, поступление и выведение воды. Распределение и роль воды в организме.
2. Кальций, фосфор. Роль в метаболизме, гормональная регуляция их обмена.
3. Натрий, калий, хлор, магний, сера. Роль этих макроэлементов в метаболизме.
4. Обмен железа в организме (всасывание, транспорт, внутриклеточный обмен). Биологическая роль железа. Железодефицитные состояния и железодефицитные анемии. Депонирование железа. Проявления избытка железа в организме

5. Роль меди, цинка, селена, йода, фтора, марганца, кобальта в метаболизме тканей.
6. Механизм действия гормонов, регулирующих водно-минеральный обмен (вазопрессина, натрий-уретического гормона, альдостерона).
7. Ренин-ангиотензиновая система и её роль в регуляции водно-солевого обмена.

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ

Основная

1. *Биологическая химия* / В. К. Кухта [и др.]. Москва : Бином, Минск : Асап, 2008. С. 515–549.
2. *Биологическая химия* / А. Д. Таганович [и др.]. Минск : Выш. шк., 2013. С. 359–375.
3. Конспект лекций.

Дополнительная

1. Уайт, А. Основы биохимии / А. Уайт, Ф. Хендлер. Москва : Мир, 1981. Т. 3. С. 1307–1314.
2. Николаев, А. Я. Биологическая химия / А. Я. Николаев. Москва : Медицинское информационное агентство, 2004. С. 399–411.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Задание 1. Запомните физиологические концентрации основных катионов:

Катионы	Плазма	Эритроциты
Калий	3,5–5,5 ммоль/л	80–113 ммоль/л
Натрий: взрослые	130–150 ммоль/л	13,5–21,8 ммоль/л
дети	130–145 ммоль/л	

Содержание общего кальция в сыворотке крови — 2,2–2,7 ммоль/л, ионизированного кальция в сыворотке — 1,1–1,3 ммоль/л.

Задание 2. Все минеральные вещества в зависимости от их концентрации в организме подразделяются на макро- и микроэлементы. Минеральные вещества, содержание которых превышает 50 мг/кг массы тела, относятся к макроэлементам. Перечислите эти элементы.

Задание 3. В состав каких хромопротеинов входит железо?

- А. Цитохрома Р450.
- Б. I и II комплексов дыхательной цепи.
- В. III и IV комплексов дыхательной цепи.
- Г. Церулоплазмина.
- Д. Миоглобина.

Задание 4. Муковисцидоз — наследственное заболевание, характеризующееся поражением желез внешней секреции, клинически проявляется сгущением слизи в выводных протоках (главным образом, поджелудочной железы и бронхов). Этиология болезни — генетический дефект CFTR (перевод: кистозно-фиброзный транспортёр-регулятор), т. е. хлорного канала. Предложите способ лечения этого заболевания (на основании материала лекции).

Задание 5. После назначения препаратов селена в крови у пациента:

- А. Снизилось содержание продуктов ПОЛ.
- Б. Увеличилось содержание продуктов ПОЛ.
- В. Увеличилась активность глутатионпероксидазы эритроцитов.
- Г. Снизилась активность глутатионпероксидазы эритроцитов.

Задание 6. Запомните: в случае снижения объёма крови включаются два механизма:

- 1) раздражаются рецепторы гипоталамуса, что приводит к активации синтеза вазопрессина;
- 2) раздражаются рецепторы юкстагломерулярного аппарата почек, что сопровождается выбросом в кровоток ренина.

Используя приведенную схему, изучите основные эффекты гормонов и ренина:



Правильность решений проверьте, сопоставив их с ответами.

ПРОВЕРЬТЕ ВАШИ ЗНАНИЯ (САМОКОНТРОЛЬ УСВОЕНИЯ ТЕМЫ)

Задание 1. У больного нефритом развились отёки. Что может служить их основной причиной?

- А. Уменьшение содержания в крови альбуминов.
- Б. Уменьшение содержания в крови глобулинов.
- В. Увеличение содержания в крови белков острой фазы.
- Г. Снижение концентрации глюкозы в плазме крови.
- Д. Снижение концентрации натрия в плазме.

Задание 2. Объясните, почему и недостаток, и избыточное поступление витамина **D** в организм будет приводить к деструкции костной ткани.

Задание 3. Назовите минеральные вещества, выполняющие следующие функции:

- А. Поддержка электролитного баланса.
- Б. Поддержка определённого осмотического давления.
- В. Создание благоприятных условий для растворения белков клеток крови.
- Г. Участие в механизмах возбудимости.
- Д. Влияние на обменные процессы путём активирования или ингибирования ферментов.
- Е. Минерализация костей скелета и зубов.

Задание 4. Во время тиреоидэктомии хирург не заметил расположенных в толще щитовидной железы паращитовидных желёз. У больного начались судороги. Почему?

- А. В результате падения содержания в крови тиреокальцитонина.
- Б. В результате снижения содержания в крови паратирина.
- В. Вследствие снижения содержания Ca^{++} в плазме крови.
- Г. Вследствие увеличения содержания Ca^{++} в плазме крови.

Задание 5. Отёк головного мозга — опасное осложнение травм черепа. Он может также развиться при неправильной тактике лечения кровопотери (из-за избытка введенной в организм жидкости). Нарушение функции каких классов аквапоринов при этом отмечается?

- А. Аквапоринов AQ P₁ и AQ P₄.
- Б. Акваглицеропоринов.
- В. Аквапоринов AQ P₂.

Ответы к решению заданий

Для самопроверки исходного уровня знаний:

- 1 — а) 300–400 мл; б) 1200–1500 мл; в) 500–600 мл.
- 2 — В. 3 — вправо. 4 — А, В.

Для самостоятельной работы:

- 2 — Na, K, Ca, Mg, P, Cl, S. 3 — А, В, Д. 4 — генная инженерия. 5 — А, В.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА (60 минут)

Работа 1. Определение содержания натрия в сыворотке крови фотометрическим методом.

Принцип метода. Метод основан на том, что содержащийся в образце натрий осаждается уранилацетатом магния. Уранил-анионы, оставшиеся в растворе, способны образовывать окрашенный комплекс с тиогликолятом. Концентрация натрия прямо пропорциональна разности между холостой (без преципитации) и опытной пробами.

Ход работы. Берут 2 центрифужные пробирки. В первую пробирку (опытная пробы) отмеривают 1,0 мл реагента 1 и затем добавляют 0,02 мл сыворотки крови. Во вторую пробирку (стандартная пробы) вносят 1,0 мл реагента 1 + 0,02 мл стандартного раствора.

Необходимо строго соблюдать последовательность внесения реактивов в пробирки (сыворотку добавляют к реагенту)!

Закрывают пробирки и 30 с встрихивают их содержимое. Через 5 мин вновь так же встрихивают и оставляют пробы на 30 мин в темноте. Затем центрифугируют 10 мин (1000 об/мин).

Из каждой центрифужной пробирки отбирают по 0,02 мл надосадочной жидкости в обычные пробирки и добавляют в каждую по 2,0 мл реагента 2. Одновременно готовят холостую пробу (0,02 мл реагента 1 + 2,0 мл реагента 2). Реакционную смесь тщательно перемешивают и инкубируют 5 мин при комнатной температуре. Измеряют оптическую плотность всех проб против воды, используя кюветы 5 мм (фиолетовый светофильтр, длина волны 400 нм).

Расчёт: концентрацию Na^+ (ммоль/л) определяют по формуле:

$$C_{\text{оп}} = \frac{E_{\text{хол}} - E_{\text{оп}}}{E_{\text{хол}} - E_{\text{ст}}} \times C_{\text{ст}}$$

где $E_{\text{хол}}$, $E_{\text{оп}}$ и $E_{\text{ст}}$ — оптическая плотность холостой, опытной и стандартной проб, соответственно; $C_{\text{ст}}$ — концентрация стандартного раствора (150 ммоль/л).

Содержание Na^+ в сыворотке крови в норме составляет 135–150 ммоль/л.

Результат: $E_{\text{оп}} =$

$E_{\text{хол.}} =$

$E_{\text{ст.}} =$

Расчет:

$C_{\text{оп}} =$

Клинико-диагностическое значение. Уменьшение концентрации натрия в сыворотке крови обусловливает клинический симптомокомплекс, характеризующийся появлением апатии, потерей аппетита, тошнотой, рвотой, нарушением рефлексов, тахикардией, падением кровяного давления, психозами.

Гипернатриемия сопровождается тяжёлым общим состоянием больных, повышением температуры тела, тахикардией.

Вывод:

Работа 2. Определение содержания калия в сыворотке крови турбидиметрическим методом.

Принцип метода. Метод основан на способности ионов калия образовывать стабильную суспензию с ионами тетрафенилбората. Мутность суспензии пропорциональна концентрации ионов калия.

Ход работы. Берут три пробирки. В первую пробирку (опытная пробы) наливают 2,0 мл реагента и добавляют 0,04 мл сыворотки крови, во вторую пробирку (стандартная пробы) вносят 2,0 мл реагента + 0,04 мл стандартного раствора, в третью пробирку (холостая пробы) добавляют только реагент (2,0 мл).

Необходимо строго соблюдать последовательность внесения реактивов в пробирки (сыворотку добавляют к реагенту)!

Перемешивают и инкубируют 2 мин. Вновь тщательно перемешивают и инкубируют точно 10 мин при комнатной температуре. Измеряют оптическую плотность опытной пробы ($E_{оп}$) и стандартного раствора ($E_{ст}$) против холостой пробы, используя кюветы 5 мм (желтый светофильтр, длина волны 590 нм). Перед фотометрированием пробы необходимо взболтать.

Расчёт: концентрацию K^+ (ммоль/л) определяют по формуле:

$$C_{оп} = C_{ст} \times E_{оп} / E_{ст}.$$

Содержание K^+ в сыворотке крови в норме составляет 3,4–5,6 ммоль/л.

Результат: $E_{оп} =$

$E_{ст.} =$

Расчет:

$C_{оп} =$

Клинико-диагностическое значение. Уменьшение концентрации калия в сыворотке крови приводит к тяжёлым нарушениям — вплоть до появления вялых параличей. Ухудшаются психическая и умственная деятельность, угнетается перистальтика кишечника, развивается метеоризм, расширяются желудок и мочевой пузырь.

Гиперкалиемия сопровождается ощущением «ползания мурашек», исчезновением сухожильных рефлексов, нарушением функции сердца. При двукратном превышении содержания калия в крови сердце останавливается в фазе диастолы.

Вывод:

Подпись преподавателя:

ЗАНЯТИЕ 31
КОЛЛОКВИУМ ПО ТЕМАМ «БИОХИМИЯ КРОВИ», «БИОХИМИЯ ПИТАНИЯ»,
«ВОДНО-МИНЕРАЛЬНЫЙ ОБМЕН»

Вопросы для подготовки к коллоквиуму:

1. Гемоглобин (структура, молекулярные формы гемоглобина, производные гемоглобина, аномальные формы гемоглобина).
2. Механизмы транспорта кислорода и углекислого газа кровью. Пути использования кислорода в клетках. Виды и причины гипоксии. Метаболические процессы, сопровождающиеся реакциями декарбоксилирования веществ.
3. Буферные системы крови (компоненты, механизм действия, буферная ёмкость, сопряжение). Лактатацидоз, кетоацидоз (условия и механизмы развития).
4. Ферменты плазмы крови: секреторные, экскреторные, индикаторные (примеры ферментов, место их образования). Диагностическое значение индикаторных ферментов плазмы крови.
5. Белки плазмы крови. Основные белковые фракции: альбумин, глобулины, фибриноген (содержание, функции); альбумин-глобулиновый коэффициент и его диагностическое значение. Биологическая роль и диагностическое значение некоторых белков плазмы крови (гаптоглобин, трансферрин, церулоплазмин, α_1 -ингибитор протеаз, С-реактивный белок, интерфероны, криоглобулины).
6. Что понимают под гемостазом? Представление о механизмах гемостаза. Три основных структурно-функциональных компонента гемостаза. Патологические состояния, обусловленные нарушением системы гемостаза?
7. Функциональные звенья системы свёртывания крови и их биологическая роль.
8. Молекулярные механизмы сосудисто-тромбоцитарного гемостаза.
9. Свертывающая система крови (компоненты и их происхождение). Гемокоагуляция (определение, фазы образования коагуляционного тромба и их продолжительность). Внутренний и внешний механизм гемокоагуляции (схемы), общие этапы и отличия. Активаторы фактора Хагемана. Роль тромбоцитов в гемокоагуляции. Физиологические концентрации фибриногена в крови. Схема превращения фибриногена в фибрин. Молекулярные различия фибрина S и I. Физиологические концентрации кальция в крови и его участие в свертывании крови. Витамин K (химическая природа, разновидности, природные источники, роль в гемокоагуляции, викасол). Коагулограмма (определение, краткая характеристика, показатели: время свёртывания крови и концентрация фибриногена).
10. Антикоагулянтная система. Классификация естественных антикоагулянтов. Наиболее значимые естественные антикоагулянты, механизм их действия. Искусственные антикоагулянты (примеры). Механизм действия дикумарола и гепарина.
11. Фибринолитическая система, механизмы фибринолиза. Плазминовая система (компоненты и их происхождение, механизм действия).
12. Витамин B₁ (тиамин), B₂ (рибофлавин), пантотеновая кислота, PP (никотиновая кислота), B₆ (пиридоксин), B₉ (фолиевая кислота), B₁₂ (кобаламин), Н (биотин), С (аскорбиновая кислота). Химическая природа витаминов. Знать коферментные формы и участие в метabolизме, признаки гиповитамина, суточную потребность и пищевые источники. Уметь нарисовать блок-схемы строения коферментных форм витамина PP (НАД и НАДФ) и витамина B₂ (ФМН и ФАД). Антивитамины и их классификация. Оценка обеспеченности организма витаминами. Витаминоподобные вещества: биофлавоноиды (витамин Р), холин, липоевая кислота, парааминобензойная кислота, витамин U, карнитин, инозитол, пангамовая кислота. Представление о структуре, биологическая роль.
13. Токоферол. Химическая природа, участие в метabolизме, признаки гиповитамина, суточная потребность, основные источники витамина Е.
14. Ретинол. Химическая природа, участие в метabolизме, признаки гипо- и гипервитамина, суточная потребность, основные источники витамина А.

15. Витамин К. Химическая природа. Биологическая роль. Признаки гиповитамина. Основные источники и суточная потребность. Викасол. Антивитамины.

16. Витамин D. Химическая природа, источники и суточная потребность. Образование активной формы витамина D₃ в организме. Биологическая роль. Проявления гипо- и гипервитамина.

17. Энергозатраты организма взрослого человека в состоянии покоя в норме и изменения их при патологии. Пути использования АТФ в состоянии покоя. Вклад в энергопродукцию белков, жиров и углеводов.

18. Метаболические процессы использования углеводов, жиров и белков в качестве источников энергии (гликогенолиз, дихотомическое расщепление глюкозы и последующее окисление ПВК, мобилизация жира из депо и β-окисление жирных кислот).

19. Метаболические процессы депонирования углеводов и липидов пищи, кетогенез.

20. Пищевая ценность углеводов, липидов и белков. Незаменимые и условно незаменимые факторы питания. Роль пищевых волокон для работы пищеварительного тракта и обменных процессов в организме.

21. Квашиоркор и маразм — клинические формы синдрома недостаточности питания. Характерные черты, сходство и принципиальные отличия.

22. Нормы потребления воды, поступление и выведение воды. Содержание и роль воды в организме.

23. Кальций, фосфор. Нормы потребления, пищевые источники, роль в метаболизме, нарушения обмена. Гормональная регуляция обмена кальция и фосфора.

24. Натрий, калий, хлор, магний, сера. Нормы потребления, пищевые источники, распределение в организме и роль этих макроэлементов в метаболизме. Na⁺/K⁺-АТФаза. Нарушения обмена, муковисцидоз.

25. Биологическая роль железа. Потребность и нормы потребления железа. Реутилизация железа. Обмен железа в организме (всасывание, транспорт по крови, внутриклеточный обмен). Депонирование железа. Проявления избытка железа в организме. Железодефицитные состояния и железодефицитные анемии.

26. Роль меди, цинка, селена, йода, фтора, марганца, кобальта в метаболизме тканей. Потребность и пищевые источники. Нарушения обмена.

27. Механизм действия гормонов, регулирующих водно-минеральный обмен (вазопрессина, натрийуретических пептидов, альдостерона).

28. Ренин-ангиотензиновая система и её роль в регуляции водно-солевого обмена.

Вопросы для подготовки к коллоквиуму для студентов МФИУ:

1. Гемоглобин (структура, молекулярные формы гемоглобина, производные гемоглобина, аномальные формы гемоглобина).

2. Механизмы транспорта кислорода и углекислого газа кровью. Пути использования кислорода в клетках. Виды и причины гипоксии.

3. Буферные системы крови (компоненты, механизм действия, буферная ёмкость, сопряжение). Лактатацидоз, кетоацидоз (условия и механизмы развития).

4. Ферменты плазмы крови: секреторные, экскреторные, индикаторные (примеры ферментов, место их образования). Диагностическое значение индикаторных ферментов плазмы крови.

5. Белки плазмы крови. Основные белковые фракции: альбумин, глобулины, фибриноген (содержание, функции); альбумин-глобулиновый коэффициент и его диагностическое значение. Биологическая роль и диагностическое значение некоторых белков плазмы крови (гаптоглобин, трансферрин, церулоплазмин, α₁-ингибитор протеаз, С-реактивный белок, интерфероны, криоглобулины).

6. Гемостаз. Механизмы гемостаза. Три основных структурно-функциональных компонента гемостаза. Патологические состояния, обусловленные нарушением системы гемостаза.

7. Молекулярный механизм первичного гемостаза.

8. Свертывающая система крови (компоненты и их происхождение). Гемокоагуляция (определение, фазы образования коагуляционного тромба и их продолжительность). Внутренний и внешний механизм гемокоагуляции (схемы), общие этапы и отличия. Роль тромбоконитов в гемокоагуляции. Физиологические концентрации фибриногена в крови. Схема превращения фибриногена в фибрин. Физиологические концентрации кальция в крови и его участие в свертывании крови. Роль витамина К в свертывании крови.

9. Антикоагулянтная система. Классификация естественных антикоагулянтов. Наиболее значимые естественные антикоагулянты, механизм их действия. Искусственные антикоагулянты (примеры). Механизм действия дикумарола и гепарина.

10. Фибринолитическая система, механизмы фибринолиза. Плазминовая система (компоненты и их происхождение, механизм действия).

11. Витамин В₁ (тиамин), В₂ (рибофлавин), пантотеновая кислота, РР (никотиновая кислота), В₆ (пиридоксин), В₉ (фолиевая кислота), В₁₂ (кобаламин), Н (биотин), С (аскорбиновая кислота). Коферментные формы и участие в метаболизме, признаки гиповитаминоза, суточная потребность и пищевые источники. Блок-схемы строения коферментных форм витамина РР (НАД и НАДФ) и витамина В₂ (ФМН и ФАД).

12. Витаминоподобные вещества: биофлавоноиды (витамин Р), холин, липоевая кислота, парааминобензойная кислота, витамин U, карнитин, инозитол, пангамовая кислота. Биологическая роль.

13. Токоферол. Химическая природа, участие в метаболизме, признаки гиповитаминоза, суточная потребность, основные источники витамина Е.

14. Ретинол. Химическая природа, участие в метаболизме, признаки гипо- и гипервитаминоза, суточная потребность, основные источники витамина А.

15. Витамин К. Химическая природа. Биологическая роль. Признаки гиповитаминоза. Основные источники и суточная потребность. Викасол. Антивитамины.

16. Витамин D. Химическая природа, источники и суточная потребность. Образование активной формы витамина D₃ в организме. Биологическая роль. Проявления гипо- и гипервитаминоза.

17. Пути использования АТФ в состоянии покоя. Вклад в энергопродукцию белков, жиров и углеводов.

18. Метаболические процессы использования углеводов, жиров и белков в качестве источников энергии (гликогенолиз, аэробное окисление глюкозы, мобилизация жира из депо и β-окисление жирных кислот).

19. Метаболические процессы депонирования углеводов и липидов пищи, кетогенез.

20. Пищевая ценность углеводов, липидов и белков. Незаменимые факторы питания. Роль пищевых волокон.

21. Квашиоркор и маразм — клинические формы синдрома недостаточности питания. Характерные черты, сходство и принципиальные отличия.

22. Нормы потребления воды, поступление и выведение воды. Содержание и роль воды в организме.

23. Кальций, фосфор. Нормы потребления, пищевые источники, роль в метаболизме, нарушения обмена. Гормональная регуляция обмена кальция и фосфора.

24. Натрий, калий, хлор, магний, сера. Нормы потребления, пищевые источники, распределение в организме и роль этих макроэлементов в метаболизме.

25. Биологическая роль железа. Потребность. Обмен железа в организме (всасывание, транспорт по крови, внутриклеточный обмен). Депонирование железа. Проявления избытка железа в организме.

26. Роль меди, цинка, селена, йода, фтора, марганца, кобальта в метаболизме тканей. Потребность и пищевые источники. Нарушения обмена.

27. Механизм действия гормонов, регулирующих водно-минеральный обмен (вазопрессина, натрийуретических пептидов, альдостерона).

28. Ренин-ангиотензиновая система и её роль в регуляции водно-солевого обмена.

БИОХИМИЯ МОЧИ

ЗАНЯТИЕ 32 БИОХИМИЯ МОЧИ. ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ МОЧИ

Актуальность темы. Анализ мочи — обязательная составляющая плана обследования больного. На основании анализа мочи диагностируют заболевания почек — как собственно почечную патологию, так и поражение почек и мочевыводящих путей при заболеваниях других органов. Кроме того, на основании анализа мочи можно заподозрить или подтвердить наличие заболеваний печени, сердечной мышцы, поджелудочной железы, диагностировать различные виды желтухи, провести дифференциальную диагностику сахарного и несахарного диабета, определить тип некоторых гормональных нарушений и т. д.

Цель занятия: научиться применять знания о физиологических и патологических компонентах мочи для решения вопросов диагностики, профилактики и прогноза заболеваний, связанных с почечной и внепочечной патологией.

Требования к исходному уровню знаний. Для полного усвоения темы необходимо повторить из:

- нормальной физиологии человека;
- механизм образования мочи почками;
- гистологии;
- строение нефрона.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ ИСХОДНОГО УРОВНЯ ЗНАНИЙ

Задание 1. Под действием гидростатического давления кровь фильтруется через полу-проницаемую мембрану и попадает в пространство капсулы Шумлянского-Боумена — это первичная моча. Каков ее качественный состав?

А. Содержит форменные элементы крови.

Б. Аналогична составу крови, но не содержит белков и форменных элементов.

В. Аналогична составу крови и содержит белки с молекулярной массой до 70 кДа, но отсутствуют форменные элементы.

Г. Состав первичной мочи отличается от состава плазмы крови по всем компонентам.

Задание 2. Каналец нефрона состоит из 3-х отделов: проксимального канальца, петли Генле и дистального канальца. В канальцах первичная моча подвергается реабсорбции. Параллельно осуществляется и секреция определенных веществ. Какое количество глюкозы реабсорбируется в проксимальном канальце здоровой почки?

А. 100 % при нормогликемии.

Б. 50 % при нормогликемии.

В. 100 % при содержании глюкозы в крови > 10 ммоль/л.

Задание 3. В дистальном канальце нефрона наряду с процессами, связанными с разведением и концентрированием мочи, осуществляются реабсорбционные и секреторные процессы, главная задача которых — сохранить кислотно-щелочное состояние организма и, в частности, постоянство pH крови. Какие ионы секрециируются канальцами?

А. K⁺. Б. Na⁺. В. H⁺. Г. NH₄⁺. Д. Cl⁻. Е. HPO₄²⁻.

Правильность решений проверьте, сопоставив их с ответами.

Вопросы для обсуждения:

1. Нормальные показатели объема мочи, ее плотности, цвета, прозрачности. Факторы, обуславливающие изменения показателя кислотности мочи.

2. Неорганические составные части мочи.
3. Органические составные части мочи в норме: мочевина, мочевая кислота, креатинин, аминокислоты, безазотистые органические компоненты мочи, гормоны и их метаболиты.
4. Диагностическое значение определения в моче аминокислот, которыми богаты специализированные белки: гидроксипролина (в коллагене), 3-метилгистидина (в актине и миозине). Определение метаболитов аминокислот для диагностики фенилкетонурии (нарушение обмена фенилаланина), алkaptonурии (нарушение обмена тирозина), гиперпролинурии (нарушение окисления пролина), цитруллинурии (нарушение синтеза мочевины).
5. Диагностическое значение определения патологических составных частей мочи:
 - а) протеинурия почечная и внепочечная; ферменты, определяемые в моче с диагностической целью;
 - б) глюкозурия при сахарном диабете и почечная глюкозурия;
 - в) гематурия почечная и внепочечная, гемоглобинурия;
 - г) кетонурия при голодании, диабете, ацидозах иного происхождения;
 - д) желчные пигменты, определяемые с целью дифференциальной диагностики желтух, порфирины.

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ

Основная

1. Биологическая химия / В. К. Кухта [и др.]. Москва : Бином, Минск : Асар, 2008. С. 599–606.
2. Биологическая химия / А. Д. Таганович [и др.]. Минск : Выш. шк., 2013. С. 541–543.

Дополнительная

1. Чиркин, А. А. Диагностический справочник терапевта / А. А. Чиркин, А. Н. Окороков, И. И. Гончарик. Минск : Беларусь, 1993. С. 369–390.
2. Камышников, В. С. Справочник по клинико-биохимической лабораторной диагностике / В. С. Камышников. Минск : Беларусь, 2000. С. 171–208, 275–347, 358–428.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Задание 1. Чтобы заподозрить у больного сахарный диабет, обратите внимание на объем выделяемой мочи и ее удельный вес. При диабете, несмотря на большую суточную экскрецию мочи, ее удельный вес остается высоким. Для уточнения диагноза необходимо определить содержание глюкозы в моче и сравнить эти данные с результатами определения уровня гликемии.

1.1. Подберите пару симптомов, характерных для диабета:

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| 1. Суточный диурез 6 л. | A. Д мочи = 1,02. |
| 2. Суточный диурез 2 л. | Б. Д мочи = 1,012. |
| 3. Суточный диурез 1 л. | В. Д мочи = 1,05. |
| 4. Суточный диурез 20 л. | Г. Д мочи = 1,5. |

1.2. Подберите пару симптомов, характерных для диабета:

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| 1. Глюкозурия — нет. | A. Гликемия 5,5 ммоль/л. |
| 2. Глюкозурия — 1 %. | Б. Гликемия 15,0 ммоль/л. |
| 3. Глюкозурия — следы. | В. Гликемия 8,0 ммоль/л. |

Задание 2. Для дифференциальной диагностики различного рода желтух изучают цвет мочи и определяют в ней наличие желчных пигментов. Вспомните, каким образом осуществляется распад желчных пигментов, содержание каких соединений увеличивается в крови

и моче, каким образом изменяется цвет стула. Следует помнить, что через почечный фильтр способен проникать связанный билирубин (в отличие от свободного билирубина, не способного преодолевать почечный «фильтр», молекула диглюкуронида билирубина мала).

2.1. Подберите параметры анализа мочи, характерные для механической желтухи:

1. Моча «цвета пива». А. Билирубин.

2. Моча соломенно-желтая. Б. Уробилин (истинный).
3. Моча красного цвета. В. Стеркобилиноген.
4. Светло-желтая моча. Г. Урохром.

Задание 3. Диагностика панкреатита во многом основывается на определении активности ферментов мочи. Вспомните, какие ферменты, способные перейти в мочу, секретирует поджелудочная железа. Назовите фермент, активность которого обязательно определяется в моче при панкреатите:

- А. Фосфорилаза. Г. Пепсин.
Б. Амилаза. Д. Сахараза.
В. Лактатдегидрогеназа.

Правильность решений проверьте, сопоставив их с ответами.

ПРОВЕРЬТЕ СВОИ ЗНАНИЯ (САМОКОНТРОЛЬ УСВОЕНИЯ ТЕМЫ)

Задание 1. В клинику поступил больной с жалобами на обильное и частое мочеиспускание, жажду, которые его беспокоят даже ночью. Суточное количество мочи = 10 л с низкой относительной плотностью. Каков предположительный диагноз?

- А. Сахарный диабет. Г. Болезнь Адисона.
Б. Несахарный диабет. Д. Микседема.
В. Болезнь Иценко–Кушинга.

Задание 2. У больного острым гломерулонефритом суточное количество мочи = 500 мл. Как называется этот симптом?

- А. Анурия. Г. Никтурия.
Б. Полиурия. Д. Изостенурия.
В. Олигурия.

Задание 3. У больного острым гломерулонефритом выявлена макрогематурия. Какой цвет мочи у данного больного?

- А. Красный. Г. Розовый.
Б. Коричневый. Д. Цвета мясных помоев.
В. Черный.

Задание 4. У больного в результате отравления солями свинца в моче появилось много протопорфиринов. Какой цвет мочи у данного больного?

- А. Зеленый. Г. Розовый.
Б. Темно-красный. Д. Цвета мясных помоев.
В. Черный.

Задание 5. У больного инфекционным гепатитом с желтухой в моче выявлено высокое содержание билирубина. Какой цвет мочи у данного больного?

- А. Соломенно-желтый. Г. Розовый.
Б. Коричневый. Д. Цвета мясных помоев.
В. Черный.

Задание 6. У больного хроническим нефритом выявлено нарушение концентрационной функции почек. Как называется это состояние?

- А. Никтурия. Г. Анурия.
Б. Изостенурия. Д. Полиурия.
В. Олигурия.

Задание 7. У больного в моче содержание мочевой кислоты составило 9,5 ммоль/24 ч. Какую патологию можно заподозрить?

- А. Кахексия. Г. Печеночная недостаточность.
Б. Оротатацидурия. Д. Подагра.

В. Почечная недостаточность.

Задание 8. Больному, страдающему хроническим гепатитом, была проведена нагрузка бензоатом натрия. При этом об обезвреживающей функции печени судили на основании обнаружения в моче:

А. Бензойной кислоты.

Г. Гиппуровой кислоты.

Б. Лимонной кислоты.

Д. Щавелевой кислоты.

В. Валериановой кислоты.

Задание 9. Содержание какого из продуктов белкового обмена повысилось в моче у спортсмена с развитой мускулатурой после спортивных соревнований?

А. Мочевой кислоты.

Г. Мочевины.

Б. Креатина.

Д. Аммиака.

В. Креатинина.

Задание 10. Для уточнения диагноза «прогрессирующая мышечная дистрофия» у больного был сделан анализ мочи. Какое соединение при этом будет обнаруживаться в моче?

А. Порфирины.

Г. Миоглобин.

Б. Креатин.

Д. Кальмодулин.

В. Креатинин.

Ответы к решению заданий

Для самопроверки исходного уровня знаний:

1 — В. 2 — А. 3 — А, В, Г.

Для самостоятельной работы:

1.1. 1 — Г; 1.2. 2 — Б. 2.1. 1 — А. 3 — Б.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА (120 мин)

Работа 1. Определение удельного веса (плотности) мочи.

Поскольку отдельные порции мочи отличаются по удельному весу и химическому составу, удельный вес определяют в моче, собранной за сутки. В норме удельный вес мочи коррелирует с количеством «суточной» мочи и составляет 1,010–1,025. При различных состояниях он может колебаться от 1,000 до 1,060.

Ход работы. В цилиндр наливают мочу и осторожно погружают в нее урометр. Отсчет ведется по делению шкалы урометра, соответствующему нижнему мениску жидкости.

Результат:

Работа 2. Определение кислотности мочи.

В норме реакция мочи слабокислая.

Ход работы. На лакмусовую бумажку наносят каплю мочи и определяют ее реакцию:

- 1) синяя лакмусовая бумага краснеет, красная не изменяет цвета — кислая реакция;
- 2) красная бумага синеет, синяя не изменяет цвета — щелочная реакция;
- 3) обе бумаги не изменяют своего цвета — нейтральная реакция.

Можно использовать и другие индикаторные бумаги.

Результат:

Работа 3. Качественное определение неорганических составных частей мочи.

Из минеральных солей более всего с мочой выделяется хлористого натрия — 8–15 г/сут.

3.1. **Определение хлоридов.** Ионы хлора реагируют с азотнокислым серебром с образованием осадка хлористого серебра, не растворяющегося в азотной кислоте.

Ход работы. К 1 мл мочи (20 капель) добавляют 3–5 капель 1 % раствора AgNO_3 и 2 капли 10 % раствора азотной кислоты. Выпадает белый осадок AgCl , темнеющий на свету, нерастворимый в азотной кислоте.

3.2. Определение сульфатов. В кислой среде сульфаты с хлористым барием образуют белый осадок BaSO_4 .

Ход работы. К 20 каплям мочи приливают 5 капель 10 % раствора HCl и по каплям, медленно, добавляют раствор BaCl_2 до образования осадка.

3.3. Определение фосфатов. Фосфаты мочи при реакции с молибденовым реагентом образуют желтый кристаллический осадок фосфорномолибденовокислого аммония.

Ход работы. В пробирку наливают 20–30 капель молибденового реагента и нагревают раствор до закипания (не кипятить). Затем добавляют несколько капель мочи. Выпадает желтый осадок фосфорномолибденовокислого аммония.

3.4. Определение кальция. Кальций мочи выпадает в осадок при добавлении щавелево-кислого аммония.

Ход работы. К 20 каплям мочи приливают 1–2 капли 10 % раствора уксусной кислоты и 2–3 капли 5% раствора щавелевокислого аммония. Выпадает кристаллический осадок щавелевокислого кальция.

Результаты:

Работа 4. Качественное определение органических составных частей мочи.

4.1. Определение белка. В норме в моче определяются следы белка.

4.1.1. Проба Геллера. Под действием азотной кислоты белок образует нерастворимый осадок.

Ход работы. В пробирку осторожно наливают около 1 мл концентрированной HNO_3 и сверху насыпают 1 мл мочи. При наличии в моче белка на границе жидкостей появляется мутное беловатое кольцо.

4.1.2. Осаждение белка сульфосалициловой кислотой. Эта проба является самой чувствительной реакцией на белок.

Ход работы. К 20 каплям мочи добавляют 5 капель 20 % раствора сульфосалициловой кислоты. Выпадает осадок белка (помутнение раствора).

4.2. Определение глюкозы. В норме глюкоза в моче не определяется. Для качественного определения глюкозы в моче пользуются следующими реакциями:

4.2.1. Реакция Троммера. В щелочной среде в присутствии глюкозы при добавлении CuSO_4 образуется желтый осадок гидрата закиси меди или красный осадок закиси меди.

Ход работы. К 5 каплям исследуемой мочи прибавляют 5 капель 10 % раствора NaOH и 5 капель 1 % раствора сернокислой меди. Нагревают.

4.2.2. Реакция Фелинга. Проба основана на том же принципе, что и реакция Троммера. Преимущество этой реакции заключается в том, что сегнетова соль в составе реагента Фелинга связывает избыток гидрата окиси меди, из которого при нагревании образуется окись меди черного цвета, мешающая реакции.

Ход работы. К 20 каплям исследуемой мочи приливают равный объем жидкости Фелинга и нагревают до кипения.

4.2.3. Реакция Ниландера. В реагент Ниландера входит азотнокислый висмут. В щелочной среде образуется гидрат окиси висмута, который, восстанавливаясь в присутствии глюкозы до металлического висмута, окрашивает жидкость в черный цвет.

Ход работы. К 20 каплям исследуемой мочи приливают 10–20 капель реагента Ниландера и кипятят 1–2 мин. Жидкость буреет, затем образуется черный осадок металлического висмута.

4.3. Определение кровяных пигментов. В норме в моче кровяных пигментов нет.

Ход работы. Гвяжовая проба. Гвяжовая смола в присутствии пероксида водорода под влиянием пероксидазы крови восстанавливается в азонид гвяжовой смолы, имеющий синий цвет.

В пробирку наливают 20 капель мочи, 5 капель гвяжевой смолы и несколько капель H_2O_2 . В присутствии крови появляется синее окрашивание.

4.4. Определение кетоновых тел. Кетоновые тела обнаруживаются в моче при диабете, голодании и других ацидотических состояниях. Метод основан на цветной реакции, которую дают кетоновые тела с нитропруссидом натрия.


Ход работы. К 2 каплям мочи добавляют 2 капли 10 % NaOH и 2 капли нитропруссида натрия. Появляется оранжево-красное окрашивание. Добавляют 6 капель концентрированной уксусной кислоты — появляется вишневое окрашивание.

Результаты:

Работа 5. Количественное определение органических составных частей мочи.

5.1. Определение содержания глюкозы в моче ферментативным (глюкозооксидазным) методом. В норме глюкоза в моче присутствует в следовых количествах и обычными методами не определяется.

Принцип метода. Метод основан на следующих ферментативных реакциях:



Образующийся продукт имеет розовую окраску. Интенсивность окраски прямо пропорциональна концентрации глюкозы и измеряется фотометрически.

Схема постановки опыта:

	Опытная проба, мл	Стандартная проба, мл
В центрифужные пробирки вносят:		
Моча	0,1	—
Стандартный раствор глюкозы	—	0,1
Дистиллированная вода	1,0	1,0
Перемешивают		
Полученный раствор отбирают в сухие пробирки	0,2	0,2
Рабочий раствор ферментов	2,0	2,0
Перемешивают и инкубируют реакционную смесь 10 мин при 37 °C или 30 мин при комнатной температуре		

По окончании инкубации измеряют оптическую плотность опытной и стандартной проб на колориметре (длина волны 490–540 нм) в кюветах 5 мм против контроля.

Контрольная проба содержит 0,2 мл воды и 2,0 мл рабочего раствора ферментов. Контрольную пробу можно готовить одну на группу.

Расчет производят по формуле:

$$C_{оп} = E_{оп} \cdot C_{ст} / E_{ст},$$

где $C_{\text{оп}}$ — концентрация глюкозы в моче (ммоль/л); $C_{\text{ст}}$ — концентрация глюкозы в стандартном растворе (5,55 ммоль/л); $E_{\text{оп}}$ — экстинкция опытной пробы; $E_{\text{ст}}$ — экстинкция стандартной пробы.

Проводят расчет суточного выделения глюкозы с мочой (с учетом диуреза 1200–1500 мл).

Результат: $E_{\text{оп}} =$ $E_{\text{ст.}} =$


Расчет:

5.2. Определение концентрации белка в моче.

Принцип метода. Метод основан на способности сульфосалициловой кислоты реагировать с белком, вызывая помутнение, интенсивность которого пропорциональна содержанию белка в моче.

Ход работы. К 1 мл прозрачной мочи добавляют 3 мл 3 % раствора сульфосалициловой кислоты, смесь перемешивают и через 5 мин измеряют оптическую плотность содержимого пробирки на колориметре при красном светофильтре (длина волны 630–650 нм) в кювете шириной 10 мм против контрольной пробы (контрольная пробы: к 1 мл мочи добавляют 3 мл изотонического раствора NaCl). Расчет производят по калибровочному графику. Расчет суточных потерь белка проводят с учетом диуреза (1200–1500 мл).

Калибровочный график для определения содержания общего белка в моче



Результат: $E =$ $C \text{ г/л} =$

Клинико-диагностическое значение. В моче в норме содержатся «следы белка» (альбумин и глобулины, не более 0,15 г/сут). Повышенное содержание белка в моче — **протеинурия** — отражает нарушение баланса между процессами его фильтрации и реабсорбции и отмечается при заболеваниях почек, мочевыводящих путей, усиленном распаде белков тканей. Функциональные почечные протеинурии связаны с увеличением проницаемости почечного фильтра либо замедлением тока крови в клубочках (под влиянием переохлаждения, физического и психического перенапряжения).

Выводы:

Подпись преподавателя:

ЗАНЯТИЕ 33

КОНТРОЛЬ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ БИОХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА. ЦВЕТНЫЕ РЕАКЦИИ НА БЕЛКИ И АМИНОКИСЛОТЫ, КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЛКА В СЫВОРОТКЕ КРОВИ БИУРЕТОВЫМ МЕТОДОМ

Актуальность темы. Качественный и количественный биохимический анализ находит широкое применение в клинических, медико-биологических и санитарно-гигиенических исследованиях. Так, некоторые цветные реакции нашли широкое применение в лабораторной практике для количественного определения белка и аминокислот (биуретовая реакция лежит в основе биуретового метода количественного определения белка, нингидриновая реакция используется на практике для количественного определения аминокислот).

Цель занятия: закрепить приобретенные практические навыки качественного и количественного биохимического анализа; проведением определения содержания белка в сыворотке крови и цветных реакций на белки и аминокислоты проверить умение студентов применять методы количественного и качественного анализа для решения прикладных медицинских аспектов.

Требования к исходному уровню знаний. Для качественного выполнения заданий необходимо вспомнить из:

- *общей химии:*
 - принципы проведения качественных реакций;
- *биоорганической химии:*
 - методы проведения цветных реакций на белки и аминокислоты;
- *медицинской и биологической физики:*
 - устройство и принцип работы колориметра.

Получив индивидуальные контрольные задания, студенты приступают к выполнению лабораторных работ, используя при этом инструкцию и оформляя протокол работы.

Работа 1. Цветные реакции на белки и аминокислоты.

Цветные реакции дают возможность обнаружить присутствие белка в растворах и биологических жидкостях. Эти реакции применяют как для качественного, так и для количественного определения белка и содержащихся в нем аминокислот. Некоторые реакции присущи не только белкам, но и другим веществам, например, фенол, подобно тирозину, дает розово-красное окрашивание с реагентом Миллона, поэтому недостаточно проведения одной какой-либо реакции для установления наличия белка в исследуемом растворе.

Существует два типа цветных реакций: 1) универсальные — биуретовая (на все белки) и нингидриновая (на все α -аминокислоты и белки); 2) специфические — только на определенные аминокислоты как в молекуле белка, так и в растворах аминокислот, например, реакция Фоля (на аминокислоты, содержащие слабосвязанную серу), реакция Сакагучи (на аргинин) и др.

После оформления протокола исследования своей контрольной задачи с использованием цветных реакций на основании полученных результатов студент делает выбор из следующих вариантов ответов:

- 1) раствор яичного белка (содержит ароматические, алифатические и серусодержащие аминокислоты);
- 2) раствор желатина (желатин — денатурированный коллаген, не содержит ароматических аминокислот);
- 3) раствор ароматических α -аминокислот;
- 4) раствор алифатических α -аминокислот.

Результат:

	Результаты (цвет исследуемого раствора)	Выводы
Биуретовая реакция		
Нингидриновая реакция		
Ксантопротеиновая реакция		
Реакция Миллона		
Реакция Фоля		

Вывод:**Работа 2. Количественное определение белка в сыворотке крови биуретовым методом.**

Принцип метода. Метод основан на образовании окрашенного в фиолетовый цвет комплекса пептидных связей белка с ионами двухвалентной меди (сульфата меди) в щелочной среде. Интенсивность окраски раствора прямо пропорциональна концентрации белка в сыворотке и определяется фотометрически.

Порядок выполнения работы. Каждый студент получает пробирку, содержащую 0,1 мл исследуемой сыворотки (опытная пробы). Во вторую пробирку вносят 0,1 мл стандартного раствора белка с концентрацией 100 г/л (стандартная пробы). В третью пробирку отмеривают 0,1 мл 0,9 % раствора хлорида натрия (контрольная пробы, которую можно сделать одну на всю группу). Во все пробирки приливают по 5 мл биуретового реагента. Содержимое пробирок осторожно перемешивают, избегая образования пены, и через 30 мин фотометрируют опытную и стандартную пробы в кюветах 10 мм при зеленом светофильтре (длина волны — 540 нм) против контрольного раствора. Определив экстинкцию проб, рассчитывают концентрацию белка (г/л) в исследуемой сыворотке по формуле:

$$C_{\text{оп}} (\text{г/л}) = (E_{\text{оп}}/E_{\text{ст}}) \cdot C_{\text{ст}},$$

где $C_{\text{оп}}$ — концентрация белка в исследуемой сыворотке; $C_{\text{ст}}$ — концентрация стандартного раствора белка (100 г/л); $E_{\text{оп}}$ — оптическая плотность опытной пробы; $E_{\text{ст}}$ — оптическая плотность стандартной пробы.

Результат: $E_{\text{оп}} =$ $E_{\text{ст.}} =$ **Расчет:****Вывод:****Подпись преподавателя:**

Название реакции	Принцип реакции	Краткий ход работы	Примечания
Биуретовая реакция (Пиотровского)	Данная реакция открывает пептидную связь в белке. Обусловлена образованием в щелочной среде биуретового комплекса в результате соединения меди с пептидной группировкой белка. При этом раствор приобретает фиолетовый цвет	К 5 каплям исследуемого раствора прибавляют 5 капель 10 % раствора NaOH, 2 капли 1 % раствора сульфата меди. Содержимое пробирки перемешивают	Биуретовую реацию дают вещества, содержащие не менее двух пептидных связей
Нингидриновая реакция	Аминокислоты, полипептиды и белки при кипячении с водным раствором нингидрина дают синее или сине-фиолетовое окрашивание. В результате взаимодействия α -аминокислоты с нингидрином образуется шиффово основание, которое перегруппировывается, декарбоксилируется и расщепляется на альдегид и аминодикетогидринден	К 5 каплям исследуемого раствора добавляют 5 капель 0,5 % водного раствора нингидрина и кипятят 1–2 мин. Отмечают появление окраски	Характерна для аминогрупп в α -положении, входящих в состав белков, полипептидов и свободных аминокислот
Ксантопротеиновая реакция (Мульдера)	При обработке растворов белка или аминокислот концентрированной азотной кислотой появляется желтое окрашивание. Ароматические аминокислоты при взаимодействии с концентрированной HNO_3 образуют нитросоединения, окрашенные в желтый цвет	К 5 каплям исследуемого раствора добавляют 3 капли конц. азотной кислоты и осторожно кипятят	Положительная реакция Мульдера доказывает присутствие в растворе ароматических аминокислот (три, фен, тир)
Реакция на тирозин (Миллона)	Тирозин при взаимодействии с реагентом Миллона и при кипячении образует кроваво-красное соединение ртутной соли динитротирозина благодаря наличию у тирозина фенольного ядра	К 5 каплям исследуемого раствора приливают 3 капли раствора Миллона и нагревают (осторожно!)	Соединения, имеющие в своем составе фенольное ядро, также дают положительную реакцию Миллона
Реакция Фоля	Сульфгидрильные группы ($-SH$) в белке или в пептиде подвергаются щелочному гидролизу, в результате чего происходит отщепление серы в виде сульфида свинца, который с плюмбитом дает черный или бурый нерастворимый осадок сульфида свинца PbS	К 5 каплям исследуемого раствора добавляют 5 кап. реагента Фоля. Кипятят и дают постоять 1–2 мин	Положительна только с аминокислотами, которые содержат слабосвязанную серу (цистеин)

ЗАНЯТИЕ 34

КОНТРОЛЬ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ БИОХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА. АНАЛИЗ ЖЕЛУДОЧНОГО СОКА И МОЧИ

Актуальность темы. В процессе изучения биологической химии студенты приобрели начальные знания и практические навыки качественного и количественного биохимического анализа, который находит широкое применение в лабораторной диагностике, например, анализы желудочного сока и мочи. В дальнейшем, в ходе изучения клинических дисциплин, будет осуществляться расширение и закрепление знаний по биохимической лабораторной диагностике.

Цель занятия: проверить:

- 1) навыки студентов в проведении качественного и количественного анализа биологических жидкостей;
- 2) умение ориентироваться в результатах анализа и давать им правильную оценку;
- 3) понимание происхождения и диагностического значения патологических компонентов анализируемых биологических жидкостей.

Требования к исходному уровню знаний. Для качественного выполнения задания необходимо вспомнить из:

- *общей химии*:
- основы качественного и количественного анализа;
- *биологической химии*:
- физико-химические свойства и состав желудочного сока в норме и патологии;
- физико-химические свойства и состав мочи в норме и патологии.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА (135 мин)

Работы выполняются по индивидуальным заданиям.

Работа 1. Определение кислотности желудочного сока.

В исследуемой пробе желудочного сока определяют содержание свободной и связанной соляной кислоты, а также общую кислотность, используя методики занятия № 17. Полученный результат выражают в ммоль/л.

Результат:

	Свободная HCl	Связанная HCl	Общая кислотность
Желудочный сок №	$A_1 =$ $X \text{ (ммоль/л)} =$	$A_2 =$ $A_2 - A_1 =$ $X \text{ (ммоль/л)} =$	$A_3 =$ $X \text{ (ммоль/л)} =$

Вывод:

Работа 2. Определение патологических примесей в моче.

В исследуемой пробе мочи с помощью качественных реакций выявляют наличие патологических примесей (глюкозы, кетоновых тел, белка и эритроцитов). Если в моче присутствуют глюкоза или белок, проводят количественное определение этих веществ. Для исследования мочи используют методики, описанные в занятии № 32.

Результат:

Качественные реакции	Количественное определение		
Белок:	Белок:	$E_{оп.} =$	$C_{оп.} =$
Глюкоза:	Глюкоза:	$E_{оп.} =$	$E_{ст.} =$
Кетоновые тела:			
Кровь:		$C_{оп.} =$	

Вывод:

Подпись преподавателя:

ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ ПО БИОЛОГИЧЕСКОЙ ХИМИИ

ПЕРВЫЕ ВОПРОСЫ

1. Аминокислоты. Строение, классификация, свойства, применение как лекарственных препаратов.
2. История развития представлений о структуре белков. Теория Фишера. Принципы классификации белков. Сходства и отличия белков и пептидов. Биологическая роль пептидов.
3. Физико-химические свойства белков. Растворимость белков в воде. Факторы устойчивости белковых растворов. Общие реакции на белки: цветные и осаждения. Использование этих реакций в медицинской практике.
4. Методы разделения белков, пептидов и аминокислот (электрофорез; распределительная хроматография). Использование вестерн-блот анализа для идентификации белков.
5. Этапы исследования первичной структуры белков и пептидов. Методы очистки, разделения и определения молекулярной массы белков и пептидов (диализ, гель-хроматография, гель-электрофорез, изоэлектрофокусирование, аффинная хроматография).
6. Методы исследования аминокислотного состава (ионообменная хроматография) и аминокислотной последовательности белков и пептидов (Сэнджер, Эдман, Акабори, секвениатор Эдмана–Бэга). Сравнительный анализ гомологичных белков.
7. Первичная и вторичная структура белковой молекулы. Связи, стабилизирующие их. Особенности строения пептидной связи и их роль в формировании пространственной структуры белка (постулаты Полинга–Кори). Виды вторичной структуры.
8. Понятие о надвторичной структуре белка. Структурные и функциональные домены. Причины формирования третичной структуры белковой молекулы.
9. Третичная структура белка. Силы, стабилизирующие третичную структуру. Конформационные изменения при функционировании белков. Денатурация белка и факторы, ее вызывающие. Использование явления денатурации в медицинской практике.
10. Четвертичная структура белков. Преимущества существования белков с четвертичной структурой. Кооперативные изменения конформации полипептидных цепей при функционировании белков с четвертичной структурой на примере гемоглобина. Сравнительные особенности транспорта кислорода гемоглобином и миоглобином.
11. Белок-лигандное взаимодействие. Сложные белки. Типы связей между белковой и небелковой частями молекулы. Функции сложных белков в организме.
12. Мононуклеотиды, их строение и роль в клетке. Роль циклических нуклеотидов. Первичная структура нукleinовых кислот. Особенности строения, функции и распределения в клетке ДНК и РНК. Метод анализа первичной структуры ДНК (Сэнджер).
13. Вторичная структура ДНК и РНК. Виды РНК и их функции. Взаимодействие нукleinовых кислот с белками. Строение нуклеопротеинов. Особенности строения хромосом и рибосом.
14. Блот-анализ ДНК (Саузерн-блот) и метод «отпечатков пальцев» ДНК. Основные этапы и применение в медицинской практике.
15. Липиды, классификация липидов. Функции ацилглицеролов, фосфо- и гликолипидов в организме.
16. Сложные липиды. Представители. Строение, полярность, биологическая роль.
17. Жирные кислоты, классификация и номенклатура. Полиненасыщенные жирные кислоты. Происхождение и биологическая роль эйкозаноидов.

18. Углеводы. Классификация. Биологическая роль отдельных групп углеводов (моносахаридов, дисахаридов, гомо- и гетерополисахаридов).
19. Роль ферментов в процессах жизнедеятельности. Принципы номенклатуры и классификации ферментов. Единицы активности.
20. Химическая природа и общие свойства ферментов.
21. Коферменты, классификация и роль.
22. Механизм действия ферментов и ферментативная кинетика. Уравнения Михаэлиса–Ментен и Лайнувера–Бэрка.
23. Изоферменты, их молекулярные разновидности, значение в клетке.
24. Понятие об активном и аллостерическом центрах ферментов. Роль пространственной структурной организации в их формировании.
25. История развития учения о витаминах. Общая характеристика и классификация витаминов, гипер-, гипо- и авитаминозы. Антивитамины. Оценка обеспеченности организма витаминами.
26. Витамины группы А. Провитамины (каротины). Биологическая роль. Всасывание в кишечнике. Явления гипо- и гипервитаминоза. Пищевые источники. Суточная потребность.
27. Витамины группы Д. Провитамины. Биологическая роль. Явления гипо- и гипервитаминоза. Пищевые источники. Суточная потребность.
28. Витамины группы Е. Биологическая роль. Явления недостаточности. Пищевые источники. Суточная потребность.
29. Витамины группы К. Биологическая роль. Гиповитаминоз. Пищевые источники. Суточная потребность. Викасол. Антагонисты витамина К.
30. Биотин, коферментная форма. Биологическая роль. Комплекс биотин – авидин. Явления недостаточности. Пищевые источники. Суточная потребность.
31. Витамин В₁. Участие в построении коферментов. Роль в обмене веществ. Явления недостаточности. Пищевые источники. Суточная потребность.
32. Витамин В₂. Состав и участие в образовании flavиновых коферментов. Биологическая роль. Пищевые источники. Суточная потребность.
33. Витамин В₆, участие в образовании коферментов. Роль в обмене веществ. Явления гиповитаминоза. Пищевые источники. Суточная потребность.
34. Витамин В₁₂. Кобамидные коферменты. Участие в обмене веществ. Внутренний фактор. Явления гиповитаминоза. Пищевые источники. Суточная потребность.
35. Витамин С. Биологическое значение. Признаки гиповитаминоза. Пищевые источники. Суточная потребность.
36. Пантотеновая кислота. Коферменты, содержащие пантотеновую кислоту. Биологическая роль. Пищевые источники. Суточная потребность.
37. Витамин РР. Участие в образовании никотинамидных коферментов. Биологическое значение. Проявления гиповитаминоза. Пищевые источники. Суточная потребность.
38. Фолиевая кислота, состав, участие в образовании коферментов. Роль в обмене веществ. Основные проявления недостаточности. Пищевые источники. Суточная потребность.
39. Витаминоподобные вещества: биофлавоноиды (витамин Р), парааминобензойная кислота, инозитол, пангамовая кислота, липоевая кислота, холин, витамин U, карнитин. Биологическая роль.

ВТОРЫЕ ВОПРОСЫ

1. Обмен веществ и энергии, как важнейший признак жизнедеятельности. Общее представление о метаболизме. Катаболические и анаболические пути. Центральные пути метаболизма. Единство процессов ассимиляции и диссимиляции. Связь на уровне субстратов, восстановленных коферментов, энергии, регуляторов обмена.
2. Адениловая система (АТФ, АДФ, АМФ) и ее биологическое значение. Энергетический заряд клетки. Другие макроэргические соединения. Механизмы синтеза АТФ.
3. Окислительно-восстановительные процессы в тканях. Оксидоредуктазы, коферменты оксидоредуктаз. Роль кислорода в процессах биологического окисления. Участие митохондрий в процессах биологического окисления.
4. Современное представление о тканевом дыхании. Субстраты тканевого дыхания. Дыхательная цепь митохондрий и ее характеристика: пиридинзависимые и флавинзависимые дегидрогеназы, убихинон (коэнзим Q), цитохромы. Химическое строение, участие в транспорте электронов на кислород.
5. Окислительное фосфорилирование как основной механизм синтеза АТФ в животных клетках. Этапы, регуляция. Причины гипоэнергетических состояний. Разобщители и ингибиторы окислительного фосфорилирования, механизм их действия.
6. Митохондрии, особенности строения мембран митохондрий. Комплексы дыхательной цепи: состав, топология, участие в процессах биологического окисления. Митохондриальный синтез АТФ. АТФ-синтетаза. Сопряжение процессов тканевого дыхания и фосфорилирования.
7. Дегидрогеназы, оксидазы, оксигеназы. Биологическая роль в клетке. Система микросомного окисления.
8. Транспорт глюкозы в клетки различных органов и тканей. Пути метаболизма глюкозы, их значение и взаимосвязь.
9. Метаболизм гликогена: гликогенез и гликогенолиз, назначение. Последовательность реакций. Механизмы регуляции. Гликогеновые болезни (гликогенозы и агликогенозы).
10. Фосфоролиз и гидролиз гликогена в печени и мышцах. Влияние адреналина, глюкагона и инсулина на гликогенолиз.
11. Анаэробное и аэробное окисление глюкозы как путь получения энергии в клетках. Этапы, конечные продукты. Энергетический выход.
12. Гликолиз. Этапы, реакции, регуляция, биологическая роль. Энергетический выход и механизм образования АТФ в анаэробных условиях. Связь гликолиза с другими метаболическими процессами.
13. Спиртовое брожение глюкозы. Общие реакции для спиртового брожения и гликолиза, различия этих двух процессов. Обмен экзогенного этанола.
14. Пируват как центральный метаболит. Пути превращения пирувата в зависимости от энергетического статуса и особенностей окислительного метаболизма клетки.
15. Глюконеогенез. Субстраты, ферменты, энерготраты, биологическая роль. Регуляция глюконеогенеза.
16. Окислительное декарбоксилирование пировиноградной кислоты и других α -кето-кислот, ферменты, коферменты, биологическое значение. Отличие от простого декарбоксилирования.
17. Лимоннокислый цикл как центральный метаболический путь (локализация, последовательность химических превращений). Биологическое значение цикла. Связь с процессом окислительного фосфорилирования.

18. Пентозофосфатный путь распада глюкозы, этапы, назначение.
19. Глюкуроновая кислота. Путь образования. Пути метаболизма глюкуроновой кислоты.
20. Взаимопревращения моносахаридов в организме. Нарушение обмена галактозы (галактоземия) и фруктозы (идиопатическая фруктозурия, врожденная непереносимость фруктозы), подходы к диагностике и лечению.
21. Механизмы образования углекислого газа и воды — конечных продуктов обмена веществ.
22. Ресинтез липидов в клетках слизистой тонкого кишечника. Пути ресинтеза триацилглицеролов, фосфолипидов, эфиров холестерола.
23. Транспорт липидов в крови. Структура, образование и метаболизм хиломикронов. Роль липопротеинлипазы в обмене хиломикронов и других липопротеинов.
24. Транспорт липидов в крови. Структура, образование и метаболизм ЛПОНП, ЛППП и ЛПНП. Роль липопротеинлипазы, печеночной липазы и рецепторов клеточной поверхности.
25. Доставка липидов в клетки органов и тканей. Транспорт холестерола, жирных кислот. Механизм поддержания баланса холестерола в клетках организма.
26. Транспорт липидов. Образование и последующий метаболизм ЛПВП в организме. Роль ЛХАТ. Пути снижения повышенного уровня холестерола в плазме крови.
27. Депонирование липидов в жировой ткани и мобилизация жира из депо. Роль гормонов, лептина. Источники субстратов для синтеза триацилглицеролов в жировой ткани.
28. Транспорт, поступление в клетку и использование жирных кислот в качестве источников энергии. Окисление жирных кислот в митохондриях и пероксисомах. Энергетический выход.
29. Катаболизм жирных кислот в клетках. Особенности окисления ненасыщенных жирных кислот, с нечетным числом углеродных атомов, с разветвленным радикалом, с большим числом углеродных атомов. α - и ω -Окисление. Болезнь Рефзума.
30. Биосинтез жирных кислот. Происхождение субстратов. Полиферментный комплекс, синтезирующий жирные кислоты в эукариотической клетке. Значение биотина, НАДФН $^+$. Активаторы и ингибиторы синтеза жирных кислот.
31. Биосинтез ненасыщенных жирных кислот, жирных кислот с большим числом углеродных атомов. Роль микросомных ферментов.
32. Биосинтез холестерола. Регуляция уровня холестерола в клетках. Производные холестерола. Связь нарушений обмена липидов с развитием заболеваний (атеросклероз, желчекаменная болезнь, жировое перерождение печени).
33. Нарушения обмена холестерола. Факторы, оказывающие влияние на уровень липопротеинов плазмы крови.
34. Кетоновые тела. Образование кетоновых тел. Пути катаболизма. Причины и следствия повышения образования кетоновых тел.
35. Биосинтез фосфолипидов. Роль липотропных факторов.
36. Переаминирование. Ферменты. Коферменты. Роль этого процесса для жизнедеятельности клетки. Диагностическое значение определения активности трансаминаzu в сыворотке крови.
37. Пути дезаминирования аминокислот. Ферменты и коферменты окислительного дезаминирования. Биологическое значение глутаматдегидрогеназной реакции.
38. Пути превращения безазотистого остатка аминокислот. Гликогенные и кетогенные аминокислоты.
39. Пути обезвреживания аммиака в организме. Транспорт аммиака по крови.

40. Аминокислотный фонд клетки. Источники пополнения. Пути использования аминокислотного фонда. Заменимые и незаменимые аминокислоты. Механизмы синтеза аминокислот.
41. Общие пути метаболизма аминокислот. Особенности обмена отдельных аминокислот на примере обмена фенилаланина и тирозина.
42. Образование мочевины. Роль печени в мочевинообразовании. Значение исследования уровня мочевины и остаточного азота в клинической практике.
43. Декарбоксилирование аминокислот. Образование биогенных аминов и их роль в организме. Пути их распада.
44. Связь обмена липидов и углеводов. Их взаимопревращения.
45. Образование и использование в клетке ацил-КоА и ацетил-КоА.

ТРЕТЬИ ВОПРОСЫ

1. Гормоны. Химическая природа. Классификация. Связь структуры гормонов с механизмом их действия.
2. Гормоны гипофиза, их химическая природа. Связь с гипоталамусом. Гормоны аденогипофиза. Соматотропин — молекулярный механизм проведения сигнала в клетку, влияние на метаболизм.
3. Гормоны нейрогипофиза. Вазопрессин — молекулярный механизм проведения сигнала в клетку, влияние на метаболизм.
4. Гормоны щитовидной железы. Их строение и образование. Механизм действия, влияние на метаболизм. Гипо- и гипертиреоз.
5. Гормоны, регулирующие обмен кальция и фосфора. Химическая природа. Механизм действия.
6. Инсулин. Химическая природа и механизм действия. Роль инсулина в регуляции обмена углеводов, липидов и белков.
7. Метаболические нарушения при сахарном диабете. Роль гликозилирования белков, восстановительного пути обмена глюкозы.
8. Глюкагон. Химическая природа, рецепторы, механизм передачи сигнала в клетках-мишениях, влияние на метаболизм.
9. Глюкокортикоиды, их строение, рецепторы, механизм передачи сигналов в клетках-мишениях. Влияние на метаболизм.
10. Минералокортикоиды, их строение, механизм передачи сигналов в клетках-мишениях. Влияние на метаболизм.
11. Гормоны мозговой части надпочечников: адреналин, норадреналин. Строение, синтез. Механизм проведения сигнала в клетки-мишени, влияние на метаболизм.
12. Половые гормоны, химическая природа, механизм передачи сигналов в клетках-мишениях. Биологическая роль.
13. Биосинтез пуриновых нуклеотидов. Исходные субстраты синтеза. Регуляция синтеза. Роль витаминов в механизмах синтеза.
14. Биосинтез пиримидиновых нуклеотидов. Оротовая кислота. Источники пентоз. Регуляция синтеза. Роль витаминов в синтезе пиримидиновых нуклеотидов.
15. Матричный механизм синтеза ДНК. Ферменты и субстраты синтеза. Особенности синтеза у эукариот.
16. Полимеразная цепная реакция и клонирование как методы искусственного размножения ДНК. Основные этапы и применение в медицинской практике.

17. Синтез РНК. Ферменты и субстраты синтеза. Особенности синтеза у эукариот. Регуляция синтеза.
18. Генетический код и его свойства.
19. Роль т-РНК в синтезе белка. Специфичность АРСаз. Адапторная функция т-РНК.
20. Рекогниция и трансляция как этапы реализации генетической информации в клетке. Субстраты, ферменты, механизм.
21. Регуляция биосинтеза белка в клетке на генетическом уровне. Роль гистонов, гормонов, жирорастворимых витаминов, антибиотиков.
22. Посттрансляционная модификация молекул белка. Особенности синтеза коллагена. Гидроксилирование, гликозилирование, ограниченный протеолиз. Другие механизмы посттрансляционных модификаций.
23. Обратимая и необратимая регуляция биохимических реакций. Представление о механизме изостерической регуляции. Использование принципов изостерической регуляции в медицинской практике.
24. Представление о механизме аллостерической регуляции биохимических реакций. Аллостерические эффекторы. Виды аллостерической регуляции.
25. Ковалентная модификация структуры ферментов как механизм регуляции биохимических реакций. Роль реакций фосфорилирования в ковалентной модификации. Регуляторы фосфорилирования ферментов.
26. Гуморальная регуляция обмена липидов. Роль инсулина, адреналина, глюкагона и стероидных гормонов.
27. Гуморальная регуляция обмена углеводов. Роль инсулина, адреналина, глюкагона и глюкокортикоидов.
28. Гуморальная регуляция содержания глюкозы в крови. Механизмы регуляторного действия гормонов.
29. Механизмы передачи информации от внешних сигналов на внутриклеточные процессы. Механизмы усиления сигналов. Вторичные посредники и механизмы их образования.
30. Роль G-белков в механизмах передачи информации от внешних сигналов на внутриклеточные процессы.
31. Аденилаткиназный механизм передачи информации от внешних сигналов на внутриклеточные процессы. Роль фосфодиэстеразы в этом процессе. Значение уровня цАМФ для клетки.
32. Механизм передачи информации от внешних сигналов на внутриклеточные процессы с участием фосфолипазы С.
33. Инозитолтрифосфат и диацилглицерол как вторичные посредники при передаче информации от внешних сигналов на внутриклеточные процессы. Механизмы образования и действие.
34. Роль ионов кальция в механизмах передачи информации от внешних сигналов на внутриклеточные процессы. Калмодулин.
35. Роль ограниченного протеолиза в механизмах регуляции процессов жизнедеятельности. Свертывание крови. Факторы и механизмы свертывания. Значение ионов кальция и витамина К в процессах свертывания крови.
36. Роль ограниченного протеолиза в механизмах регуляции процессов жизнедеятельности. Фибринолиз. Биологическая роль фибринолиза. Плазминовая система.
37. Антикоагулянтная система. Первичные и вторичные антикоагулянты.
38. Важнейшие характеристики и составляющие интеграции метаболизма.
39. Особенности метаболизма в печени в состоянии после приема пищи.

40. Особенности метаболизма в печени в состоянии натощак и при длительном голодании.
41. Межорганный метаболизм и обеспечение организма энергосубстратами в состоянии после приема пищи.
42. Межорганный метаболизм и обеспечение организма энергосубстратами в состоянии натощак и при длительном голодании.
43. Гормональная регуляция адаптации метаболических путей к состоянию после приема пищи и голоданию (инсулин, глюкагон, катехоламины, кортикоэстериоиды).

ЧЕТВЕРТЫЕ ВОПРОСЫ

1. Переваривание нуклеопротеинов в желудочно-кишечном тракте. Конечные продукты распада пиримидиновых и пуриновых нуклеотидов. Гиперурикемия, подагра, подходы к диагностике, профилактике и лечению.
2. Азотистый баланс. Нормы белков в питании. Биологическая ценность белков.
3. Пищевая ценность белков, углеводов, липидов, усваиваемость в желудочно-кишечном тракте. Незаменимые факторы питания. Энергия: потребность, происхождение и расходование в организме.
4. Применение ферментов и их ингибиторов в медицинской практике.
5. Роль печени в обмене белков, углеводов, липидов.
6. Антитоксическая функция печени. Обезвреживание в печени токсичных веществ, нормальных метаболитов, лекарственных препаратов.
7. Синтез и распад кровяных пигментов. Роль печени в образовании желчных пигментов. Метаболизм желчных пигментов.
8. Желтухи, происхождение, методы диагностики желтух.
9. Биохимические методы диагностики поражений печени.
10. Происхождение ферментов плазмы крови. Значение определения активности ферментов в плазме крови с диагностической целью и для контроля за эффективностью лечения.
11. Химический состав плазмы крови. Методы исследования химического состава плазмы крови, используемые в клинической практике.
12. Буферные системы крови и их значение. Доказательство буферных свойств сыворотки крови. Общие представления о регуляции кислотно-основного состояния (КОС).
13. Механизмы переноса углекислоты и кислорода кровью. Механизмы развития гипоксических состояний.
14. Белки плазмы крови. Функции. Клинико-биохимическое значение определения общего белка плазмы крови и белковых фракций.
15. Методы обнаружения и количественного определения белков в биологических жидкостях (моча, плазма крови).
16. Дислипопротеинемии, причины возникновения, способы распознавания и значение в развитии заболеваний.
17. Основные показатели анализа мочи здорового человека.
18. Азотсодержащие вещества мочи, их происхождение и роль в организме. Принцип определения общего азота мочи.
19. Патологические составные части мочи и их определение.
20. Переваривание белков в желудочно-кишечном тракте. Качественный и количественный анализ желудочного сока. Роль соляной кислоты.
21. Сок поджелудочной железы. Участие в переваривании углеводов и липидов. Принципы и клиническое значение определения активности амилазы в моче.

22. Классификация и свойства протеаз. Участие в переваривании белков. Субстратная специфичность. Ингибиторы протеаз и их использование в клинической практике при нарушении функции поджелудочной железы.
23. Пищевая ценность углеводов. Переваривание и всасывание углеводов. Роль клетчатки и пектинов в питании. Нарушения переваривания углеводов, принципы диагностики и лечения.
24. Этапы переваривания липидов пищи в желудочно-кишечном тракте. Роль желчных кислот, ферментов. Печеночно-кишечная рециркуляция желчных кислот. Механизмы всасывания продуктов ферментативного гидролиза жира.
25. Химические реакции, лежащие в основе гниения белков в кишечнике. Понятие о ксенобиотиках. Механизмы обезвреживания их в организме.
26. Причины гипер- и гипоферментемии при патологических процессах.
27. Вода. Значение воды. Биологическая роль натрия, калия, хлора. Механизмы регуляции водно-минерального обмена.
28. Макроэлементы (кальций, фосфор, магний). Биологическая роль.
29. Роль серы в обмене веществ (тиоловые и дисульфидные группы белков и гормонов, их участие в формировании структуры и специфических свойств белка; глутатион, сульфолипиды, тиамин, биотин, участие серы в процессах обезвреживания).
30. Микроэлементы. Их значение. Роль ионов марганца, меди, цинка, селена, кобальта, йода, фтора.
31. Механизмы всасывания, транспорта и депонирования железа. Роль железа в обмене веществ.
32. Особенности метаболизма в клетках соединительных тканей. Функции соединительных тканей и биомедицинское значение внеклеточного матрикса.
33. Белки волокнистых структур соединительных тканей: структурные (коллаген, эластин) и адгезивные (фибронектин, фибронектин, ламинин, энтектин). Особенности первичной и пространственной структуры. Функции.
34. Белково-углеводные комплексы (БУК), классификация. Роль в организме. Особенности синтеза и распада БУК, нарушение этих процессов.
35. Химический состав мышечной ткани. Строение и роль сократительных белков.
36. Молекулярный механизм мышечного сокращения и расслабления. Источники энергии и механизмы энергообеспечения мышечного сокращения.
37. Клинические формы синдрома недостаточного питания. Происхождение, характерные нарушения метаболизма.
38. Синдром недостаточного питания. Основные причины развития при заболеваниях.
39. Особенности обмена липидов, углеводов и аминокислот в нервной ткани.
40. Происхождение важнейших нейромедиаторов (ацетилхолин, глутамат, глицин, серотонин, катехоламины, ГАМК). Их биологическая роль, катаболизм.

**ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ
ПО БИОЛОГИЧЕСКОЙ ХИМИИ
ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ МЕДИЦИНСКОГО ФАКУЛЬТЕТА**

Химия белков

1. Аминокислоты. Классификация, свойства, строение.
2. Типы связей остатков аминокислот в молекуле белка. Свойства пептидной связи.
3. Физико-химические свойства белков. Растворимость, факторы устойчивости белков в растворе. Высаливание.
4. Функции белков.
5. Использование blot-анализа для идентификации белков.
6. Понятие о первичной, вторичной и надвторичной структурах белковой молекулы. Типы связей между остатками аминокислот. Домены.
7. Понятие о третичной структуре белковой молекулы. Типы связей между остатками аминокислот, характерные для этой пространственной структуры. Денатурация белка. Факторы, вызывающие денатурацию.
8. Четвертичная структура белков. Примеры функционирования белков с четвертичной структурой.
9. Принципы классификации белков. Простые белки и их роль в организме.
10. Сложные белки. Строение простетических групп сложных белков. Значение сложных белков в организме.

ФЕРМЕНТЫ

11. Роль ферментов в процессах жизнедеятельности. Принципы номенклатуры и классификации ферментов.
12. Химическая природа ферментов. Общие свойства ферментов.
13. Строение ферментов. Активный центр фермента.
14. Коферменты. Классификация и роль.
15. Механизм действия ферментов. Кинетика ферментативных реакций.
16. Изоферменты, их молекулярные разновидности, роль в клетке.
17. Общие принципы регуляции ферментативных процессов.
18. Механизм изостерической регуляции активности ферментов.
19. Механизм аллостерической регуляции активности ферментов.
20. Ковалентная модификация структуры как механизм регуляции активности фермента.
21. Ингибиторы ферментов, классификация, характеристика.
22. Применение ферментов в медицинской практике.

БИОЭНЕРГЕТИКА

23. Общее представление о метаболизме. Связь между катаболизмом и анаболизмом. Общие (центральные) пути метаболизма.
24. Окислительно-восстановительные процессы в тканях. Пути использования кислорода в клетках.
25. Адениловая система и ее биологическое значение. Механизмы синтеза и пути использования АТФ.
26. Современное представление о тканевом дыхании. Дыхательная цепь митохондрий

и ее характеристика: никотинамидзависимые и флавинзависимые дегидрогеназы, убихинон (коэнзим Q), цитохромная система, их химическое строение и роль в окислительных процессах.

27. Окислительное фосфорилирование. Хемиосмотическая теория окислительного фосфорилирования.

28. Причины гипоэнергетических состояний в клетках. Ингибиторы и разобщители тканевого дыхания и окислительного фосфорилирования, механизм их действия.

ОБМЕН УГЛЕВОДОВ

29. Углеводы. Классификация, биологическая роль.

30. Пищевая ценность углеводов. Переваривание и всасывание углеводов. Роль клетчатки в пищеварении.

31. Синтез и распад гликогена. Механизмы регуляции. Различия гликогенолиза в печени и мышцах.

32. Превращения углеводов в анаэробных условиях. Энергетический выход гликолиза, механизм образования АТФ.

33. Аэробное окисление глюкозы, этапы, конечные продукты. Энергетический выход и механизмы образования АТФ.

34. Судьба конечных продуктов гликолиза — пировиноградной и молочной кислот. Глюконеогенез. Ферменты, участвующие в глюконеогенезе. Регуляция глюконеогенеза.

35. Окислительное декарбоксилирование пировиноградной кислоты и других α -кето-кислот, ферменты, коферменты, биологическое значение.

36. Лимоннокислый цикл. Промежуточные этапы, ферменты. Биологическое значение цикла. Связь с процессом окислительного фосфорилирования.

37. Пентозофосфатный путь распада глюкозы и его биологическая роль.

38. Глюкуроновый путь распада глюкозы. Биологическая роль.

39. Регуляция содержания глюкозы в крови. Механизмы регуляторного действия гормонов (инсулин, адреналин, глюкагон, глюкокортикоиды и др.).

ОБМЕН ЛИПИДОВ

40. Липиды. Биологическая роль. Классификация липидов. Их основные свойства.

41. Классификация жирных кислот. Высоконепредельные жирные кислоты. Производные арахидоновой кислоты (простагландины, простациклины, тромбоксаны, лейкотриены) и их биологическая роль.

42. Глицерофосфолипиды. Химическое строение, свойства и биологическая роль.

43. Холестерол, биосинтез и биологическая роль. Нарушения обмена холестерола (атеросклероз, желчнокаменная болезнь).

44. Переваривание жиров и фосфолипидов в пищеварительном тракте: эмульгирование, ферменты, продукты гидролиза, мицеллярное растворение. Роль желчных кислот в переваривании липидов.

45. Ресинтез триацилглицеролов и фосфолипидов в энтероцитах. Формирование хиломикронов, их состав и структура.

46. Липопротеины сыворотки крови. Классификация, состав, место образования, взаимопревращения. Роль липопротеинлипазы, лецитин: холестеролацилтрансферазы (ЛХАТ).

47. Синтез и мобилизация жира в жировой ткани. Гормончувствительная липаза.

48. Синтез и секреция липидов в печени. Роль липотропных факторов.

49. Центральная роль ацетил-КоА в обмене веществ.

50. Клеточная локализация и биологическое значение β -, α - и ω -окисления жирных кислот.
51. Химизм β -окисления жирных кислот. Роль КоA-SH и АТФ. Локализация окисления в клетке. Связь с ферментами переноса электронов. Энергетический выход β -окисления.
52. Кетоновые тела, механизмы образования кетоновых тел. Роль в организме. Кетоз при диабете и голодании. Значение определения кетоновых тел в моче.
53. Синтез жирных кислот. Связь с гликогеном, пентозофосфатным путем превращения глюкозы, циклом Кребса. Значение CO₂, АТФ, НАДФН·H⁺, биотина. Полиферментный комплекс, синтезирующий жирные кислоты. Активаторы и ингибиторы синтеза жирных кислот.
54. Гормональная регуляция обмена липидов.

ОБМЕН БЕЛКОВ И АМИНОКИСЛОТ

55. Азотистый баланс. Нормы белков в питании. Биологическая ценность белков.
56. Характеристика протеаз. Роль ограниченного протеолиза в жизнедеятельности клетки.
57. Переваривание белков в желудочно-кишечном тракте. Роль соляной кислоты. Анализ желудочного сока.
58. Пептидазы поджелудочной железы, механизм их действия. Ингибиторы пептидаз и их использование в клинической практике при нарушении функции поджелудочной железы.
59. Аминокислотный фонд клетки. Источники пополнения. Пути использования аминокислотного фонда.
60. Переаминирование. Ферменты. Коферменты. Роль этого процесса для жизнедеятельности клетки. Диагностическое значение определения активности трансамина в сыворотке крови.
61. Пути дезаминирования аминокислот. Ферменты и коферменты окислительного дезаминирования. Биологическое значение глутаматдегидрогеназной реакции.
62. Пути превращения безазотистого остатка аминокислот. Гликогенные и кетогенные аминокислоты.
63. Пути обезвреживания аммиака. Образование глутамина и аспарагина и их роль в транспорте аммиака.
64. Образование мочевины. Роль печени в мочевинообразовании. Значение исследования уровня мочевины и остаточного азота в клинической практике.
65. Декарбоксилирование аминокислот. Образование биогенных аминов и их роль в организме.

ХИМИЯ И ОБМЕН НУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ

66. Нуклеиновые кислоты. ДНК и РНК, их строение, распределение в клетке, функции.
67. Особенности первичной и вторичной структуры ДНК и РНК. Взаимодействие нуклеиновых кислот с белками. Строение нуклеопротеинов.
68. Конечные продукты распада пуриновых и пиримидиновых нуклеотидов. Значение определения содержания мочевой кислоты в крови и моче в клинической практике.
69. Биосинтез пуриновых нуклеотидов. Исходные субстраты синтеза. Регуляция синтеза.
70. Биосинтез пиримидиновых нуклеотидов. Исходные субстраты синтеза. Регуляция синтеза.
71. Назовите дезоксирибонуклеотиды для синтеза ДНК и укажите пути их образования.

72. Матричный механизм синтеза ДНК. Ферменты и субстраты синтеза. Особенности синтеза у эукариот.
73. Синтез РНК. Ферменты и субстраты синтеза. Особенности синтеза у эукариот.
74. Генетический код и его свойства.
75. Роль т-РНК в синтезе белка. Специфичность АРСаз. Адапторная функция т-РНК.
76. Современные представления о биосинтезе белка.

ГОРМОНЫ

77. Гормоны. Химическая природа. Классификация. Связь структуры гормонов с механизмом их действия.
78. Механизмы действия гормонов на клетки. Роль G-белков, вторичных посредников, протеинкиназ.
79. Гормоны гипофиза, их химическая природа. Связь с гипоталамусом. Гормоны аденогипофиза. Соматотропин — молекулярный механизм проведения сигнала в клетку, влияние на метаболизм.
80. Гормоны нейрогипофиза. Вазопрессин — молекулярный механизм проведения сигнала в клетку, влияние на метаболизм
81. Гормоны щитовидной железы. Их строение, механизм действия, влияние на метаболизм. Гипо- и гипертиреоз.
82. Гормоны, регулирующие обмен кальция и фосфора. Химическая природа, механизмы передачи сигнала в клетках-мишениях, биологическое действие.
83. Инсулин. Химическая природа, рецепторы, механизм передачи сигнала в клетках-мишениях. Влияние инсулина на обмен веществ. Сахарный диабет.
84. Глюкагон. Химическая природа, рецепторы, механизм передачи сигнала в клетках-мишениях, влияние на обмен веществ.
85. Глюкокортикоиды. Химическая природа, рецепторы, механизм передачи сигнала в клетках-мишениях, влияние на обмен веществ.
86. Минералокортикоиды. Химическая природа, рецепторы, механизм передачи сигнала в клетках-мишениях, влияние на обмен веществ.
87. Гормоны мозговой части надпочечников. Катехоламины: дофамин, адреналин, норадреналин. Строение, рецепторы, механизм передачи сигнала в клетках-мишениях, роль в организме.
88. Мужские и женские половые гормоны. Химическая природа, рецепторы, механизм передачи сигнала в клетках-мишениях. Влияние на обмен веществ.

БИОХИМИЯ ПИТАНИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ МЕТАБОЛИЗМА

Водорастворимые витамины

89. Общая характеристика и классификация витаминов. Антивитамины. Методы оценки обеспеченности организма витаминами.
90. Биотин. Коферментная форма. Биологическая роль. Признаки гиповитаминоза. Пищевые источники. Суточная потребность.
91. Витамин В₁. Участие в построении коферментов. Роль в обмене веществ. Признаки гиповитаминоза. Пищевые источники. Суточная потребность.
92. Витамин В₂. Строение, участие в образовании flavиновых коферментов. Биологическая роль. Признаки гиповитаминоза. Пищевые источники. Суточная потребность.

93. Витамин В₆. Участие в образовании коферментов. Роль в обмене веществ. Признаки гиповитамина. Пищевые источники. Суточная потребность.
94. Витамин В₁₂. Кобамидные коферменты. Участие в обмене веществ. Признаки гиповитамина. Пищевые источники. Суточная потребность.
95. Витамин С. Биологическое значение. Признаки гиповитамина. Пищевые источники. Суточная потребность.
96. Пантотеновая кислота. Коферменты, содержащие пантотеновую кислоту. Биологическая роль. Признаки гиповитамина. Пищевые источники. Суточная потребность.
97. Витамин РР. Строение, участие в образовании никотинамидных коферментов. Признаки гиповитамина. Пищевые источники. Суточная потребность.
98. Фолиевая кислота. Строение, участие в образовании коферментов. Роль в обмене веществ. Признаки гиповитамина. Пищевые источники. Суточная потребность.
99. Витаминоподобные вещества: биофлавоноиды (витамин Р), парааминобензойная кислота, инозитол, пангамовая кислота, липоевая кислота, холин, витамин U и др. Биологическая роль.

Жирорастворимые витамины

100. Витамины группы А. Биологическая роль. Явления гипо- и гипервитамина. Пищевые источники. Суточная потребность.
101. Витамины группы Е. Биологическая роль. Явления гиповитамина. Пищевые источники. Суточная потребность.
102. Витамины группы Д. Строение, биологическая роль. Явления гипо- и гипервитамина. Пищевые источники. Суточная потребность.
103. Витамины группы К. Биологическая роль. Гиповитамина. Пищевые источники. Суточная потребность.

Вода и минеральные вещества

104. Вода. Значение воды. Биологическая роль натрия, калия, хлора. Механизмы регуляции водно-минерального обмена.
105. Макроэлементы (кальций, фосфор, магний). Биологическая роль.
106. Микроэлементы. Их значение. Роль ионов марганца, меди, цинка, селена, кобальта, йода, фтора.
107. Роль серы в обмене веществ. Тиоловые и дисульфидные группы белков и гормонов, их участие в формировании структуры и специфических свойств белка. Глутатион, сульфолипиды, тиамин, биотин, участие в обезвреживании.

108. Механизмы всасывания, транспорта и депонирования железа. Роль железа в обмене веществ.

Интеграция метаболизма и нарушения питания

109. Межорганный метаболизм и обеспечение организма энергосубстратами в состоянии после приема пищи.
110. Межорганный метаболизм и обеспечение организма энергосубстратами в состоянии натощак и при длительном голодании.
111. Клинические формы синдрома недостаточного питания. Происхождение, характерные нарушения метаболизма.

Биохимия крови

112. Химический состав плазмы крови. Белки плазмы крови и их роль в организме. Значение определения общего белка плазмы крови и отдельных фракций в клинической практике.

113. Происхождение ферментов плазмы крови. Значение определения активности ферментов в плазме крови с диагностической целью и для контроля за эффективностью лечения.
114. Буферные системы крови и их значение.
115. Механизмы переноса кислорода и углекислоты кровью. Механизмы развития гипоксических состояний.
116. Свертывание крови. Фазы гемокоагуляции. Факторы и механизмы свертывания крови.
117. Значение ионов кальция и витамина К в процессах свертывания крови.
118. Антикоагулянтная система.
119. Фибринолиз. Биологическая роль фибринолиза. Плазминовая система.

БИОХИМИЯ ПЕЧЕНИ

120. Роль печени в обменных процессах в организме. Антитоксическая функция печени. Биохимические методы диагностики поражения печени.
121. Синтез и распад кровяных пигментов. Роль печени в образовании желчных пигментов. Метаболизм желчных пигментов.

БИОХИМИЯ МЫШЦ

122. Химический состав мышечной ткани. Строение и роль сократительных белков.
123. Молекулярные механизмы мышечного сокращения и расслабления. Источники энергии, обеспечивающие мышечное сокращение.

БИОХИМИЯ СОЕДИНİТЕЛЬНЫХ ТКАНЕЙ

124. Белково-углеводные комплексы. Классификация и роль в организме. Особенности биосинтеза и распада белково-углеводных комплексов соединительных тканей.
125. Белки волокнистых структур соединительных тканей (коллаген, эластин, фибронектин). Особенности структуры. Функции.
126. Особенности биосинтеза коллагена и эластина. Роль витамина С в синтезе коллагена.

БИОХИМИЯ МОЧИ

127. Основные показатели анализа мочи здорового человека.
128. Патологические компоненты мочи и их определение.

БИОХИМИЯ НЕРВНОЙ ТКАНИ

129. Особенности обмена липидов, углеводов и аминокислот в нервной ткани.
130. Происхождение важнейших нейромедиаторов (ацетилхолин, глутамат, глицин, серотонин, катехоламины, ГАМК). Их биологическая роль, катаболизм.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Правила техники безопасности при работе в химической лаборатории.....	3
Структура, функции, свойства белков и пептидов. Методы исследования белков	4
Занятие 1. Введение в практикум. Введение в биохимию.	
Строение аминокислот и пептидов. Количественное определение содержания белка в биологических жидкостях	4
Занятие 2. Уровни структурной организации белковых молекул.	
Физико-химические свойства белков. Высаливание и осаждение белков.....	8
Занятие 3. Методы разделения, выделения и очистки белков. Сложные белки.	
Гель-фильтрация	15
Ферменты	20
Занятие 4. Ферменты. Классификация, строение, свойства	20
Занятие 5. Регуляция действия ферментов. Количественное определение активности ферментов.....	26
Занятие 6. Коллоквиум по темам «Химия белков», «Ферменты».....	32
Введение в метаболизм. Биологическое окисление	35
Занятие 7. Введение в метаболизм. Центральные метаболические пути (окислительное декарбоксилирование ПВК, лимоннокислый цикл Кребса)	35
Занятие 8. Биологическое окисление. Окислительное фосфорилирование. Пути утилизации кислорода клетками.....	41
Обмен углеводов.....	47
Занятие 9. Переваривание углеводов. Гликогенез и гликогенолиз.	
Гликолиз и спиртовое брожение	47
Занятие 10. Пути метаболизма пирувата. Глюконеогенез. Аэробный распад глюкозы до конечных продуктов (CO_2 и H_2O). Количественное определение глюкозы в крови	52
Занятие 11. Вторичные пути обмена глюкозы. Метаболизм галактозы, фруктозы, этанола. Влияние гормонов на уровень глюкозы в крови.....	57
Занятие 12. Коллоквиум по темам «Введение в метаболизм», «Центральные метаболические пути», «Биологическое окисление», «Окислительное фосфорилирование», «Обмен углеводов»	63
Обмен липидов	67
Занятие 13. Обмен липидов: переваривание, всасывание, ресинтез.	
Транспорт экзогенных липидов. Определение активности липаз	67
Занятие 14. Транспорт липидов кровью. Обмен холестерола. Депонирование и мобилизация липидов. Количественное определение β -липопротеинов	73
Занятие 15. Внутриклеточный обмен жирных кислот. Кетоновые тела.	
Количественное определение холестерола в сыворотке крови.....	77
Занятие 16. Коллоквиум по теме «Обмен липидов»	83
Обмен белков	86
Занятие 17. Переваривание и всасывание белков. Анализ желудочного сока.....	86

Занятие 18. Внутриклеточный обмен аминокислот. Определение активности аминотрансфераз в сыворотке крови	91
Занятие 19. Обезвреживание аммиака. Количественное определение остаточного азота крови и мочевины в моче. Нарушения аминокислотного обмена	95
Обмен нуклеопротеинов. Методы молекулярной биологии	100
Занятие 20. Химия и обмен нуклеопротеинов. Определение содержания мочевой кислоты и общего азота в моче	100
Занятие 21. Матричные биосинтезы (синтез ДНК, РНК, белков). Современные методы молекулярной биологии	105
Занятие 22. Коллоквиум по темам «Обмен простых белков и нуклеопротеинов», «Биосинтез ДНК, РНК и белка»	112
Биохимия гормонов	115
Занятие 23. Гормоны. Общая характеристика и особенности биологического действия гормонов. Качественные реакции на гормоны	115
Занятие 24. Биохимия гормонов. Тест на толерантность к глюкозе	122
Биохимия печени	129
Занятие 25. Биохимия печени. Интеграция метаболизма	129
Занятие 26. Коллоквиум по темам «Гормоны, биохимия печени», «Интеграция метаболизма».....	139
Биохимия крови	143
Занятие 27. Биохимия крови. Физико-химические свойства крови. Гемоглобинозы	143
Занятие 28. Белки плазмы крови. Система гемостаза	150
Биохимия питания	159
Занятие 29. Биохимия питания. Биологическая роль белков, жиров, углеводов, витаминов	159
Занятие 30. Биохимия питания. Минеральные вещества. Регуляция водно-электролитного баланса.....	166
Занятие 31. Коллоквиум по темам «Биохимия крови», «Биохимия питания», «Водно-минеральный обмен».....	171
Биохимия мочи	174
Занятие 32. Биохимия мочи. Физиологические и патологические компоненты мочи	174
Занятие 33. Контроль практических навыков биохимического анализа. Цветные реакции на белки и аминокислоты, количественное определение белка в сыворотке крови биуретовым методом	181
Занятие 34. Контроль практических навыков биохимического анализа. Анализ желудочного сока и мочи	184
Перечень экзаменационных вопросов по биологической химии.....	185
Перечень экзаменационных вопросов по биологической химии для иностранных учащихся медицинского факультета	193