

Сравнительная характеристика препаратов таргетной терапии первой линии при раке почки

Губашина Людмила Александровна

Белорусский государственный медицинский университет, Минск

*Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент **Барьяш Валерий Васильевич**, Белорусский государственный медицинский университет, Минск*

Введение

В последние годы в Республике Беларусь отмечается тенденция к увеличению случаев рака почки, прирост за 2006-2015 гг. составил 46,9%. На 2015 год в структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями рак почки занимает 6-е место (5,5% от общего числа онкологических заболеваний) у мужчин и 9-е место (3,8%) у женщин. За 2015 год зарегистрировано 2232 случая почечноклеточного рака, заболеваемость составила 23,5 случая на 100 тыс. человек.

Цель исследования

Изучить эффективность препаратов таргетной терапии первой линии (авастин, сутент, вотриент) у пациентов МГКОД с новообразованиями почки и провести сравнительную характеристику на основе полученных данных за несколько лет.

Материалы и методы

Во время проведения исследования были использованы данные МГКОД за 2015-2017 гг.

Результаты

На материалах МГКОД проанализированы основные показатели заболеваемости, клинического течения и исходов пациентов с раком почки в г. Минске за 2015-2017 г.г. Проанализированы особенности клинического течения и исходов в группе пациентов, получавших таргетную терапию.

Выводы

1. В настоящее время имеется тенденция к увеличению заболеваемости раком почки в РБ и г. Минске 2. Таргетная терапия позволяет улучшить результаты лечения у пациентов с рецидивной и метастатической формой этого заболевания .