

Основные тенденции заболеваемости населения республики беларусь алкоголизмом

Черепович Кристина Васильевна, Васюкевич Елена Николаевна

Белорусский государственный университет, МГЭИ им. А. Д. Сахарова БГУ, г. Минск

*Научный(-е) руководитель(-и) – Живицкая Елена Петровна, Белорусский
государственный университет, МГЭИ им. А. Д. Сахарова БГУ, г. Минск*

Введение

Чрезмерное потребление алкоголя в большинстве случаев является одной из основных причин тяжелых заболеваний и социальных проблем. Проблема алкоголизма значительно влияет на здоровье и состояние благополучия населения. В связи с высокими показателями потребления алкоголя в Республике Беларусь актуален поиск новых мер по профилактике алкоголизма. В настоящее время наступило осознание важности борьбы с алкоголизмом в условиях определенной стабилизации социально-экономических отношений. В связи с этим выросла роль медико-социального мониторинга всех аспектов этой проблемы.

Цель исследования

проанализировать заболеваемость населения Республики Беларусь алкоголизмом в 1995-2015 гг. и выявить основные тенденции.

Материалы и методы

Объектом исследования являются официальные данные статистических сборников Министерства Здравоохранения Республики Беларусь в 1995-2015 гг. В работе был проведен ретроспективный анализ показателей заболеваемости алкоголизмом, проанализирована динамика и определены основные тенденции.

Результаты

В Республике Беларусь в 1995-2015 гг. согласно официальной статистике выявлено 506483 тысяч людей, страдающих алкоголизмом. За изучаемый период 1995-2015 гг. динамика заболеваемости населения Республики Беларусь алкоголизмом имела две разнонаправленные тенденции. Динамика данного показателя характеризовалась существенным подъёмом в начале исследуемого периода. Так, в 1995 г. показатель заболеваемости составлял 131,5 ‰, а в 2002 г. он вырос в 2,5 раза (334,4 ‰). Возможно это свидетельствует о влиянии макросоциальных факторов на развитие алкоголизма, поскольку в 1990-е годы происходила дестабилизация политической обстановки в стране, трудности в экономике переросли в полномасштабный кризис, отмечался хронический товарный дефицит, что соотносится с ростом распространённости алкоголизма.

С 2006 г. по 2015 г. заболеваемость вследствие употребления алкоголя последовательно снизилась – с 334,4 до 206 ‰ (в 1,5 раза). Такая тенденция к снижению роста заболеваемости может быть связана со стабилизацией экономических процессов и ростом благосостояния народа. Однако уровень на конец изучаемого периода остается выше, чем в начале изучаемого периода.

Выводы

Таким образом, статистические данные демонстрируют, что проблема алкогольной зависимости в Республике Беларусь достаточно актуальна, несмотря на тенденцию к неуклонному снижению в последнее десятилетие в сравнении со стремительным ростом в девяностые годы прошлого столетия. Положительная динамика может быть связана с проведением профилактических и оздоровительных мероприятий, направленных на снижение алкоголизации населения.