

Снапкова Е. В., Кириленко Л. Ю.

ПРИЧИНЫ НАСИЛЬСТВЕННОЙ СМЕРТИ ПОДРОСТКОВ В МИНСКЕ В 2013 – 2016 ГГ.

Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Грищенко Л. Н.

Кафедра судебной медицины

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск

Актуальность. Подростковый возраст — это время бурного роста и огромного потенциала, но, при этом, и время значительных рисков, когда мощное влияние оказывает социальный контекст. Потери жизни в подростковом возрасте сказываются на уровне средней продолжительности жизни, уменьшении числа лиц активного трудоспособного возраста и связанных с этим экономических потерях общества и государства (Баранов А.А., 2009).

Цель: изучить структуру причин насильственной смерти подростков в возрасте 14 – 18 лет в Минске за период 2013 – 2016 гг.

Материал и методы. Материалом послужили архивные данные журналов регистрации умерших отделов общих экспертиз № 1, 2, 3 управления судебно-медицинских экспертиз Управления Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь по Минску за в 2013-2016 гг. Метод исследования – статистико-аналитический.

Результаты и их обсуждение. За период 2013 – 2016гг. в Минске произведено 17643 судебно-медицинских вскрытия, из них зарегистрировано 218 аутопсий детей (это составило 1,24% от общего числа вскрытий), среди которых 117 (53,7%) случаев смерти от внешних причин. Число подростков в возрасте 14-18 лет составило в изученном материале 72 (33,03% от всех случаев аутопсий детей), из них 57 (79,2%) наблюдений насильственной смерти.

Наибольшее число случаев насильственной смерти подростков зарегистрировано в возрасте 17 – 18 лет: в 17 лет - 19 случаев (33,3%; м:ж=1,7:1), в 18 лет – 16 наблюдений (28,1%; м:ж=2,2:1). Во всех возрастных группах, кроме 14 лет, преобладают лица мужского пола. Среди причин, повлекших смерть подростков, ведущее место занимает падение с высоты (25 случаев; 43,9%). На втором месте расположилось острое отравление (n=8; 14%), на третьем – повешение (n=7; 12,3%), на четвертом – автомобильная травма (n=5; 8,8%), на пятом – утопление (n=4; 7,02%).

Таким образом, результаты нашего исследования могут служить основой для формирования групп повышенного риска и проведения комплексных профилактических мероприятий. По нашему мнению, в общеобразовательных учреждениях в программы по формированию здорового образа жизни необходимо включать статистику смертности от внешних причин и рассматривать основные стратегии профилактических мероприятий.

Выводы.

1. Основной пик насильственных смертей подростков приходится на возрастную группу 17 - 18 лет (61,4%).

2. Во всех возрастных группах, кроме 14 лет, среди погибших преобладают лица мужского пола.

3. На первом месте среди причин насильственной смерти подростков стоит падение с высоты (n=25; 43,9%), на втором – отравление (n=8; 14%), на третьем – повешение (n=7; 12,3%).

4. Профилактические мероприятия должны проводиться, прежде всего, среди возрастных групп риска и с учетом ведущих причин смерти.