

Сапешко Е. Ю., Котикова М. А.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПНЕВМОНИЙ В РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ

Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Кривошеева Ж. И.

Кафедра фтизиопульмонологии

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск

Актуальность. Пневмонии с затяжным течением занимают одну из важных позиций в лечебной практике. Знание распределения данного заболевания среди разных возрастных категорий населения Республики Беларусь было бы полезным для предупреждения таких ситуаций. В нашем исследовании мы учитывали диагностические критерии затяжного течения пневмонии: длительное течение пневмонии (свыше 4 недель); рентгенологически определяющаяся перибронхиальная и очаговая инфильтрация сегментарной или лobarной (долевой) локализации, не регрессирующая свыше 4 недель, усиление легочного и сосудистого рисунка со стороны поражения; лабораторные признаки продолжающегося воспалительного процесса: лейкоцитоз, повышенные значения СОЭ.

По статистике такое развитие болезни наблюдается в 30% случаев, у пожилых людей – в 50% случаев. Одним из факторов риска затяжного течения пневмонии является возраст. Пораженные пневмонией люди в возрасте до 60 лет могут иметь другие рентгенологические и/или морфологические признаки заболевания и, как правило, пневмонии разрешаются в течение 4 недель, у лиц старше 60 лет риск затяжного течения более высок.

Цель: изучить частоту встречаемости затяжных пневмоний в 2009-2016 гг среди разных возрастных категорий населения Республики Беларусь, а также среднюю длительность их разрешения.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 173 медицинских карт пациентов, получивших консультативную помощь в УЗ «2-й городской противотуберкулезный диспансер» г. Минска, у которых заключительный диагноз был «внебольничная пневмония». Изучались сведения о заболевании в временном промежутке с 2009 по 2016 годы. В разработку не были включены пациенты с этим диагнозом, у которых после дополнительного обследования был диагностирован туберкулез, рак и другая респираторная патология.

Результаты и их обсуждение. Среди анализируемых пациентов мужчин было 111 (64,2%), женщин – 62 (35,8%). Общее количество больных было разбито на две возрастные группы: до 60 лет, что составило 79 человек, и старше 60 лет – 94 (54,3%). В возрастной категории старше 60 лет мужчины составили 65,9% (62 человека).

Наиболее часто регистрировалась нижнедолевая локализация пневмонии – 90 случаев из 173 (52,0%). Правосторонних было 65 (72,2%), левосторонних – 25 (27,8%).

Средняя длительность рассасывания воспалительного процесса в легких у лиц до 60 лет составила 45 дней, у лиц старше 60 лет – 58 дней.

Выводы. Наибольшее число случаев и высокая доля внебольничных пневмоний с затяжным течением регистрируется у пожилых лиц старше 60 лет (54,3%), среди которых преобладают мужчины (65,9%).

Чаще встречается правосторонняя (72,2%) и нижнедолевая локализация (52,0% от всех). Для пациентов старше 60 лет характерен более длительный период разрешения и рассасывания воспалительного процесса, превышающий на 28-30% сроки заболевания у лиц младше 60 лет.