

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ОПУХОЛЯМИ ТИМУСА

Шепетько Михаил Николаевич¹, канд. мед. наук,

Лабунец Игорь Никитович², канд. мед. наук

¹Белорусский государственный медицинский университет

²Минский городской клинический онкологический диспансер

Опухоли вилочковой железы представляют относительно редко встречающиеся новообразования переднего средостения. Клинический опыт в отношении ведения больных с диагнозом тимомы не всегда соответствует морфологическим критериям злокачественности и прогнозу заболевания. Ведение больных злокачественными опухолями тимуса представляет значительные трудности еще на этапе диагностики. Четких критериев злокачественности в настоящее время нет, и поэтому существует неопределенность в выборе адекватного лечения. Цель исследования состояла в анализе результатов лечения больных новообразованиями тимуса.

Из 113 больных новообразованиями средостения в возрасте 14–86 лет с 1997 по 2007 г., опухоли тимуса встретились у 17 пациентов (15 % случаев). Средний возраст заболевших — $48,3 \pm 4,1$ лет. Мужчин 10 человек, женщин 7.

Исходя из того, что рентгенологически опухоль выглядела как тень, занимающая средостение, все 17 больных были подвергнуты хирургической операции. У 13 пациентов опухоль удалась полностью вместе с тимусом или была выполнена максимальная циторедукция, у 4 больных операция завершилась только инцизионной биопсией. После исследования макро- и микропрепарата случаи были распределены согласно классификации Masaoka. В течение 5 лет из 17 пациентов 7 (41,2 % случаев) умерли от прогрессирования заболевания. От локорегионарного рецидива заболевания или от прогрессирования в виде отдаленных метастазов в различные сроки 3 пациентов, описанных выше (в случае, где инвазивность тимомы вызвала сомнения), умерли. Функция множественных оценок по Каплан–Мейеру в целом для доброкачественных и злокачественных опухолей тимуса показывает, что 50 % больных живут более 24 мес.

Выводы: Для больных неинвазивными доброкачественными опухолями тимуса хирургическое лечение является единственным и дает прекрасные результаты в отношении выздоровления. В то же время лечение больных злокачественными тимомами представляет значительные трудности еще на этапе морфологической диагностики. Из-за отсутствия достаточных объективных критериев злокачественности опухолей тимуса стандартный подход к лечению данной категории больных не разработан.