

РЕЗЕКЦИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ В ЛЕЧЕНИИ РАКА ПОЧКИ

Прохоров А.В.¹, д-р. мед. наук, профессор, Папок В.Е.¹, канд. мед. наук,

Масанский И.Л.², Малая Н.И.²

¹Белорусский государственный медицинский университет

²Минский городской клинический онкологический диспансер

В Республике Беларусь рак почки занимает второе место среди онкоурологических заболеваний и до настоящего времени хирургический метод остается основным в лечении этой патологии. Улучшение ранней диагностики позволило более широко использовать органосохраняющий принцип в лечении данной категории пациентов.

Цель исследования: изучение результатов органосохраняющих операций в лечении рака почки.

Материалы и методы. С 2002 по 2010 г. на базе онкоурологического отделения МГКОД выполнено 2035 операций по поводу рака почки, из них 402 (19,7 %) резекций почки. Соотношение резекция/нефрэктомия увеличилось более чем в 10 раз, с 5,03 % в 2002 г. до 58,9 % в 2010 г.

Результаты. Проведен ретроспективный анализ ближайших и отдаленных результатов резекции почки у 402 больных. Средний возраст составил 62,2 года. Средний размер новообразований составил $4,1 \pm 1,6$ см (T1a — 356 (88,7 %), T1b — 36 (8,9 %), T2 — 2 (0,5 %), T3a — 8 (1,9 %). На момент операции регионарные и отдаленные метастазы не определялись.

Послеоперационные осложнения отмечены у 14 (3,5 %) больных. Кровотечение диагностировано у 8 (2 %) пациентов, у 2 пациентов сформировалась пиелоартериальная фистула с массивной транзиторной макрогематурией. У одного больного на 7-е сутки после операции развился тотальный мезентериальный тромбоз. Послеоперационная летальность составила 0,2 %.

Отдаленные результаты прослежены в сроки 6—86 месяцев ($27,6 \pm 19,2$ мес.). Местный рецидив опухоли диагностирован у 4 (1 %) больных, прогрессирование рака почки у 6 (1,5 %) больных в среднем через $22,32 \pm 16,08$ месяцев после операции. Все случаи прогрессирования наблюдались у пациентов с I стадией заболевания. Умерло 12 (3,0 %) больных (6 пациентов от причин, не связанных с основным заболеванием).

Выводы. Органосохраняющие операции при раке почки можно отнести к радикальным вмешательствам, позволяющим сохранить орган и избежать осложнений со стороны единственной почки после нефрэктомии.