

Стельченко А. А.

ИЗУЧЕНИЕ СЕКСУАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ И КОМОРБИДНЫХ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ У ЛИЦ С НАРКОТИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ.

Научный руководитель доц. мед. наук, проф. Копытов А. В.

Кафедра психиатрии и медицинской психологии

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск

Актуальность. Изучение коморбидных психических расстройств у людей с наркотической зависимостью способствует улучшению лечебно-диагностического процесса. Среди факторов, влияющих на начало употребления наркотических веществ, можно выделить особенности сексуальной сферы, оказывающие отрицательное действие на аддиктивное поведение наркозависимых.

Цель: определить коморбидные психические расстройства и особенности сексуальной функции у лиц с наркотической зависимостью для оптимизации профилактических и лечебных мероприятий

Материалы и методы. Объект исследования (ОГ) - 60 пациентов с наркотической зависимостью: 35 мужчин (М) и 25 женщин (Ж), прошедших стационарное лечение на базе РНПЦ психического здоровья и МГКНД г. Минска. Контрольная группа (КГ) из 23 человек, не употребляющих наркотических средств. Группы сходны по основным социально-демографическим характеристикам. Для диагностики коморбидных психических расстройств использовался опросник SCL-90-R. Для изучения психологических особенностей и сексуальной сферы: торонтская шкала алекситимии (TAS), международный индекс эректильной функции (МИЭФ), индекс женской сексуальной функции (ИЖСФ).

Результаты и их обсуждение. В ходе исследования коморбидных психических расстройств у основной и контрольной групп значимые статистические различия выявлены по следующим показателям: среднее значение алекситимии в основной группе $78,3 \pm 0,86$, в КГ $61,2 \pm 2,35$; соматизация в ОГ $2,17 \pm 0,068$, в КГ $0,47 \pm 0,16$; obsessions и compulsions в ОГ $2,15 \pm 0,063$, в КГ $0,63 \pm 0,164$; межличностная тревожность в ОГ $2,06 \pm 0,067$, в КГ $0,69 \pm 0,123$; депрессивность в ОГ $2,29 \pm 0,342$, в КГ $0,802 \pm 0,86$; тревожность в ОГ $2,25 \pm 0,055$, в КГ $0,51 \pm 0,678$; враждебность в ОГ $2,032 \pm 0,065$, в КГ $0,46 \pm 0,097$; фобии в ОГ $1,82 \pm 0,059$, в КГ $0,242 \pm 0,062$; паранойя в ОГ $2,278 \pm 0,053$, в КГ $0,325 \pm 0,087$; психотизм в ОГ $1,84 \pm 0,052$, в КГ $0,55 \pm 0,102$; Gsi в ОГ $2,61 \pm 0,102$, в КГ $0,52 \pm 0,116$; Psi в ОГ $60,44 \pm 0,908$, в КГ $29,39 \pm 4,64$; PDSI в ОГ $3,01 \pm 0,165$ в КГ $1,34 \pm 0,782$; для всех показателей $p < 0,01$. При сравнении психологических особенностей и коморбидных психических расстройств у М и Ж, статистически значимые различия выявлены по следующим показателям: алекситимия у М $79,89 \pm 0,748$, у Ж $73,11 \pm 1,96$; соматизация у М $2,305 \pm 0,074$, у Ж $2,0 \pm 0,125$; obsessions и compulsions у М $2,052 \pm 0,078$, у Ж $2,511 \pm 0,063$; межличностная тревожность у М $2,068 \pm 0,055$, у Ж $2,389 \pm 0,069$; враждебность у М $2,11 \pm 0,075$, у Ж $1,81 \pm 0,061$; для данных показателей $p < 0,01$. При изучении сексуальной сферы ОГ получены следующие результаты: эректильная функция М до начала употребления наркотических веществ $78,37\%$ ($\pm 1,231$), после- $76,05\%$ ($\pm 1,44$); оргазмическая функция у М до употребления $76,42\%$ ($\pm 1,243$), после- $74,47\%$ ($\pm 1,257$); удовлетворенность половым актом у М до употребления $75,37\%$ ($\pm 1,046$), после- $74,95\%$ ($\pm 1,327$); p для всех значений $< 0,01$. Функция влечения у Ж до употребления $75,77\%$ ($\pm 1,412$), после- $77,77\%$ ($\pm 1,277$); удовлетворенность половым актом у Ж до употребления $77,0\%$ ($\pm 1,013$), после- $78,77\%$ ($\pm 1,341$); оргазмическая функция у Ж до употребления $73,11\%$ ($\pm 2,064$), после- $78,33\%$ ($\pm 1,9$); боль во время полового акта до употребления $48,22\%$ ($\pm 1,793$), после- $43,44\%$ ($\pm 1,78$); $p < 0,01$ для всех показателей.

Выводы. Коморбидные психические расстройства и уровень алекситимии значительно выражены у ОГ. При сравнении М и Ж выявлено: уровень алекситимии, соматизации, враждебности выше у М, а межличностная тревожность, obsessions и compulsions у Ж. Эректильная и оргазмическая функции у М после начала употребления ниже, чем до. Влечение и оргазмическая функция у Ж при употреблении выше, а уровень боли ниже.