

*Лукашевич Д. В.*

## **ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НАРКОМАНИЕЙ И ТОКСИКОМАНИЕЙ**

*Научный руководитель ст. преподаватель Живицкая Е. П.*

*Кафедра иммунологии и экологической эпидемиологии*

*Белорусский государственный университет, МГЭИ им. А. Д. Сахарова БГУ, г. Минск*

**Актуальность.** Изучение наркоманий и токсикоманий является крайне важным для человечества на современном этапе. С каждым годом растёт число людей, употребляющих психоактивные вещества, так же увеличивается количество смертей, связанных с этим прямо или косвенно. Распространение наркоманий и токсикоманий ведёт к разрушению семей, повышению преступности и общей деградации общества. Улучшение специализированной помощи пациентам с наркоманией или токсикоманией, а также профилактика этих заболеваний, невозможны без учёта показателей заболеваемости и их эпидемиологической оценки.

**Цель:** проанализировать заболеваемость населения Республики Беларусь наркоманией и токсикоманией в период с 2005 по 2016 гг. и выявить основные тенденции.

**Материалы и методы.** В ходе работы был проведён ретроспективный анализ показателей заболеваемости наркоманией и токсикоманией в республике и областях по данным Министерства здравоохранения и Национального статистического комитета Республики Беларусь за 2005-2016 гг.

**Результаты и их обсуждение.** В Республике Беларусь, согласно официальной статистике, в период с 2005 по 2016 гг. было зарегистрировано 15808 новых случаев наркомании и токсикомании. Самый высокий показатель заболеваемости наркоманией за исследуемый период отмечается в 2010 году и составил 19,3 случая на 100 тыс. человек. Тогда в городе Минске наблюдалось рекордное количество новых случаев. К 2016 году значение этого показателя снизилось до 7,3 случаев на 100 тыс. человек по республике, что стало наименьшим значением заболеваемости за исследуемый период. Кривая, характеризующая заболеваемость наркоманией в период с 2005 по 2016 гг., представляет собой график полиномиальной функции. Таким образом, можно предположить, что в ближайшие несколько лет уровень заболеваемости наркоманией в Республике Беларусь будет снижаться, однако при отсутствии профилактических мер и недостаточном контроле за ситуацией возможно повышение числа новых случаев наркомании.

Наибольший показатель заболеваемости токсикоманией был отмечен в 2005 году и составил 1,3 случая на 100 тыс. человек. В дальнейшем число впервые заболевших постепенно снижалось и в 2013 году достигло минимума – 0,6 случаев на 100 тыс. человек, или всего 53 новых пациента с диагнозом токсикомания по всей республике. Однако в 2014 году наблюдалось увеличение уровня заболеваемости до 0,9 случая на 100 тыс. человек. В последующие годы показатель вновь начал постепенно уменьшаться. Таким образом, хорошо заметна тенденция к общему снижению заболеваемости токсикоманией, однако без применения необходимых мер возможно резкое увеличение заболеваемости.

Столица республики была и остаётся лидером по распространённости наркомании и токсикомании, что, возможно, вызвано общей численностью и плотностью населения.

**Выводы.** Таким образом, статистические данные демонстрируют, что проблема наркотической и токсикоманической зависимости в Республике Беларусь актуальна, несмотря на тенденцию к снижению в последние несколько лет. Положительная динамика может быть связана с проведением профилактических мероприятий, направленных на снижение наркотизации населения.