

Вашкова Д. Н., Шершень Л. Л.

ГЕНДЕРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ ПРОТЕКАНИЯ ЦИРРОЗА ПЕЧЕНИ АЛКОГОЛЬНОГО ГЕНЕЗА

Научный руководитель ассист. Алексейчик Д. С.

1-я кафедра внутренних болезней

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск

Актуальность. Цирроз печени в последние годы привлекает пристальное внимание врачей разных специальностей. Это обусловлено в первую очередь широким распространением данного заболевания, а также высокой смертностью от цирроза. Риск развития и прогрессирования заболевания может определяться различными факторами, такими как пол, наследственность, предрасположенность, метаболический синдром и сопутствующие вирусные гепатиты.

Цель: выявить особенности протекания цирроза печени в зависимости от пола пациентов; определить чувствительность и специфичность коэффициента де Ритиса в диагностике алкогольного поражения печени.

Материалы и методы. В исследование были включены 29 мужчин и 25 женщин с диагнозом цирроза печени алиментарно-токсического генеза (класс тяжести А-С по шкале Чайлд-Пью), которые находились на госпитализации в отделениях гастроэнтерологии УЗ «10 ГКБ» в период с июня по сентябрь 2018 года. Также в исследование было включено 11 пациентов с диагнозом цирроза печени вирусного генеза (класс тяжести А-С по шкале Чайлд-Пью). Всем пациентам проводился стандартный комплекс лечебно-диагностических исследований.

Результаты и их обсуждение. Группа мужчин и группа женщин были сопоставимы по возрасту ($52,6 \pm 4,3$ vs $54,4 \pm 5,2$ лет, $p=0,596$), сопутствующей патологии (ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия, сахарный диабет, хроническая болезнь почек $\chi^2=6,22$, $p=0,548$), тяжести цирроза печени ($\chi^2=5,68$, $p=0,224$). В группе женщин статистически чаще встречались такие осложнения цирроза печени, как варикозное расширение вен пищевода 3 степени, печеночная энцефалопатия 3 степени ($\chi^2=78,48$, $p<0,05$).

Чувствительность и специфичность коэффициента де Ритиса ($АСТ/АЛТ \geq 2$) в диагностике алкогольного генеза поражения печени составила 0,55 и 0,45 соответственно, площадь под кривой 0,56 (95% ДИ 0,34-0,85).

Выводы. Для женщин более характерны такие осложнения цирроза печени алкогольного генеза, как варикозное расширение вен пищевода 3 степени, печеночная энцефалопатия 3 степени.

Коэффициент де Ритиса имеет невысокую чувствительность и специфичность в диагностике алкогольного поражения печени.