

Некрашевич И. А.

ФАКТОРЫ РИСКА ЛЕТАЛЬНОГО ИСХОДА В ОТДЕЛЕНИИ ГНОЙНОЙ ХИРУРГИИ

Научные руководители д-р мед. наук, проф. Жидков С. А.

Кафедра военно-полевой хирургии

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск

Актуальность. Исторически наиболее тяжелые пациенты хирургического профиля находятся в отделении гнойной хирургии.

Цель: определить факторы риска неблагоприятного исхода заболевания у пациентов отделения гнойной хирургии.

Материалы и методы. Изучены медицинские карты (70) умерших пациентов в отделении гнойной хирургии УЗ «2-я ГКБ г. Минска». Из них мужчины – 32 (45,7%), женщины – 38 (54,3%). В возрасте 40-60 лет умерли 4 человека (5,7%); 61-74 – 20 человек (28,6%); 75-89 – 40 человек (57,1%); 90 лет и старше – 6 человек (8,6%). Пациенты лечились по поводу следующих заболеваний: ОАСНК (облитерирующий атеросклероз сосудов нижних конечностей) – 22 (31,4%); осложнения онкологического заболевания – 13 (18,6%); трофические язвы нижних конечностей – 9 (12,9%); пролежни различной локализации – 5 (7,1%); ПТФС (посттромбофлебитический синдром) – 4 (5,7%); прочие заболевания – 17 (24,3%). Сопутствующие заболевания встречались у 100% пациентов. Наиболее частыми явились следующие сопутствующие заболевания: эмфизема легких – 25,6%; энцефалопатия различного генеза – 14,8%; хроническая болезнь почек – 10,2%; ИБС (ишемическая болезнь сердца) – 9,7%; хронический пиелонефрит – 9%; прочее – 30,7%.

Результаты и их обсуждение. Среднее число сопутствующих заболеваний у пациентов 40-60 лет – 1,2; 61-74 лет – 2,6; 75-89 лет – 2,5; 90 лет и старше – 2,8. Основная причина летальных исходов, выявленных при вскрытии: ИБС, онкологические заболевания и их осложнения.

Выводы. Факторами риска летального исхода у пациентов отделения гнойной хирургии является возраст, сопутствующая патология сердечно-сосудистой системы и онкологические заболевания.