

Бурбуля Ю. Н., Гречаный Е. В.

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ СИФИЛИСОМ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В ПОСЛЕВОЕННЫЙ И СОВРЕМЕННЫЙ ПЕРИОД

Научный руководитель канд. мед. наук доц. Навроцкий А. Л.

Кафедра кожных и венерических болезней

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск

Актуальность. Борьба с сифилисом всегда была одной из актуальнейших проблем здравоохранения. Пристальное внимание к этому заболеванию связано с особой тяжестью его течения, способностью поражать нервную систему и все органы, вызывать необратимые поражения у потомства, способность давать эпидемические вспышки и изменять патоморфоз, а также тесная связь с изменением медицинских и социальных факторов.

Появление новых методов лечения, не отменяет актуальность профилактики сифилиса. Изучение изменений в клиническом течении сифилиса и особенностей его распространения в разные периоды истории позволяет совершенствовать систему скрининга, разрабатывать новые меры профилактики.

Цель: оценить особенности заболеваемости сифилисом на территории Республики Беларусь в различные периоды времени.

Материалы и методы. В работе использованы данные государственной статистической отчетности кожно-венерологической службы: (форма №1- ИППП) за 1971-2018 гг., статистические материалы заболеваемости сифилисом в СССР с 1946 по 1961 гг. Центрального научно-исследовательского кожно-венерологического Института МЗ СССР. Для анализа данных использовались методы вариационной статистики.

Результаты и их обсуждение. Изучена динамика и тенденции заболеваемости сифилисом на территории Республики Беларусь в послевоенный и современный периоды. Первая волна началась в годы Великой отечественной войны (ВОВ) и достигла пика в 1946 г., когда был выявлен 251 больной на 100 тыс. населения. В 60-е годы интенсивные показатели заболеваемости колебались в пределах от 0,7 до 1,2 случая на 100 тыс. населения. В 1966 г. начался второй подъем заболеваемости. Ее пик отмечен через в 1975 г. а уровень сифилиса был в 9 раз ниже - 9,6 случаев на 100 тыс. населения. Две волны сифилиса имели практически одинаковую продолжительность - 22 и 23 года.

Организация борьбы с сифилисом в БССР носила достаточно эффективный характер. Об этом говорит тот факт, что из всего сифилиса, зарегистрированного в СССР, на долю БССР в 50-60 годы приходилось от 1,1% до 1,7%, а доля населения БССР в Советском Союзе составляла 3,8%. К примеру, Грузия при доле населения в 1,9% давала от 6 до 12% всего сифилиса в СССР.

Третья волна зафиксирована уже в 90-е гг. в 1990-е гг. на территории современной Республики Беларусь. Ее пик пришелся на 1996 г. и по показателям был близок к периоду ВОВ (206,7 случаев на 100 тыс. населения). Это объясняется экономическими и социальными потрясениями произошедшими во время и после распада СССР. Постепенно Заболеваемость постепенно снижалась и к 2018 г. составила 4,8 случаев на 100 тыс. населения. Отличительными особенностями этого периода были его большая продолжительность (более 30 лет) и рост скрытых форм сифилиса, который достиг к 2018 г. 88%.

Выводы. Заболеваемость сифилисом на территории Республики Беларусь до и после распада СССР носила волнообразный характер. Зафиксировано три значительных волны. При этом третья волна характеризуется большей продолжительностью и преобладанием скрытых форм сифилиса.